FLORA ROMANA

D. JOANNIS FRANCISCI MARATTI

ABBATIS VALLVMBROSANI

OPVS POSTVMVM

NVNC PRIMVM IN LVCEM EDITVM

TOM. I.

ROMAE

TYPIS JOSEPH SALVIUCCI

MDCCCXXII

Praesidum facultate.

SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO
PIO PAPAE VII

MAVRITIVS BENEDICTVS OLIVERIVS

ORDINIS FRATRVM PRAEDICATORVM

FELICITATEM,

Aliquot codices manuscripti de re botanica agentes, Beatissime Pater, ad manus meas, a bibliopola empti, pervenerunt. Cum illos evolvere coepissem, deprehendi autographas esse

lucubrationes celebris Viri Joannis Francisci Maratti Romani Abbatis e Monachorum Vallisumbrosae instituto, qui diu Horto Medico Botanico Romani Archigymnasii praefuit, ubi practicas Botanices tradebat institutiones: Romanam autem regionem per quamplures annos suis excursibus visitavit, ut Floram Romanam colligeret. Quam quidem modo italico, modo latino sermone, modo ista, modo illa methodo disposuit, atque ad Linnaei etiam distributionem adduxit, juxta quam ab anno, quantum conjicere valeo, circiter 1772. *jam ad praelum paraverat.*

Quomodo contigerit, Beatissime Pater, ut tandiu jacuerit, me latet. In quorum manus post auctoris mortem devenerit: per quos denique ad bibliopolam delata fuerit, ignoro. Ast, sapientum virorum judicio, hujusmodi profecto est, quae publici juris fieri mereretur. Itaque de editione, sub Sanctitatis Tuae auspiciis a memetipso suscipienda, consilium cepi. Quod Tu, pro singulari tua clementia, non es dedignatus.

Accipe igitur , Beatissime Pater , hanc Floram Romanam , quae dum acrem ingenii auctoris vim, indefessos labores , et miram diligentiam ostendit, quid Romae jam quinquaginta ab hinc annis in hujusmodi studiis perfectum esset , demonstrat . Tibi porro omnino debetur , qui et reliquis disciplinis , et Botanicae quoque prolixe favisti , atque , praeter alia beneficia, horto longe ampliori, et commodiori , eidem excolendae nunc opitularis .

Ego autem , Beatissime Pater , qui offero, tua benignitate ipsi Archigymnasio , ad quod auctor pertinuit , ab anno 1804 publicus professor pro Lingua Sancta tradenda fui cooptatus . Me deinde , aliis muneribus auctum , Supremae Sacrae Congregationis Commissarium esse jussisti ; ut grati animi nunquam interiturum hoc ipsum optem esse documentum . Ad tuos pedes provolutus precor ut mihi apostolicam benedictionem elargiaris.

TYPOGRAPHVS LECTORI.

Cum Auctor suae Florae Romanae *illa praefatus fuerit, quae operis a se suscepti rationem reddunt, et fines sibi praestitutos declarant, pauca mihi addere de Auctore ipso, atque editione satis erit. Anno* 1747. *Maratti noster Horti Botanici Archigymnasii praefecturam et Botanicarum ostensionum cathedram suscepit. Qua autem virtutis, et doctrinae fama vel tunc gauderet, id munus ei collatum demonstrat. Praestat hic nonnulla excribere ab Oratione ejus inaugurali inedita, quam die* 22. *maii illius anni* 1747 *in Horto academico medico habuit „ Inter caetera, ait, innumera illa quidem, ac maxima, quibus celeberrimam illam Romanae Sapientiae sedem est (Benedictus XIV.) prosecutus, beneficia, illud imprimis eminet, quod, postquam Physices doctrinam nova methodo, atque accersitis ab ipsa natura experimentis locupletavit, Botanices quoque theoreticae studium exornavit, ac novam etiam et distinctam practicae cathedram, quae prius aderat, restituit, ad ipsius medicae artis usum, quam prae caeteris munificentissimus Princeps in sinu, ut ita dicam, atque in oculis gestat. Etsi vero quam plurimi, iique peritissimi viri clementissimo Principi non deessent, qui magna cum laude ac dignitate ei cathedrae praeficerentur; me tamen qui et ingenii mei infirmitatem, et virium imbecillitatem optime sentio, eligere summa cum benignitate non dubitavit." Haec*

Auctor, qui etiam signavit, sibi illic disserenti tunc inter auditores adfuisse cl. mem. Cardinales Valenti Gonzaga, S. R. E. Camerarium, a secretis Benedicti XIV. et Guadagni Vicarium. Unde profecto intelligimus, sapientissimum Pontificem suorum praecipuorum administrorum praesentia novum professorem honestare voluisse.

Cl. Martelli nostro Auctori ob obitum successisse an. 1777. *habemus a Renazzi, qui de ipso haec scribit in Historia Rom. Archigymnasii Tom.* 4. *p.* 262. *„ Era gran conoscitore in genere di piante, d'erbe, di radiche. Quando si appressava l'autunno, soleva fare escursioni nelle campagne di Roma, e arrampicandosi sulle adiacenti montagne in traccia di nuove piante, e di erbe non conosciute, sempre tornavasene provvisto di qualche ignota produzione botanica per arricchirne l'orto Romano. Di qualcuna anche ne pubblicò colle stampe la descrizione e gli usi medicinali"*

Aliqua reapse vivens edidit nempe: Descriptio de vera florum existentia, vegetatione, et forma in plantis dorsiferis, sive epiphyllo-spermis, vulgo capillaribus Romae 1760. apud fratres Salvioni. *In* 8. *cum tabula.*

Ejusdem Opusculi apologiam hoc titulo: Botanophili Romani ad cl. Vir. Joannem Christophorum Amadutium Ariminensem Epistola, qua cl. virum Joannem Franciscum Marattium ab Adansonii Galli censuris vindicat. Romae ex aedibus meis Kal. Octobr. 1768. *in* 12.

Plantarum Romuleae, et Saturniae in Agro Romano existentium specificas notas describit inventor D. Joannes Franciscus Maratti etc. Romae 1772. typis Archangeli Casaletti *in* 8. *cum tabula.*

Joannis Francisci Maratti etc. De plantis Zoophytis et lithophytis in mari mediterraneo viventibus Romae 1776. typis Archangeli Casaletti *in* 8.

Ex hisce operibus postremum praecipue clarum reddidit nostrum Auctorem. Maxima tamen Lucubratio, cujus reliquae tanquam pars aliqua erant, Flora Romana *censeri debet, quam, prout ex ejus Praefatione patet, juxta methodum Linnaeanam dispositam, jam ad praelum paraverat. Olim methodo Tournefortiana usus fuerat. Plantas etiam, juxta initiales earumdem literas, aliquando disponere sibi proposuerat. Imo adhuc existit ejus volumen italico sermone conscriptum, isto, quod nunc editur, aliquanto prolixius, in quo methodo sibi propria, ex illis Riveti, Tournefortii, atque Linnaei simul junctis efformata, de Plantis agit. De hujusmodi suo cogitato in quadam Scheda sic ait: ,, Ho stimato bene, in descrivere le piante, unire tutti tre li sistemi in uno . . . Al primo aspetto fo vedere la forma de' loro fiori: dipoi il numero de' loro petali, stami, ed apici, e la forma anche e numero delle loro tube, o pistilli, e frutti, parti tutte permanenti, e non variabili, proprie di quel dato genere. Distribuisco le piante qui descritte in classi: ad ogni classe assegno di-*

stintamente i loro generi, e a questi le loro specie, e varietà. Qui non descriverò, se non le piante da me ritrovate ne' miei viaggi Botanici, le quali nascono nell' Agro Romano " Hujusmodi opus adhuc Praefatione destituitur : postrema autem Classis, quae est XX. de Fungis, *vix incoepta conspicitur.*

Pro nostra adornanda editione duo exemplaria ipsius Auctoris manu exarata praesto fuerunt. Quae licet sint fere ubique parallela; aliqua tamen in aliquibus varietas reperitur. Alterum vernaculas plantarum appellationes frequentiores habet. Istas non omittere pluribus lectoribus utile futurum visum est. Rursus alterum aliqua additamenta posterioribus profecto nostri Auctoris inventis, aut curis respondentia continet. Quae pariter editioni accesserunt. Quo ad herbarum tamen virtutes medicas, quae in hoc saepe fusius exponuntur, aliqua parsimonia, quam forte nonnulli majorem aliquando optavissent, servata est.

Ex hisce duobus exemplaribus prius anno circiter 1769. *exaratum ex eo colligitur, quod Romuleam* (*V. n.*101.) *in contextu habeat, non vero Saturniam* (*V. n.*704.). *In opusculo autem, quod de hisce plantis edidit anno* 1772. *memorat (p.*3.) *utrasque a triennio circiter a se inventas fuisse. Ast id opusculum citatur in altero exemplari, quod hinc eodem anno* 1772. *vel paulo post paratum videtur. In istis Auctor addidit de Romulea, eam vegetare Februarii, et Martii mensibus etiam ad Testaceum, et extra januas D. Pancratii, et Portuensem, in herbosis.*

Ad nos minime attinet de Operis pretio disserere. Ejus edendi consilium praeclari sane viri probaverunt : inter quos praeteriri silentio non debet Cl. de Matthaeis, medicinae professor, operibus egregiis jam editis notus, qui etiam rem cum celebri Brocchi communicavit, ejusque suffragio suum communivit. Reverendissimus item Bellenghi Monachorum Camaldulensium Vicarius generalis, qui sua inventa ad colores omnigenos e plantis indigenis obtinendos pluribus lucubrationibus in lucem produxit, de aliis etiam harum plantarum ad usus oeconomicos utilitatibus disseruit, hanc editionem non solum laudavit, verum etiam suorum inventorum summa augere voluit. Prae caeteris commemorari meretur Thomas Prelà Sanctissimi Pontificis Archiater, qui ob veterem probitatem, morum suavitati, eximiaeque religioni, atque pietati conjunctam, et ad amicitiam mire comparatam, jamdiu animum Editoris sibi devinxit. Sibi autem scire, librosque optimos, et perpulchros magna copia sibi comparavisse minime contentus, nihil disciplinis promovendis conducens a se alienum putat. In Botanices vero, de qua hic agitur, progressus sic cogitationes adjecit, ut aliquem aptum botanicis peregrinationibus instituendis, ac herbis docte colligendis, novo publico munere addictum, optaret, atque obtineret.

Ergo Illustrissimus Archiater in Monastici Instituti decus, in Archigymnasii gloriam, in Urbis ornamentum, in qua ab instauratarum literarum epocha

clari Botanices cultores, quales, ut aliquos nominem, Panaroli, Caesalpinus, Princeps Fridericus Caesius, Triumfetti, Fabri celebrantur, alii post alios excellere non desierunt, atque adhuc excellunt, ast potissimum in ipsius Botanices incrementum, Florae Romanae *Maratti edendae stimulos addidit.*

Decem porro elapsi fere sunt anni ex quo Editor illam acquisivit, atque in publicam lucem producere optavit. Tempora tamen infesta erant. Opportunitate deinde per Sanctitatis Suae reditum laetiori eam cogitationem in praestantem, doctorum hominum commendationibus permotum, virum, se transtulisse gaudebat. Adhuc tamen post quinquennium frustra. Nunc tandem editionem per seipsum ipsemet suscepit.

Reliquum est, erudite lector, ut tuae humanitati sphalmata, quae industria vix praecaveri possunt, corrigenda commendemus.

PRAEFATIO AVCTORIS.

Quod jampridem post varias Botanicas meas peregrinationes, factasque in iis multiplices Plantarum observationes, longo quadraginta annorum intervallo, elucubrare Opus mihi praefixeram; ipsique perficiendo manus admoveram, amicorum nunc denique postulatis, pluriumque illustrium in Botanica virorum hortationibus ut morem geram, in publicam proferre lucem deliberavi. *Florae Romanae* titulo nuncupandum existimavi: cum enim objectum habeat accuratissima descriptione recensendi eas Plantas, quae in Agro Romano uberrime vivunt, in territorio scilicet vulgo Patrimonii terrestris ac maritimi, nec non Latii pariter terrestris ac maritimi (Territoria quidem vasta lateque extensa, atque illis undequaque ditata Vegetabilibus, quae in externis germinantia regionibus a nostra non parum dissitis exquisita diligentia a doctissimis Botanicis inibi degentibus notata fuerunt); idcirco eo nomine inscribenda omnino esse videbatur. De plantis Romanis disserens, de illis praecipue sermonem habebo, quas peculiari studio praefatis in itineribus observare mihi datum est. Si quidem integram absolutamque Plantarum omnium in laudatis ditionibus vegetantium exarare audens recentionem, salebrosam utique ac periculosam suscepissem provinciam, quippequi modo publicis, modo privatis distractus

officiis, negociisque, nequaquam profecto valuissem singulis anni tempestatibus ubicumque praesens esse ad maturas explendas indagines, easque opportune describendas. Nemo igitur me reprehendat, aut mihi jure succenseat, quum aliquam forte Plantam inveniet, quae plurimas a me peractas effugerit inquisitiones. Benevolo enim amicoque animo condonare id poterit accuratis iteratisque laboribus, quos libentissime insumpsi, ut nostra vegetabilia recto ac perspicuo disponerem ordine, facultates adnecterem, quas medica schola, meaque probatas habuit experientia, novaque tandem patefacerem Botanica inventa, quibus ad hanc usque diem literaria respublica fuit penitus destituta. At de systemate cogitans, cujus ratione Plantas coordinare, certaque methodo disponere valerem, anceps profecto suspensusque haerebam: quis enim ignorat, quot quamque varia invecta jam fuerint Botanicae systemata? Qua de re maturo instituto super singulis examine, optimum duxi Linnaeanam amplecti disciplinam, utpote recentioribus magis acceptam. Tali pacto systema D. Linnaei probe noscentibus, ad mearum quoque Plantarum plenam cognitionem devenire fas erit. Suas enim quibusque adjicere haud omisi nomenclaturas atque synonyma, quemadmodum a laudato Auctore dantur, atque describuntur. Animadvertendum vero est, me cunctis hisce Plantis ideo non innuere loca natalia, ubi eas reperi, quia loca nonnulla, quae hujusmodi Her-

bas mihi suppeditarunt dum hac illac rura peragrarem, velut alpestria, inhospita, et a colonorum Pagis dissita vel a Tabula Geographica, utpote humilia nimis, ne per incidentiam quidem commemorantur, vel certa denominatione non donantur, vel signato tramite minime adeuntur. Itaque sufficiat haec qualiscumque Plantarum descriptio. Etenim si studiosa praesertim Botanicae Juventus, ea, qua par est, diligentia atque assiduitate, ipsi navare operam haud detrectabit, satis proficuos inde fructus, magnasque utilitates, Deo bene juvante, eandem reportaturam esse confido.

Roma, quae olim universas cogniti Orbis gentes suo vidit subactas Imperio, ac nunc sedes Romani summi Pontificis, Orthodoxae Fidei custos, et magistra jure agnoscitur, atque honoratur, sita est in gradu 39 latitudinis (*) prope Tyberim. Decimoctavum distat a Mediterraneo lapidem, servata via communi; duodecimum vero linea recta, et ab Apenninis quadraginta circiter miliaribus, consueto tramite adhibito: viginti autem, aut viginti quinque si recta spectetur.

Celeberrima haec Urbs admiratione summa ab exteris invisitur, ob egregia, ac magnifica aedificia, quae singulari arte antiquitus non solum, sed recen-

(*) Altitudo poli, ex quamplurimis coelestibus observationibus deducta, in specula Collegii Romani, fere in medio Urbis posita, est gr. 41.° 53' 54" 2. Vid. Calandr. de ea Opusc. an. 1803.

ter etiam in ea extructa sunt. Abundant ipsa columnis, marmoribusque rarissimis, durissimisque, quae ex Asia, atque Africa deportaverunt veteres Romani, ut ne dum templa, et palatia ornata fuerint lapidibus Numidiae Orientalibusque, sed publicae etiam viae, domusque privatorum civium porphyreticis, atque Africanis marmoribus sint refertae. Simulacra, ac monumenta Heroibus, falsisque Gentilium Idolis dicata, atque a praeclaris Graecorum, ac Romanorum artificibus mirabiliter elaborata, Pyramides, Obelisci, magnae molis Columnae cum historiis inibi expressis, Amphitheatra, Aquaeductus, aliaque prodigiosa opera, undique occurrunt, non sine maximo intuentium stupore, innumeris quoque praetermissis sculpturis in sarcophagis Pontificum, S. R. E. Cardinalium, aliorumque insignium virorum, praeter picturas excellentes, quibus Templa, ac Pinacothecae ditata conspiciuntur. Mirum igitur haud videri debet si Tullius dixerit = *Roma lux Orbis terrarum, et arx omnium Gentium*; ac antiquus Poeta cecinerit (1)

Terrarum Dea, Gentiumque Roma
Cui par est nihil, et nihil secundum.

Illud vero, quod in re nostra maxime commendandum venit, est peculiaris soli foecunditas. Hujusce namque Urbis Territorium egregiam nanciscitur positionem, stat enim inter duo maria, Mediter-

(1) Mart. lib. 12. epist. 8.

raneum nempe, et Adriaticum, habetque suo in centro longitudinali quasi dorsum montium, qui sensim declinantes efformant Urbis tenus septem valles aliquanto profundas, quas inter alii subalterni humiliores attolluntur montes, qui prope Romam adeo sunt diminuti, ut clivulorum potius, quam montium nomine sint appellandi.

Tametsi flumina regalia ibi non excurrant ob deficientem continuam, longamque planitiem; sufficiens nihilominus trahitur aquarum copia a Tyberi qui Urbem intersecat, nec non a frequentibus rivis, torrentibus, stamnis, lacubus, thermis, fontibusque, quae huc illuc campos peragranti sese offerunt. Et vero speciali dignae sunt animadversione aquae Acidulae, ac medicinales quas habitatorum commodo, tuendaeque aegrorum saluti providissime a natura concessas accepimus: hujusmodi autem aquarum copia atque ob argillosam terram, quae pariter habetur, commode potest exerceri Ars Figulina, quae utilissima sane est aedibus construendis, caeterisque usibus perquam necessaria.

Hoc in solo crescunt, vegetantque nedum Arbores, quarum folia hyemis tempore cadunt, sed eae quoque Plantae felicissime aluntur, quae brumali, rigidiorique anni tempestate illis minime spoliantur, quemadmodum Arbores coniferae, glandiferae, bacciferae, nec non vascoliferae.

Quod si prata, nemora, sepes, lacus, paludes, du-

meta, ac uliginosa loca percurrantur, tanta in quantitate, tamque diversae in genere, specie, et varietate reperiuntur Plantae *trunco ligneo*, non minus annuae, quam perennes, ut numerum adeo prodigiosum nusquam profecto legamus neque in Flora Svecica D. Linnaei, neque in Parisiensi Guetardi, neque in Elencho Plantarum Gissiae a D. Dilenio confecto. Spatium soli quod nobis ministrat adeo innumerabilem, ut ita dicam, vegetabilium phalangem, incipit ubi sita erat vetus Ansurae Urbs, quae nunc Terracinae nomine nuncupatur, ac Orientem prospicit Romae, excurrit retro litora Mediterranei, usque ad Centum Cellas, quae Urbs posita est ad occasum Romae, inde transeundum super confinia Patrimonii, deinde ad Viterbii montem, et post transactum Tyberim, ubi praecise prostant Chytrae Augusti, non longe a conjunctione Tyberis, et Nar, gradum tamen faciendo ad Flumen Velinum, a quo Reate intersecatur, et inde insensibiliter ascendendo Alpes introitur in Regionem veterum Samnitium; postea per Volscorum Regiam descendendo Frusinonem versus post Suessiam, hodie Setiam, pervenitur ad fines Regni Neapolis, iterum nempe invisitur Terracina. Hic autem ambitus conficitur 160., et ultra miliaribus, quem inter ob positionem, multiplicem varietatem, caeterasque perfectiones, quas ipsa soli topographia abunde exibet, pulcherrimae, selectissimaeque vivunt Plantae, quarum plures nedum descriptas nobis non reli-

querunt, sed ne adumbrarunt quidem summi in Re Botanica Viri Fabius Columna, Pet. Anton. Micheli, Bocconius, nec non Martinus Keler, qui suasionibus D. Caroli Linnaei peregrinatum huc venit anno 1756 sumptibus celsissimi Svecorum Regis; ast splenico morbo correptus, discedere immature debuit, nec datum ei fuit tam uberta loca contemplari.

Superioribus saeculis, ac nuperis quoque temporibus non defuerunt qui partem huisce territorii quomodocumque describere voluerunt, quo tamen successu satis indicant eorum opera, ubi vel solam Plantarum inibi habitantium umbram indicarunt, vel nomina Plantarum referre contenti fuerunt juxta tradita per Matthiolium, Casteldurandum, Brunfelsiumque. Cujusmodi etiam fuit quidam Libellus recenter editus, ac Alphabetico ordine digestus, ubi plaeraeque Plantae repetitae leguntur variis cum synonymis, praetermissis omnino Plantis spontaneis, uti necesse fuisset, et relatis tantummodo iis quae in Viridariis aluntur. Quapropter satis quisque intelligit, quantum intersit nobilissimae scientiae nostrae, quod attente diligenterque instituantur investigationes de speciosissimis vegetabilibus, quae in selectissima hac Italiae parte vitam ducunt.

Qui enim aetate vivimus, qua septentrionales etiam nationes Botanicam diligentissime colunt, turpe nimis esset, si hoc in studio necessarios facere progressus detrectaremus; cum praesertim natale habue-

rimus sub coelo tam apto ad producendas peculiares Plantas, exoticasque optime alendas ex Asia, America, Africa, quas quotidie germinare casu intuemur in ripis, collibusque prope mare ex seminibus huc translatis, vel ope ventorum, vel aestu marino, vel ab avibus, quemadmodum compertum est de nonnullis Palmarum speciebus, Cactis, Euphorbiis, aliisque, quae occurrunt prope mare in arcibus, et scopulis montis Circelli, et Terracinae. Et reapse hujusce Operis necessitatem satis superque indicavit clarissimus Carolus Linnaeus; suo enim in elaboratissimo Opere *Species Plantarum* perraro verba facit de Plantis illis, quae spontaneae habitant in Italia, illasque pene semper tacitus praeterit, quas Romanus exhibet Ager uti centrum ipsius Italiae. Siquidem ex tali silentio facile deducitur, defecisse tanto viro Auctores, qui cognitionem harum Plantarum suppeditare valerent. Nostrum igitur erit omni cum sedulitate occultas hasce Romani soli divitias detegere, gratumque nos facturos esse Reipublicae literariae, confidimus, cum palam fecerimus Botanicas cognitiones, quibus usque nunc caruit. Praeter complures enim species, nova quoque genera omnino prius incognita percensebimus, non sine ingenti studiosorum commodo. Maxima tamen cum circumspectione procedendum erit in efformanda distincta, atque adaequata singularum Plantarum idea. Agitur enim de vegetabili Regno, cujus producta

nonnulla, tametsi prima fronte vel damnosa, vel saltem inutilia hominibus videantur; nihilominus ex methodica, quam caste integreque servabimus, descriptione, compertum erit, suam cuique, eamque maximam a natura tributam esse proficuam qualitatem. Nos ipsi namque experimur, manibusque contrectamus, quantas a variis Herbarum speciebus utilitates reportent nedum genus humanum, sed bruta etiam animantia, quae licet ratione destituta, appetere tamen optime callent illas, quae vel tuendae illorum conservationi, vel fugandis malis inserviunt; proindeque nihil mirum, si proprio instinctu ea ferantur ad Plantas, a quibus caute nos abhorremus uti veneficis, mortiferisque. Siquidem Caprae pascuntur Cicuta, quae nedum homines, sed equos etiam occidit. Pecudes esu Nummulariae pereunt, Boves vero e contra pinguescunt, et alia innumera, quae ad hanc rem produci possent, exempla, si per ocium liceret.

Non est itaque tam horrenda, et noxia herbarum species, quae alicui ex animalibus adiumentum non valeat exhibere, ne Tithimalo quidem, et Aconito exceptis, quae Plantae praeter sua, quae alunt, sibi adhaerentia animalcula, a variis quoque quadrupedibus avidissime appetuntur, quia ex earum cibo conservantur, atque crassescunt. Quinimo ipsarum radices summa cum diligentia quaeruntur, excavanturque ab aliis animalibus, uti suibus, qui extrahunt e ter-

rae visceribus radices sibi proficuas. Istrici, Taxi, aliaque id genus Animalia quasi continuo se exercent in effodienda terra, ut fami consulant; qua ex effossione id bonum provenit, quod semina illuc delapsa sic operiuntur, et maturo tempore denuo foecundantur, germinantque.

Quae omnia a summo rerum Creatore adeo mirabili ordine, tamque perfecta harmonia sunt constituta, ut in hominum denique felicitatem augendam simul cederent, atque conspirarent. Eaedem namque illae Plantae, quas a mensis, dapibusque avertere satagimus, quae, et quanta ceteroquin nobis ministrent auxilia nostris in infirmitatibus, satis superque declararunt sapientissimi in re medica viri, quos inter recentes adnumerandus Clar. Störchius.

Ex animalibus autem quae illarum alimento crescunt, ac conservantur, quis ignorat, maximam a nobis desumi ciborum partem, illorumque nos uti laboribus ad ardua quam plurima exercitia explenda? Omitto autem ulterius percensere, quae ex vegetabili Regno nobis promanant in telis sericis, lineis, gossipiis, caeterisque, quae vel nostro inserviunt vestimento, vel illarum Artium exercitio, quas societati humanae tam necessarias deprehendimus esse; atque nobilissimam Artem Agrariam, una cum illis, quae communi vinculo et cognatione quadam cum ea continentur.

Praestantissimae hujus scientiae historia recense-

ri hic posset ; ex ea tamen siculi nimis in longum excresceret meum Opus; ita provinciam hanc doctioribus, foecundioribusque Viris libentissime relinquo. Meum enim Institutum eo praecise tendit, ut accuratissima texatur Descriptio earum Plantarum, quas longo 40. annorum intervallo observare, ac diligenti notatione describere mihi datum fuit frequenter in itineribus meis per Agrum Romanum, Latium, Patrimonium, Vmbriam, Montes, Alpes, Mediterranei loca, et illis adiacentia.

In Plantarum descriptionibus methodum a clarissimo Linnaeo traditam, nempe sexuale, adhibebo. Hoc enim pacto Botanicae tyronibus faciliorem reddendam esse cujusque Plantae intelligentiam mihi suadeo; quippe quia cum recte indigitaverim numerum partium sexualium, quisque per se facile assequetur, cuinam Plantae descripti characteres sint adaptandi, illamque probe cognitam a caeteris generibus, vel adspectu consimilibus, secernere, ac distinguere haud verebitur. Quapropter illud potissimum prae oculis habebo, ut scrupulosissima prius fiat anatome cujuscumque Plantae, atque omnis longe abeat deceptio in adsignandis univocis, invariabilibusque notis, ac differentiis. In XXIV. Classes illas partitus sum, quarum singulis adsignavi earum propria genera, ipsisque eorum species, ac varietates, una cum medicis facultatibus, quas vel quotidiana firmatas experientia, vel ex assidua in Re Medica, et Botanica celebriorum Auctorum lectione comperi, adnectendasque existim-

INDEX GENERVM

IN HOC PRIMO VOLVMINE CONTENTORVM

CLASSIS I. MONANDRIA

CLASSIS II. DIANDRIA

CLASSIS III. TRIANDRIA

201.—209.	*Festuca.*
210.—214.	*Bromus.*
215. 216.	*Stipa.*
217.—225.	*Avena.*
226. —	*Lagurus.*
227.—233.	*Arundo.*
234.—237.	*Lolium.*
238. 239.	*Elymus.*
240. 241.	*Secale.*
242.—245.	*Hordeum.*
246.—252.	*Triticum.*

III. TRIGYNIA

253. —	*Eriocaulon.*
254. —	*Montia.*
255. —	*Holosteum.*
256. 257.	*Mollugo.*

CLASSIS IV. TETRANDRIA.

I. MONOGYNIA.

258.—263.	*Globularia.*
264.—266.	*Dipsacus.*
267.—276.	*Scabiosa.*
277. 278.	*Sherardia.*
279.—283.	*Asperula.*
284.—298.	*Galium.*
299.—303.	*Crucianella.*
304.—306.	*Rubia.*
307. —	*Exacum.*
308.—321.	*Plantago.*
322. —	*Centunculus.*
323. 324.	*Sanguisorba.*
325. —	*Epimedium.*
326. 327.	*Cornus.*
328. —	*Isnardia.*
329. —	*Camphorosma.*
330.—332.	*Alchemilla.*

II. DIGYNIA.

333. 334.	*Cuscuta.*
335. 336.	*Hypecoum.*

III. TETRAGYNIA.

337. —	*Ilex.*
338.—349.	*Potamogeton.*
350. —	*Ruppia.*
351. 352.	*Sagina.*
353.—355.	*Tillaea.*

CLASSIS V. PENTANDRIA.

I. MONOGYNIA.

356. —	*Heliotropium.*
357.—359.	*Myosotis.*
360. 361.	*Lithospermum*
362.—364.	*Anchusa.*
365.—367.	*Cynoglossum.*
368. 369.	*Pulmonaria.*
370.—372.	*Symphytum.*
373.—375.	*Cerinthe.*
376. —	*Borago.*
377. —	*Asperugo.*
378.—380.	*Lycopsis.*
381.—383.	*Echium.*
384. —	*Androsace.*
385.—391.	*Primula.*
392. —	*Cyclamen.*
393. —	*Menianthes.*
394. —	*Hottonia.*

601. — *Aethusa.*
602. 603. *Coriandrum.*
604.—609. *Scandix.*
610. 611. *Chaerophyllum.*
612. — *Imperatoria.*
613. 614. *Seseli.*
615. 616. *Thapsia.*
617. 618. *Pastinaca.*
619. 620. *Smyrnium.*
621. 622. *Anethum.*
623. — *Carum.*
624.—626. *Pimpinella.*
627. 628. *Apium.*
629. — *Aegopodium.*

III. TRIGYNIA.

630. 631. *Rhus.*
632. 633. *Viburnum.*
634. 635. *Sambucus.*
636. — *Staphylea.*
637. 638. *Tamarix.*
639. — *Corrigiola.*
640. 641. *Alsine.*

IV. PETANGYNIA.

642.—644. *Statice.*
645.—654. *Linum.*
655. — *Aldrovanda.*
656. 657. *Drosera.*

V. POLYGYNIA.

658. — *Myosurus.*

CLASSIS VI. HEXANDRIA.

I. MONOGYNIA.

659. — *Galanthus.*
660. 661. *Leucojum.*
662.—669. *Narcissus.*
670. — *Pancratium.*
671. — *Amaryllis.*
672. — *Bulbocodium.*
673. — *Aphyllanthes.*
674.—691. *Allium.*
692.—697. *Lilium.*
698. — *Erythronium.*
699.---703. *Ornithogalum.*
704. — *Saturnia.*
705.—707. *Scilla.*
708.—710. *Asphodelus.*
711. — *Anthericum.*
712. — *Leontice.*
713.---715. *Asparagus.*
716.---719. *Convallaria.*
720.---724. *Hyacinthus.*
725. — *Acorus.*
726.---732. *Juncus.*
733. — *Berberis.*
734.---736. *Franckenia.*
737. — *Peplis.*

II. DIGYNIA.

738. --- *Oryza.*
739.---750. *Rumex.*
751. 752. *Triglochin.*
753. 754. *Colchicum.*

III. POLYGYNIA.

755.—759. *Alisma.*

CLASSIS VII. HEPTANDRIA.

CLASSIS VIII. OCTANDRIA.

CLASSIS IX. ENNEANDRIA.

CLASSIS X. DECANDRIA.

CLASSIS XI. DODECANDRIA.

I. MONOGYNIA.

867. 868. *Asarum.*
869. — *Styrax.*
870. — *Nitraria.*
871. — *Portulaca.*
872.—874. *Lythrum.*

II. DIGYNIA.

875. — *Agrimonia.*

III. TRIGYNIA.

876.—880. *Reseda.*
881.—902. *Euphorbia.*

IV. DODECAGYNIA.

903. 904. *Sempervivum.*

CLASSIS XII. ICOSANDRIA.

I. MONOGYNIA.

905. — *Cactus.*
906. — *Philadelphus.*
907. — *Myrtus.*
908. — *Punica.*
909. 910. *Amygdalus.*
911.—918 *Prunus.*

II. DIGYNIA.

919.—922. *Crataegus.*

III. TRIGYNIA.

923.—925. *Sorbus.*

IV. PENTAGYNIA.

926. — *Mespilus.*
927.—929. *Pyrus.*
930.—932. *Spirabea.*

V. POLYGYNIA.

933.—944. *Rosa.*
945.—948. *Rubus.*
949. 950. *Fragaria.*
951.—959. *Potentilla.*
960. — *Tormentilla.*
961. 962. *Geum.*
963. — *Comarum.*

CLASSIS XIII. POLYANDRIA.

I. MONOGYNIA.

964. — *Capparis.*
965. — *Actaea.*
966.—968. *Chelidonium.*
969.—973. *Papaver.*
974. 975. *Nymphaea.*
976. — *Tilia.*
977.—992. *Cistus.*

II. DIGYNIA.

993. — *Paeonia.*

III. TRIGYNIA.

994.—997. *Delphinium.*
998. 999. *Aconitum.*

IV. PENTAGYNIA.

1000. — *Aquilegia.*
1001. 1002. *Nigella.*

IMPRIMATUR,

Si videbitur Reverendissimo Patri Mag. Sacri Palatii Apostolici.

Joseph Della Porta Archiep. Damascenus Vicesg.

Summa tum voluptate tum utilitate perlegi, jubente Reverendissimo P. Sac. Pal. Magistro postumum Cl. Joan. Francisci Maratta de re herbaria opus, cui titulus *Flora Romana*, improbo labore ac longo studio digestum; illudque ut typis mandetur, dignissimum censeo, cum botanophilis non minus quam medicis perutile omnino sit ob plurimas sane plantarum species in romano agro nascentes, ac variis usibus accommodatas, quas auctor ordinatim recensuit, atque descripsit: nihil vero in eo sit quod religioni vel moribus adversetur.

Datum Romae die 26. Februarii 1817.

I. De Matthaeis P.M. P. in Archigym. Rom.

Postumum cl. viri *Johan. Franc. Maratti* in Archigymnasio Romanae Sapientiae Botanices Professoris opus improbo ac diuturno labore absolutum ex mandato Reverendissimi Patris S. P. A. Magistri maxima, qua potui, sedulitate perlustravi, neque quidquam in eo animadverti, quod fidei, ac moribus adversetur. Itaque dignissimum censeo, ut e tenebris, in quibus hactenus immerito jacuerat, ad Archigymnasii, atque Urbis decus, in publicam lucem educatur. Datum Romae hac die 6. Martii 1817.

Al. Metaxà in Archigymnasio Rom. Sapientiae Anatomiae, et Medicinae comparativae Professor.

IMPRIMATUR

Fr. Philippus Anfossi Sac. P. A. M.

FLORA ROMANA.

CLASSIS I.

MONANDRIA

MONANDRIA MONOGYNIA

SALICORNIA

1. SALICORNIA (*herbacea*, *vulgo* erba soda *cum sequentibus*) articulis apice crassioribus obtusis. *Linn. Mat. Med.* 8.
Salicornia. *Dod. pempt.* 82.
Salicornia geniculata annua. *Tour. I.R. H.* 51.
Kali geniculatum majus annuum. *C. B. P.* 289.

Crescit ad littus Mediterranei inter Ostiam et Insulam Sacram.

Pharmacopoei Sal Alkali, et confectores vitri Sodam ex hac planta eliciunt.

2. SALICORNIA (*cespitosa*) geniculata, articulis cylindraceis, semper virens, ramorum apice clavato.
Salicornia semper virens. *Savu. Monsp.* 7.
Kali geniculatum majus. *C. B. P.* 289.

Crescit cum praecedente, ad salinas ostienses; sed specie differt, quia radicem habet cespitosam, et satis crassam.

3. SALICORNIA (*lignosa*) articulis in apice

crassioribus, bifidis et trifidis, caudice lignoso.

Crescit ad Salinas ostienses; et quandoque ad altitudinem quinque et sex palmorum provenit.

4. SALICORNIA (*arborescens*) articulis cylindricis, spicis filiformibus incurvatis.

Kali arborescens Tamarisci facie. *Burm. Cent.* 1. *t.* 11. *f.* 1.

Crescit juxta foveas Salinarum prope Draconem duodecimo ab Vrbe lapide.

5. SALICORNIA (*verticillata*) articulis aciformibus, quinque et ultra uncias longis, floribus verticillatis.

Crescit prope arcem Vajanici, juxta littus Mediterranei.

6. SALICORNIA (*aculeata*) articulis flagelliformibus, undique in apice aculeatis, aculeis in extremitate florigeris.

Crescit prope civitatem dirutam Portus, juxta semitas agri Salini.

HIPPVRIS

7. HIPPVRIS (*vulgaris*, *vulgo* coda di cavallo.) *Linn. Hort. Cliff.* 3.

Equisetum palustre brevioribus foliis polyspermum. *C. B. Pin.* 15.

Polygonum femina. *Cam. Epit.* 689. *Dod. Pempt.* 113.

Habitat fere ubique in stagnis.

8. HIPPVRIS (*verticillatum* , *vulgo* coda di cavallo ,) foliis verticillatis rigidissimis et quinatis , in centro thorosis.

Crescit quarto ab urbe lapide prope pratum duarum turrium, juxta Tiberim ad scaturigines aquarum.

Ad hemoragias .

MONANDRIA DIGYNIA

CORISPERMVM

9. CORISPERMVM (*oppositifolium*) foliis oppositis . *Rai Lug.* 205.
Stellaria aquatica . *C. B. P.* 141.
Alsine aquis innatans, foliis longiusculis . *C.B. Hist.* 786.

Habitat in locis vulgo Maccarese , et lacuna Paterno dicta.

10. CORISPERMVM (*verticillatum*) foliis verticillatis.
Stellaria . *Dill. Gen.* 119. *Rai Syn.* 3. *p.* 289.
Stellaria foliis ad caulem angustis , in summitate subrotundis . *Hall. hel.* 108.

Vegetat Sermonetae.

11. CORISPERMVM (*angustifolium*) foliis adversis ovato - acuminatis , in apice bifidis .
Stellaria foliis omnibus angustis , apice resecto . *Hal. hel.* 198.
Stellaria aquatica . *Cel. Vps.* 33.

Lenticula palustris angustifolia, folio in apice dissecto. *Loes. Pruss.* 140. *T.* 38.

Habitat Sermonetae, et alibi ad aquas stagnantes.

12. CORISPERMVM (*vernum*) foliis circularibus.

Stellaria minor et repens. *Dill. gis.* 120. *Rai Syn.* 3. 287.

Stellaria foliis omnibus subrotundis. *Hal. hel. vet.* 199.

Lenticula palustris bifolia fructu tetragono. *C. B. P.* 362.

Callitriche Plinii. *Col. Ecph.* 315. *T.* 316.

Vegetat fere ubique in aquis stagnantibus Agri Romani.

BLITVM

13. BLITVM (*capitatum*, *vulgo blito*) capitellis spicatis terminalibus. *Linn. Hort. Vps.* 3.

Blitum foliis triangularibus dentatis, calycibus baccatis, capitulis summis nudis. *Linn. Virid. Cliff.* 1. *Roy Lugbd.* 206.

Blitum foliis triangularibus dentatis. *Linn. Hort. Cliff.* 28.

Atriplex baccifera. *Rai Hist.* 197.

Habitat ad Centumcellas vulgo Civitavecchia, et alibi.

14. BLITVM (*virgatum*) capitellis sparsis lateralibus. *Linn. Hort. Upsal.* 3.

Blitum foliis triangularibus dentatis, calycibus.

baccatis, capitulis summis foliosis. *Linn. Hort. Cliff.* 495. *Roy Lugbd.* 206.

Atriplex sylvestris morifructu. *C. B. P.* 519.

Ad Centumcellas.

15. BLITVM (*baccatum*) repens foliis triangularibus integerrimis, calycibus baccatis, in spicam dense stipatam terminatis.

Ad Flumicinum.

Est emolliens, refrigerans et humectans. *Boerh. Hist. Plant. Tom. II.* 549.

CLASSIS II.

DIANDRIA

DIANDRIA MONOGYNIA

IASMINVM

16. IASMINVM (*officinale, vulgo* Gelsomino salvatico) foliis oppositis pinnatis. *Linn. Hort. Cliff.* 5.

Iasminum vulgatius flore albo. *C. B. P.* 397.

Vegetat multis in locis, etiam ad sepes.

17. IASMINVM (*fruticans, vulgo* Gelsomino giallo) foliis alternis ternatis simplicibusque, ramis angulatis. *Linn. Hort. Cliff.* 5. *Hort. Vps.* 5. *Roy. Lugbd.* 397. *Savu. Monsp.* 174.

Iasminum, luteum vulgo dictum, bacciferum. *C. B. P.* 298.

Habitat ad puteum Pantaleo.

Est Planta aperiens, resolvens, emolliens. *Boerh. Hist. Plant. Tom. I.* 295.

L I G V S T R V M

18. LIGVSTRVM (*vulgare*, *vulgo* Gelsomino) foliis oblongo-ovatis, acuminatis integerrimis.

Ligustrum *Linn. Hort. Cliff.* 6. *Dalib. Paris.* 2.
Ligustrum germanicum. *C. B. P.* 475.

Juxta sepes perennat.

19. LIGVSTRVM (*serratum*, *vulgo* Olivella) foliis oblongo-ovatis acuminatis in ambitu serratis.

In sylvosis di Maccarese.

Ad Spinas ventosas, ut vulgo dicuntur, mirabile.

Adstringentem virtutem possidet; ejus decoctum in oris morbis, scorbuto, et diarrhaea convenit. *Boerh. Hist. Plant. Tom. I.* 182.

P H I L L Y R E A

20. PHILLYREA (*media*) foliis ovato-lanceolatis subintegerrimis. *Linn. Hort. Vps.* 5.

In loco vulgo Inzuecherata.

Phillyrea Ligustrifolia. *C. B. P.* 476.

21. PHILLYREA (*angustifolia*, *vulgo* Fili-

ca e Filonio) foliis lineari-lanceolatis integerrimis. *Linn. Hort. Cliff.* 4. *Roy. Lugbd.* 398.

Phillyrea angustifolia prima. *C. B. P.* 476.

Phillyrea angustifolia secunda. *C. B. P.* 476.

Ad locum vulgo Piperno.

22. PHILLYREA (*latifolia* , *vulgo* Filonio.) foliis cordato ovatis , serratis . *Linn. Hort. Cliff.* 4. *Hort. Vpsal.* 6. *Roy. Lugbd.* 398.

Phillyrea latifolia spinosa. *C. B. P.* 476.

Phillyrea folio in ambitu crenato. (*a*)

Phillyrea folio leviter serrato. *C. B. P.* 476.

Habitat ad Privernum , et ad Ceccanum etc.

Ad corpus purgandum etc,

O L E A

23. OLEA (*europaea* , *vulgo* Olivi ; *fructus* Olive domestiche *denominantur*:) foliis lanceolatis , fructu in racemos laxos dispertito.

Olea foliis lanceolatis , ramis terretiusculis. *Lin. Hort. Cliff.* 4. *Mat. Med.* 10. *Roy. Lugbd.* 398.

Olea sativa. *C. B. P.* 472.

Perennat in campania tiburtina, ad Setiam, et Coram, et multis aliis in locis.

24. OLEA (*sativa*) fructibus singularibus , foliis lanceolatis.

Vegetat ut supra.

25. OLEA (*racemosa*, *vulgo* Olivi con frutti fatti a modo di rampazzi) foliis lanceolatis, fructibus racemosis, ramis deorsum inversis.

Olea praecox, fructu minori rotundo. (*a*)

Olea fructu majori. (*b*)

Olea fructu racemoso mediae magnitudinis, frigoris impatientissima. (*c*)

Vivit in locis ut supra: (a) (b) (c) in districtu viterbiensi abundantissime.

26. OLEA (*tetragona*, *vulgo* Olivo salvatico) foliis lanceolatis, ramis tetragonis. *Lin. Hort. Cliff.* 4. *Roy. Lugbd.* 399.

Olea sylvestris folio duro, subtus incano. *C. B. P.* 472.

Folia harum arborum sunt adstringentia et vulneraria. Ex baccis elicitur oleum emolliens, anodynum, resolvens et detergens. *Boerh. Hist. Plant. Tom. I.*

Ad Centumcellas, nempe Civitavecchia.

SYRINGA

27. SYRINGA (*vulgaris*, *vulgo* Sciringa turchina) foliis ovato-cordatis. *Lin. Hort. Cliff.* 6. *Hort. Upsal.* 6. *Roy. Lugbd.* 397.

Syringa caerulea. *C. B. P.* 398.

Syringa eadem flore albo (*a*)

Cicurata.

28. SYRINGA (*persica*) foliis lanceolatis integris omnibus.

Syringa foliis lanceolatis integris dissectisque. *Lin. Hort. Cliff.* 6. *Hort. Vpsal.* 6.

Syringa foliis partim cum impari pinnatis, partim lanceolatis integris. (*a*)

Syringa foliis pinnatifidis impari lanceolato, maximo. (*b*)

Ad Aluvianicum. (a) (b)

C I R C A E A

29. CIRCAEA (*lutetiana*) caule erecto, racemis pluribus. *Lin. Flor. Svec.* 6. *Circaea Hort. Cliff.* 7. *Roy. Lugbd.* 303.

Solanifolia, Circaea dicta major. *C. B. P.* 168.

Circaea (*canadensis*) latifolia flore albo. *Ins. R. H.* 301. (*a*)

Vivunt in monte Mario etc.

30. CIRCAEA (*alpina : Rizzotomi* Circaea *vocant:*) caule ascendente, racemo unico. *Flor. Svec.* 7.

Solanifolia, Circaea alpina. *C. B. P.* 163.

Habitat in loco nuncupato l' Inzuccherata.

V E R O N I C A

S P I C A T A E

31. VERONICA (*spuria*, *vulgo* Veronica, ed Erba Thee) foliis ternis aequaliter serratis. *Lin. Hort. Vpsal.* 7.

Veronica spicata angustifolia. *C. B. P.* 246.

Veronica mas surrecta elatior. *Barr. rar.* 155. *t.* 891.

Ad montem viridem.

32. VERONICA (*maritima*) spicis terminalibus, foliis ternis inaequaliter serratis. *Flor. Svec.* 2. *N.* 8.

Veronica floribus spicatis, foliis ternis. *Flor. Svec.* 6. 1. *p.* 6.

Ad pontem Galeram.

33. VERONICA (*longifolia*) spicis terminalibus, foliis oppositis lanceolatis serratis acuminatis. *Hort. Vps.* 7.

Veronica spicata latifolia. *C. B. P.* 246.

Veronica prima erectior latifolia. *Clus. Hist.* 1. *p.* 546.

Habitat ad Maglianellam.

34. VERONICA (*spicata*) spica terminali, foliis oppositis crenatis obtusis, caule ascendente simplicissimo. *Flor. Svec.* 2. *n.* 10.

Veronica spicata minor. *C. B. P.* 247.

Ad domunculam Mathei.

35. VERONICA (*hybrida*) spicis terminalibus, foliis oppositis obtuse serratis scabris, caule erecto. *Flor. Svec.* 2. *n.* 11.

Veronica spicata cambro-britanica, Bugulae subhirsuto folio. *Rai Syn.* 3. *p.* 278. *tab.* 11. *f.* 1.

Vegetat non procul a Castro vulgo Marino.

36. VERONICA (*officinalis*, *vulgo* Erba Thee ob usum etc.) spicis lateralibus pedunculatis foliis oppositis, caule procumbente. *Flor. Svec.* 2. *n.* 12.

Veronica mas supina et vulgatissima. *C. B. P.* 246.

Ad domunculam Mathei, et ad sylvam vulgo Fajola, et aliis multis in locis etc.

Veronica officinalis ad pituitam debellandam, et detergenda viscera laudatur; sicuti valet ad pulmonum vitia, ad scorbutum, phthysin, calculum, si cum Glycyrrhiza decoquatur; si in aqua ebulliente infundatur, odore et sapore et omni dote refert Thee chinensium, ejusque effectus habet.

Boerrhavius asserit hac planta centenos morbos curasse: nam vim habet pituitosum, viscosum et oleosum solvendi. *Boerh. His. Plant. T. I.* 305.

37. Veronica (*sagittata*) foliis astato-sagittatis, spica aphylla.

Ad domunculam Mathei.

CORYMBOSO-RACEMOSAE

38. VERONICA (*aphylla*) corymbo terminali, scapo nudo.

Veronica foliis ovatis radicalibus, caule nudo. *Roy. Lugbd.* 302.

Veronica alpina pumila, caule nudo. *Boc. Mus.* 2. *p.* 17. *Tab.* 1. *et* 9.

Veronica parva saxatilis, cauliculis nudis. *Pluk. Almag.* 384. *Tab.* 114. *fig.* 3. *Seguier. Veron.* 241. *t.* 3. *f.* 2.

Chamaedrys alpina minima hirsuta. *C. B. P.* 247.

Vivit ad Civitatem Castellanam.

39. VERONICA (*bellidioides*) corymbo terminali, caule adscendente diphyllo.

Veronica caule non ramoso, floribus congestis terminato, foliis ovatis subasperis. *Hal. hel.* 531. 12 *f.* 1.

Veronica alpina Bellidis folio. *C. B. P.* 247 *Prodr.* 116.

Ad planum duarum turrium.

40. VERONICA corymbo terminali, foliis oppositis serrato-dentatis, calycibus linearibus.

Bonarota. Michel. *Gen.* 19. *t.* 15. *f.* 12.

Pederota. *Lin. Gen. Plant.* 11.

Chamaedrys alpina saxatilis. *C. B. P.* 248.

Ad montem Sorat.

41. VERONICA (*alpina*) corymbo terminali, foliis oppositis, calycibus hispidis. *Lin. Flor. Svec.* 15.

Veronica caule inferne procumbente fruticoso, foliis ovatis oppositis, racemo terminali. *Roy Lugbd.* 302.

Virescit ad Setiam.

42. VERONICA (*serpillifolia*) racemo terminali subspicato, foliis ovatis glabris crenatis. *Flor. Svec.* 2. *n.* 16.

Veronica foliis inferioribus oppositis ovatis, superioribus alternis lanceolatis, floribus solitariis. *Lin. Hort. Cliff.* 9.

Veronica pratensis Serpilli folio. *C. B. P.* 247.

Ad Marinum etc.

43. VERONICA (*beccabunga*) foliis oppositis laevibus crenatis, floribus racemosis lateralibus. *Roy Lugbd.* 302.

Veronica foliis oppositis laevibus crenatis, floribus laxe spicatis ex alis. *Lin. Hort. Clif.* 8.

Anagallis aquatica major minorque, folio subrotundo. *C. B. P.* 252.

Fere ubique ubi currunt aquae.

Veronica, vulgo beccabunga blandum possidet alkali urinosum, quod acidum scorbuticorum egregie temperat; et hac de causa prae caeteris in scorbuto, vulgo calido dicto, convenit.

In febribus, ac phlogosibus scorbuticorum, decoctum, et succus ejus expressus etiam in jusculis cum fructu usurpatur. *Bucvald.*

44. VERONICA (*vulgo* Beccabunga) foliis oppositis fere connatis integerrimis, floribus ex foliorum alis in spicam corymbosam laxam prodeuntibus.

Fere ubique ubi antecedens vitam vivit.

Vsitatissima in jusculis antiscorbuticis etc.

45. VERONICA (*anagallis*) racemis lateralibus, foliis lanceolatis serratis, caule erecto. *Dalib. Paris.* 7.

Veronica foliis oppositis laevibus crenatis, flo-

ribus laxe spicatis ex alis. *Gron. Virg.* 4.
Veronica major aquatica, folio oblongo. *C. B. P.* 252.

Ad lacunas Pontinas, et multis aliis in locis.

46. VERONICA (*scutellata*) racemis lateralibus, pedicellis pedunculis, foliis linearibus integerrimis. *Dalib. Paris.* 7. *Flor. Svec.* 6. 17.
Veronica aquatica angustifolia scutellata. *C. B. P.* 252.

Habitat ad Ostiam.

47. VERONICA (*debilis*) racemis lateralibus, foliis ovatis rugosis dentatis, caule debili. *Dalib. Par.* 4.
Chamaedrys spuria minor rotundifolia. *C. B. P.* 249.

Ubi antecedens, et etiam ad montem viridem.

48. VERONICA (*latifolia*) racemis lateralibus, foliis cordatis rugosis dentatis, caule stricto.
Veronica pratensis omnium maxima. *Bux. Cent.* 1. *p.* 23. *t.* 34.
Chamaedrys spuria major latifolia. *C. B. P.* 248.

Ad Castrum novum.

49. VERONICA (*stipata*) racemis lateralibus dense stipatis, foliolis sagittato-cordatis.

Habitat ad Castrum novum.

50. VERONICA (*agrestis*) pedunculis unifloris, floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo brevioribus. *Dalib. Par.* 6. *Lin. Flor. Svec.* 17. 20.

Veronica foliis cordatis crenatis, floribus solitariis pedunculatis. *Roy. Lugbd.* 303.

Alsine Chamaedryfolia, flosculis pediculis oblongis insidentibus. *C. B. P.* 250.

Ad Castrum.

51. VERONICA (*arvensis*) floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo longioribus. *Dalib. Par.* 5.

Alsine Veronicae foliis, flosculis cauliculis adhaerentibus. *C. B. P.* 250.

Ad Vitrucchianum.

52. VERONICA (*hederaefolia*) floribus solitariis, foliis cordatis planis quinque lobis. *Dalib. Paris* 6. *Flor. Svec.* 18. 21.

Veronica foliis alternis cordatis quinquelobis, floribus solitariis. *Roy Lugbd.* 303.

Alsine Hederulae folio. *C. B. P.* 250. *Tabern. Hist.* 1088.

Veronica chia Cymbalariae folio verna, flore albo, umbilico virescente. *Tour. Cor.* 7. *Bux. Cent.* 1. *p.* 25. *t.* 39. *f.* 1. Semina sunt vere umbilicata. *(a)*

Habitant ad Flumicinum, et nonnullis aliis in locis,

53. VERONICA (*triphyllos*) floribus solitariis, foliis digitato-partitis pedunculo brevioribus. *Dalib. Par.* 6.

Veronica foliis alternis inferioribus quinquepartitis, superioribus tripartitis, floribus solitariis. *Lin. Hort. Cliff.* 9 *Roy. Lugbd.* 302.

Veronica triphyllos caerulea. *C. B. P.* 250.

Ad montem Marium.

54. VERONICA (*romana*) floribus solitariis subsessillibus, foliis oblongis subdentatis, caule erecto. *Linn. Spec. Plant.* 31. *f.* 19.

55. VERONICA (*acinifolia*) minima, Clinopodii minoris folio glabro, Romana. *Boc. Mus.* 2. *pag.* 29. *t.* 102. *Vaill. Paris* 201. *t.* 23. *f.* 3. *Rai Suppl.* 423.

Ad montem Rotundum, ad montem Gentilem.

56. VERONICA (*polygonifolia*) floribus solitariis sessilibus, foliis lanceolato-linearibus glabris obtusis integerrimis. *Linn. Flor. Svec.* 15.

Veronica terrestris annua, folio Polygoni, flore albo. *Moris. Hist. p.* 322. *s.* 3. *T.* 24. *f.* 19.

Ad montem Sorat.

57. VERONICA (*cordata*) foliis cordato-crenatis, nec non crenulatis, floribus e foliorum alis confertis.

Ad pontes Ostiae.

GRATIOLA

58. GRATIOLA (*conferta*) foliis integerrimis sublanceolatis, floribus pedunculatis confertis.

Ad pontes Ostiae.

59. GRATIOLA (*officinalis*, *vulgo* Graziola, o gratia Dei,) floribus pedunculatis, foliis lanceolatis serratis. *Linn. Mat. Med.* 18.

Gratiola. *Riv. mon.* 157.

Gratiola centauroides. *C. B. P.* 279.

Prope Reatem.

Ad purgandum ἄνω καί κάτω a colonis usitata.

PINGVICVLA

60. PINGVICVLA (*vulgaris*) nectario cylindraceo longitudine petali. *Linn. Flor. Lapp.* 11. *Flor. Svec.* 21. 25. *Roy Lugbd.* 304.

Sanicula montana flore calcari donato. *C. B. P.* 243.

Ad locum vulgo Casa Broda.

VTRICVLARIA

61. VTRICVLARIA (vulgaris, *vulgo* Millefolio aquatico; et Riz. Millefolio aquatico minore) nectario carinato. *Linn. Flor. Svec.* 25. 29. (Sed potius dicendum erit conico nectario.) *Roy. Lugbd.* 304.

Lentibularia. *Riv. mon.* 78.

Millefolium aquaticum lenticulatum. *C. B. P.* 141.

Ad stagna vivit.

62. VTRICVLARIA (*minor*) nectario carinato. *Linn. Flor. Svec.* 25. 29.

Millefolium palustre galericulatum minus. *Pluk. Alm.* 251. *T.* 99. *f.* 6.

Apparine aquis innatans trevisana, foliis Perchepier capreolis donata. *Boc. Mus.* 1. *p.* 23. *T.* 4.

Ad aquas stagnantes vegetat.

VERBENA

DIANDRAE DISPERMAE

63. VERBENA (*jamaicensis, vulgo* Verbena con fiori di color azzurro, e foglia quasi rotonda) diandria spicis longissimis carnosis subrotundis.

Verbena foliis obtuse ovalibus, spica carnosa nuda. *Roy Lugbd.* 327.

Verbena folio subrotundo serrato, flore caeruleo. *Sloan. Hist.* 171. *T.* 107. *f.* 1.

Vsitatissima in febribus intermittentibus etc.

Iuxta sepes luxuriat etc.

64. VERBENA (*sthoecadifolia*) diandria spicis ovatis, foliis lanceolatis serrato-plicatis, caule fruticoso. *Roy Lugbd.* 327.

Sherardia nodiflora, sthoecadis serrati folio. *Vaill. Sex.* 49.

Lavandula foliis crenatis latioribus americana frutescens. *Plum. Spec.* 6. *Icon.* 162. *f.* 1.

Ad pontem Galera.

TETRANDRIAE TETRASPERMAE

65. VERBENA (*nodiflora*) tetrandria, spicis capitato-conicis, foliis serratis, caule repente. *Flor. Zeyl.* 399.

Verbena foliis verticaliter ovatis, spicis solitariis ovatis. *Roy Lugbd.* 327.

Verbena caule repente, foliis oblongis superne crenatis, pedunculis solitariis capitatis. *Gron. Virg.* 7. *(a)*

Verbena nodiflora, (*vulgo verbena*). *C. B. P.* 269. *Prodr.* 125.

Ad Turrim Paternam. (a) Ad Castrum Romano.

66. VERBENA tetrandria, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule solitario. *Flor. Svec.* 2. *n.* 30.

Verbena tetrandria, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule cespitoso. *(a)*

Verbena communis, flore caeruleo. *C. B. P.* 269.

Verbena recta. *Dod. Pempt.* 150.

Iuxta agrorum argines, et vias campestres (*a*), cum praecedenti.

Ad obstructiones lienis, et in febribus specifica, ut etc.

67. VERBENA (*officinalis*, *vulgo* verbena) foliis multifido-laciniatis, spicis filiformibus. *Hort. Cliff.* 11. *Roy Lugbd.* 327.

Verbena comunis flore caeruleo. *C. B. P.* 269.

(Dantur varietates flore albo, vel rubro.)

Fere ubique.

Deobstruens et antifebrilis.

LYCOPVS

68. LYCOPVS (*europaeus*) foliis sinuato-serratis. *Flor. Svec.* 2. *n.* 31.

Lycopus foliis indivisis. *Flor. Svec.* 1. *n.* 27. *Dalib. Paris.* 9.

Lycopus. *Hort. Cliff.* 11. *Roy Lugbd.* 326.

Marrubium palustre glabrum. *C. B. P.* 230.

Sideritis. *Matth. Dalech. Hist.* 1117.

Ad fluvium et torrentes.

In intermitente febri specificus.

CVNILLA

69. CVNILLA (*thymoides*) foliis ovalibus integerrimis, floribus verticillatis, caule tetragono. *Linn. Sp. Pl.* 1. *p.* 31..

Thymus pulegioides. *Sp. Pl.* 1. *p.* 592.

Acinos Thymi folio et facie, floribus inexpan-

sis . *Moris. Hist.* 3. *p.* 404. *f.* 11. *T.* 19. *f.* 6.

Ad Fajolam et Selvettum etc,

ROSMARINVS.

70. ROSMARINVS (*officinalis vulgo* Rosmarino e ramerino) *Hort. Cliff.* 14. *Roy Lugbd.* 310.

Rosmarinus angustissimo folio, flore albo. (*a*)
Varietas flore caeruleo. (*b*)

Rosmarinus lato et nonnihil cordato folio, flore roseo. (*c*)

Rosmarinus spontaneus latiore folio. *C. B. P.* 217.

Rosmarinus hortensis angustiore folio. *C. B. P.* 217. (*d*)

Vivit juxta mare. (a) (b) (c) (d) cum praecedenti.

Anthystericus et emmenagogus.

SALVIA

71. SALVIA (*aegyptiaca*) foliis leneari-lanceolatis denticulatis, floribus pedunculatis. *Hort. Cliff.* 13. *Roy Lugbd.* 309.

Horminum aegyptium minimum ramosissimum. *Lippi Boerh. Lugbd.* 1. *p.* 66.

Ad Castrum Guidi,

72. SALVIA (*officinalis*) foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis. *Hort. Cliff.* 12. *Hort.*

Upsal. 10. *Savu. Mons.* 143. *Roy. Lugbd.* 307.

Salvia major. *C. B. P.* 237.

Salvia minor aurita et non aurita. *C. B. P.* 237. (*vulgo* Salvia minore) (a)

Salvia (*vulgo Salvia macchiata*) foliis variegatis ex subviridi et luteo. (b)

Salvia foliis variegatis ex viridi et atro purpureo. (c)

In Insula Sacra (a) cum praecedenti, Cicuratae (b) (c)

Calefaciens et spiritus excitans.

73. SALVIA (*pomifera*) foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus obtusis. *Hort. Cliff.* 12. *Roy. Lugbd.* 307.

Salvia cretica frutescens pomifera, foliis longioribus incanis et crispis. *Tour. Coroll.* 10. *Itin.* 1. *p.* 92. *t.* 92.

Salvia baccifera. *C. B. P.* 237.

Ad turrim Paterna.

74. SALVIA (*colorata*) foliis ovato-lanceolatis et profunde crenatis, floribus spicatis, calycibus acuminatis et coloratis.

Ad Neptunnum.

75. SALVIA (*viridis*) foliis oblongis crenatis, corollarum galea semi-orbiculata, ca-

lycibus fructiferis reflexis. *Linn. Spec. Plant. n.* 7. *p.* 34.

Horminum coma viridi. *Tour. Ins.* 178.

Salvia foliis ovato-oblongis obtusis aequaliter crenatis, corollarum galea semi-orbiculata. *Linn. Hort. Upsal.* 11.

Ad Neptunnum et ad Terracinam.

76. SALVIA (*Horminum*) foliis obtusis crenatis, bracteis summis sterilibus majoribus coloratis. *Roy. Lugbd.* 310. *Linn. Hort. Cliff.* 12. *virid. Cliff.* 4.

Horminum sativum *C. B. P.* 238.

Ad Terracinam.

77. SALVIA (*haematodes*, *vulgo* Ormino macchiato di sangue) foliis cordato-ovatis rugosis tomentosis, calycibus hispidis, radice tuberosa. *Linn. Spec. Plant.* 11. *p.* 35.

Horminum sanguineum Asphodeli radice. *Triumf. obs.* 69. *T.* 69.

Horminum sylvestre maculatum tuberosum. *Honuphr.*

Horminum sylvestre majus haematodes glabrum, flore caeruleo italicum. *Barr. rar.* 234. *T.* 185.

Ad Setiam et ad tres fontes.

78. SALVIA (*pratensis*, *vulgo* Ormino vol-

gare) foliis oblongo-cordatis crenatis, summis amplexicaulibus, verticillis subnudis, corollis galea glutinosis. *Linn. Flor. Svec.* 2. *n.* 32.

Salvia foliis ovatis inciso-crenatis, verticillis subnudis. *Roy. Lugbd.* 310. *Dalib. Par.* 10.

Horminum pratense foliis serratis. *C. B. P.* 238.

Ubique habitat, in pratis signanter.

Ad expedienda loca tumida valet, et est planta vulneraria.

79. SALVIA (*lacunosa*) foliis oblongo-cordatis crenatis et sinuosis nec non lacunosis.

Gallitricum Sylvestre flore majore albo. *C. B. Hist.* 3. *p.* 312.

Ad planum duarum Turrium.

80. SALVIA (*verbenaca*, *vulgo* Ormino con le frondi tagliate) foliis serratis sinuatis, corollis calyce angustioribus. *Linn. Virid. Cliff.* 17. *Roy Lugbd.* 309. *Gron. Virg.* 8. *Dalib. Par.* 9. *Savu. Monsp.* 278.

Horminum sylvestre Lavandulae flore. *C. B. P.* 239. *Rai. Hist.* 545.

Horminum sylvestre minus inciso folio, flore azureo. *Barr. Icon.* 208.

Horminum Verbenacae laciniis angusti folium. *Triumph. Obs.* 66. *T.* 66.

Ad montem Viridem.

81. SALVIA (*hispanica*) foliis ovatis obtusis sinuatis et profunde crenatis, basibus tuberosis, calyce florum bifido et trifido.

Sclarea hispanica. *Taber. Hist.* 764. *Icon* .374.

Ad turrim vulgo di Valle.

82. SALVIA (*glutinosa*) foliis hastato-sagittatis serratis.

Salvia foliis cordato-sagittatis serratis acutis. *Roy. Lugbd.* 308. *Savu Monsp.* 146.

Horminum luteum glutinosum. *C. B. P.* 238.

In locis vulgo Inzuccherata, e Fajola.

83. SALVIA (*sclarea*, *vulgo* erba per piaghe) foliis rugosis oblongo-cordatis serratis, floribus calyce longioribus concavis acuminatis. *Roy. Lugbd.* 309. *Dalib. Par.* 9.

Salvia foliis cordato-ovatis obscure undulatis, foliolis floralibus lanceolato-concavis. *Guet.* 263.

Orvala. Dod. Pempt. 292.

Horminum Sclarea dictum *C. B. P.* 238.

Ad Farnesium.

Aperiens et anthysterica etc.

84. SALVIA (*aethiops*) foliis oblongis dentato-angulatis hirsutis, verticillis lanatis. Labium inferius corollae antice cohaeret et sacculum efformat.

Salvia foliis lanceolatis sinuato-dentatis, floralibus verticillos comprimentibus. *Roy Lugbd.* 308. *Hort. Cliff.* 13.

Aethiops foliis sinuosis. *C. B. P.* 241.

Cicurata.

DIANDRIA

DIANDRIA DIGYNIA

ANTHOXANTHVM

85. ANTHOXANTHVM (*odoratum*) spica ovato-oblonga, flosculis subpedunculatis arista longioribus. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 40.

Anthoxanthum flosculis diandris. *Roy. Lugbd.* 58. *Hort. Cliff.* 25.

Anthoxanthum. *Dalib. Par.* 10. *Flor. Svec.* 29. 33.

Gramen pratense spica flavescente. *C. B. P.* 3. *Scheuz. Gram.* 88.

Ad Centumcellas.

86. ANTHOXANTHVM (*paniculatum*) floribus paniculatis. *Amoen. Acad.* 1. *p.* 145.

Gramen sparteum panicula flavescente. *Rudb. Elys.* 1. *f.* 14.

Ad Centumcellas.

CLASSIS III.

TRIANDRIA

TRIANDRIA MONOGYNIA

VALERIANA

87. VALERIANA (*rubra*) floribus monandris caudatis, foliis lanceolatis integerrimis. *Roy Lugbd.* 235. *Dalib. Paris:* 12. *Hort. Cliff.* 15. *et Vps.* 14.

Valeriana (*rubra, vulgo dicta* Valeriana con li fiori rossi.) *C. B. P.* 165. (*a*)

Valeriana (*alba, vulgo dicta* Valeriana con li fiori bianchi. (*b*)

Ad moenia Vrbis, et alibi sicuti (a) (b)

88. VALERIANA (*cornucopiae* ; *Rizzot. vulgo* Valerianella) floribus diandris ringentibus, foliis ovatis sessilibus. *Roy. Lugbd.* 235. *Hort. Cliff.* 15. *et Vpsal.* 13.

Valeriana peregrina purpurea albave. *C. B. P.* 164. *Prodr.* 87.

In Sabinis.

89. VALERIANA (*corymbosa*) floribus monandris corymbosis, foliis radicalibus astato-laciniatis, caulinis integerrimis.

Ad montem Nigrum.

90. VALERIANA (*tuberosa*) foliis pinnatis, cum impari maximo lanceolato, radice tuberosa, floribus triandris.

Juxta mare.

91. VALERIANA (*dioica*) floribus triandris dioicis, foliis pinnatis integerrimis. *Linn. Spec. Pl.* 1. 44.

Valeriana dioica. *It. cel.* 46. *Dalib. Paris.* 11. *Flor. Svec.* 31. 35.

Valeriana foliis caulinis pinnatis sexu distincta. *Linn. Hort. Cliff.* 16.

Valeriana foliis caulinis pinnatis polygama. *Linn. Virid. Cliff.* 5. *Roy. Lugbd.* 235.

Valeriana palustris minor et Valeriana palustris inodora parum laciniata. *C. B. P.* 86.

Valeriana alpina minor. *C. B. P.* 165. *Prod.* 87. *(a)*

Prope Reatem (a) cum praecedenti.

92. Valeriana (*lucida*, *vulgo* Valeriana con le frondi lustre.) foliis radicalibus ovatis integerrimis, caulinis cum impari pinnatis, omnibus splendentibus.

Palumbariae.

93. VALERIANA (*officinalis*, *vulgo* Valeriana) floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. *Roy. Lugbd.* 234. *Dalib. Paris.* 11. *Hort. Cliff.* 15.

Valeriana sylvestris major. *C. B. P.* 164.

Vegetat alla Magliana e alla Fajola, multisque aliis in locis montosis.

94. VALERIANA (*phu*; *Rizzot.* Valeriana e Phu delle Spezierie) floribus triandris, foliis caulinis pinnatis, radicalibus indivisis, pedunculo alato. *Hort. Vpsal.* 13.

Valeriana foliis infimis integris, proximis laciniatis, caulinis pinnatis. *Roy. Lugbd.* 234.

Valeriana *hortensis*. *C. B. P.* 164.

Ad Hortam.

In psasmodicis, hystericis, epilepticis summum specificum etc.

95. VALERIANA (*pyrenaica*) floribus triandris, foliis caulinis cordatis serratis petiolatis, summis ternatis. *Roy. Lugbd.* 235. *Hort. Cliff.* 15.

Valeriana maxima pyrenaica Cacaliae folio. *T. I. R. H.* 131.

Valeriana Canadensis. *Riv. Mon.* 6.

Valeriana orientalis Alliariae folio, flore albo. *Bux. Cent.* 2. *p.* 19. *t.* 11.

In Sabinis et ad Castrum novum.

96. VALERIANA (*locusta*) floribus triandris, caule dichotomo foliis linearibus integris.

Valeriana floribus triandris, caule dichotomo, foliis ovato-connatis integris. *(a)*

Valeriana floribus triandris, caule dichotomo, foliis oblongis connatis et crenatis. (b)
Valeriana semine stellato *C. B. P.* 165.
Valeriana (*dentata*) caule dichotomo, foliis oblongis subserratis, seminis corona tridentata. *Hall. hel.* 666. *Dalib. par.* 12. (c)
Locusta major. *Riv. mon.* 6.

Juxta la Cosimata (a) (b) (c) juxta Prata.

97. VALERIANA (*mixta*) floribus triandris, caule quadrifido, foliis imis bipinnatifidis, seminis pappo plumoso. *Savu. Monsp.* 275.
Valerianella semine umbilicato hirsuto minore. *Moris. Vmbell.*

In loco vulgo la Cosimata, et alibi prope prata.

Hypocondriacorum et in scorbuto summum est solamen.

98. VALERIANA (*saxatilis*) floribus triandris, foliis subdentatis, radicalibus ovatis, caulinis lineari-lanceolatis. *Lin. Spec. Plan. I.* 46.
Valeriana alpina nardo celticae similis inodora. *Pluk. Alm.* 380. *t.* 232. *f.* 2.

Ad Januarium montem etc.

POLYCNEMVM

99. POLYCNEMVM (*vaginatum*) erectum foliis stipulatis, stipulis caulem vaginantibus.

Ad montem Sorat.

CROCVS

100. CROCVS (*sativus*) spatha univalvi-radicali, corollae tubo longissimo. *Linn. Spec. P.* 1. *p.* 50.

Crocus floribus fructui impositis tubo longissimo. *Roy. Lugbd.* 41. *Hort. Vpsal.* 15. *Mat. Med.* 27.

Crocus (*officinalis*, *vulgo* Zafrano domestico) autumnalis, sativus. *Moris. Hist.* 2. *p.* 335. *f.* 4. *t.* 2. *f.* 1. *(a)*

Crocus vernus angustissimo folio, flore vario, spatha monophylla, radice olivaris. *(b)*

Cicuratus -sed (a) (b) ad Villam madama, et alibi
Anodyna, hypnotica, aperiens, alexiterica.

ROMVLEA

101. ROMVLEA (*ixia*) spatula unica ad florem.

(E Bulbillo tunicato perbrevis scapus exit, parum a terra egrediens, qui a basi usque ad medietatem a spatha amplexatur. In summitate dicti scapi elongatur calyx monophyllus cucullatus persistens ovato oblongus apice acuminatus embrionem et florem amplectens simul cum spatula unica membranacea ovata opposita. Florem lia-

leum habet cujus tubus simplex perbrevis, in limbo sexfidus erectus, laciniis ovato-oblongis concavis aequalibus. Filamenta tria subulata, corollae dimidio breviora in petalorum basi inserta. Antherae oblongae sagittatae erectae didymae basi divisae. Germen ovatum oblongum. Stylus filiformis erectus, stamina quasi per medietatem superans, in summitate trifidus, et in quavis divisione per dichotomiam subdivisus: unde merito dici potest sexdivisus. Stigmata simplicia subrotunda. Embrio abit in fructum oblongum et quasi cylindraceum trivalvem et sexlocularem. Semina plurima orbiculata. Folia plantam ornantia longa angustaque sunt; ex una parte rotundata, ex altera e rotundo planiuscula, quae cum Croci foliis quamdam affinitatem primo intuitu praebent. Vnde ex dictis Romulea nostra differt ab aliis suis congeneribus etc.)

Romulea spatula unica ad florem, simul cum calyce florem amplexante, in basi calycis duabus foliolis alternis cincto.

Sisyrinchium minus angusti folium, flore majore variegato, *B. C. P.* 41.

Sisyrinchium asprensium angusto folio alterum. *Col. Ecph.* 2. *p.* 5. *t.* 7. *f.* 1.

Bulbocodium crocifolium flore magno albo, fundo luteo. *Tour. Corol.* 50.

Romulea flore albo. *(a)*

Romulea flore ex albo et violaceo mixto. *(b)*

Romulea flore ex violaceo et luteo variegato. *(c)*

Romulea flore parvo variegato etc.

Romulea flore intense violaceo. *(d)*

Extra portam Portuensem (a) (b) (c) (d) simul cum antecedentibus, ad circum Carachallaea, extra ianuam D. Sebastiani et alibi.

GLADIOLVS

102. GLADIOLVS (*communis vulgo* bocca di Leone) caule simplicissimo, foliis ensiformibus. *Roy Lugbd.* 19.

Gladiolus floribus uno versu dispositis. *B. C. P.* 41.

Gladiolus vulgaris flore rubro. *(a)*

Et flore albo. *(b)*

Ad agros (a) (b) cum praecedenti et etiam ad montem Rotundum, et alibi.

103. GLADIOLUS (*spicatus*) foliis linearibus, caule simplicissimo, floribus spicatis. *Roy. Lugbd.* 19.

Ad montem Rotundum.

ANTOLYZA

104. ANTHOLYZA (*ringens*) stamine unico declinato . *Spec. Pl.* 1. *p.*37.

Gladiolo aethiopico similis planta angustifolia . *Comm. Hort.* 1. *T.*41. *Rudb. Elys.* 2. *p.* 237. *f.* 15.

Gladiolus floribus rictum referens coccineus, suprema lacinia erecta et fistulosa . *Brey. Ic.* 21. *T.* 8. *f.* 1.

Ad Hortam .

105. ANTHOLYZA (*aethiopica*) staminibus omnibus ascendentibus.

Cunonia floribus sessilibus spathis maximis . *Burn. cun.* 221. *T.* 1.

Gladiolus aethiopicus flore coccineo . *Corn. Canad.* 79. *t.* 79. *Moris. Hist.* 2. *p.* 421. *s.* 4. *T.* 23. *f.* 1. *Rudb. Elys.* 2. *p.* 236. *f.* 14.

Cum antecedenti .

IRIS

BARBATAE NECTARIIS PETALORVM REFLEXORVM

106. IRIS (*vulgo* Iride e Giagiolo) corollis barbatis , caule foliis longiore multifloro . *Roy. Lugbd.* 17.

Iris vulgaris germanica seu sylvestris . *C. B. P.* 30.

Iris hortensis latifolia. *C. B. P.* 31. *(a)*
Iris flore albo. *(b)*
Iris flore atro-violaceo. *(c)*

Ad castrum Novum ad Sannitos (a) (b) (c) et alibi; sicuti etiam ad moenia Vrbis.

107. Iris (*chamaeiris*) corollis barbatis, foliis caulem uniflorem superantibus.
Chamaeiris minor flore purpureo. *C. B. P.* 33.

Prope Albanum.

Aquam hydropicorum evacuat etc.

108. Iris (*florentina*) corollis barbatis, caule foliis altiore subifloro, floribus sessilibus. *Mill. Is.* 154.
Iris alba florentina. *C. B. P.* 31.

Ad moenia urbis, vineas etc.

IMBERBES PETALIS DEFLEXIS LAEVIBVS

109. IRIS (*pseudacorus*, *vulgo* Iride acquatica con i fiori gialli) corollis imberbibus, petalis interioribus stigmate minoribus, foliis ensiformibus. *Lin. Hort. Cliff.* 33.
Acorus adulterinus. *C. B. P.* 34. *Theat.* 634.
Iris palustris lutea.

Ad paludes fossos etc.

110. IRIS (*foetida*, *vulgo* Iride con odore di ricotta) corollis imberbibus, petalis internis longitudine stigmatis, foliis ensifor-

mibus. *Roy. Lugbd.* 18. *Dalib. Paris.* 13. *Sav. Monsp.* 41.

Gladiolus foetidus. *C. B. P.* 30.

Spathula foetida Xyris. *I. B. Hist.* 2. *p.* 731. *Dod. Pemt.* 247.

Varietas flore ex albo, ex nigro variegato. *(a)*

Flore ex viridi et nigro picto. *(b)*

Flore atro purpureo. *(c)*

Flore lacteo *(d)*

Ad nemora quasi undique (a) (b) (c) (d) et ad Maccharese.

111. IRIS (*tuberosa*, *vulgo* Iride con il gambo a quattro cantoni) corollis imberbibus, foliis tetragonis. *Roy Lugbd.* 18.

Iris tuberosa, folio anguloso. *C. B. P.* 40.

Hermodactylus folio quadrangulo. *Tour. Corol.* 50.

Multis in locis et signanter ad S. Crucem in Hierusalem.

112. IRIS (*sisyrinchium*) corollis imberbibus, foliis canaliculatis, bulbis geminis super impositis. *Linn. Spec. Plant.* 22. *p.* 59.

Sisyrinchium majus. *C. B. P.* 40. *Clus. Hist.* 1. *p.* 216.

Sisyrinchium medium. *C. B. P.* 41. *(a)*

Sisyrinchium minus. *Clus. Hist.* 1. *p.* 216. *(b)*

Ad Vetrucianum cum (a) (b)

TRIPETALAE

SCHOENVS

CVLMO TERETI

113. SCHOENVS (*mariscus, vulgo* Cipero senza odore) culmo tereti, foliis margine dorsoque aculeatis. *Dalib. Par.* 14. *Flor. Svec.* 35. 38.

Pseudo-Cyperus palustris, foliis et carina serratis. *Scheuchz. gram.* 375.

Cyperus longus inodorus germanicus. *C. B. P.* 14.

Ad Tiberim signanter.

114. SCHOENVS (*mucronatus*) culmo tereti nudo, spicis fasciculatis divaricatis, involucro triphillo subulato. *Lin. Spec. Pl.* 3. *p.* 63.

Scirpus culmo tereti, foliis tribus patulis flosculisque aggestis terminato. *Savu. Mons.* 9.

Scirpus maritimus capite glomerato. *I. R. P.* 46. *Scheuchz. gram.* 367.

Gramen cyperoides maritimum. *C. B. P. Theath.* 91.

Ad Tiberinas.

115. SCHOENUS (*nigricans*) culmo tereti nudo, capitulo ovato, involucri diphylli valvula altera subulata longa. *Dalib. Par.* 173.

Iuncus laevis minor panicula glomerata nigricante. *Moris. Hist.* 3. *p.* 233. *s.* 8. *t.* 10. *f.* 28.

Iunco affinis capitulo glomerato nigricante. *Scheuchz. gram.* 349.

Ad Ostiam.

CVLMO TRIQUETRO

116. SCHOENVS (*compressus*, *vulgo* Scarzichella) culmo subtriquetro nudo, spica disticha, involucro monophyllo. *Linn. Spec. Plant.* 10. *p.* 65.

Cyperella montana spicata, radice repente, caule rotundo triquetro, spica fusca compressa disticha, semine cinereo. *Mich. gen.* 53.

Gramen cyperoides spica simplici compressa disticha. *Pluk. Alm.* 173. *Scheuchz. gram.* 490. *Rai Hist.* 1910. *Moris. Hist.* 3. *p.* 245.

Habitat cum praecedenti.

117. SCHOENVS (*nudus*) culmo subtriquetro nudo, spica simplici, involucro diphyllo, foliis irregularibus.

Cum praecedenti.

CYPERVS

CVLMO TERETI

118. CYPERVS (*articulatus*) culmo tereti nudo articulato. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 66.
Cyperus culmo nudo articuloso. *Roy Lugbd.* 51.
Iuncus cyperoydes creberrime geniculatus, medulla farctus aquaticus, radice rubra tuberosa odorata. *Sloan. Jam.* 36. *Hist.* 1. *p.* 121. *t.* 81. *f.* 1.

Ad Ostiam vivit.

119. CYPERVS (*hispanus*) culmo triquetro folioso, umbella supra decomposita, spiculis umbellato-sessilibus. *Linn. Flor. Zeyl.* 37.
Gramen cyperoides maderospatanum panicula magis sparsa et speciosa. *Pluck. Alm.* 179. *t.* 192. *f.* 2.

Vbique vivit ad terras humectas.

120. CYPERVS (*officinarum longus*, *vulgo* Cipero le di cui radiche odorano) culmo triquetro folioso, umbella foliosa supra decomposita, pedunculis nudis, spicis alternis. *Roy Lugbd.* 50.
Cyperus odoratus radice longa, sive Cyperus officinarum. *C. B. P.* 14. *Scheuchz. gram.* 378. *Moris. Hist.* 3. *p.* 237. *s.* 8. *t.* 11. *f.* 13.

Cyperus longus cum Galanga congruit, sed non est tam acer.

In locis vulgo dictis la Magliana, Valle Riccia, Nemi, multisque aliis.

Vrinam movet, menstrua provocat etc.

121. CYPERVS (*rotundus esculentus*) culmo triquetro nudo, umbella foliosa, radicum tuberibus ovatis, zonis imbricatis. *Roy. Lugbd.* 51.

Cyperus rotundus esculentus angustifolius. *C. B. P.* 14. *Theath.* 222. *Scheuchz. gram.* 391. *Thrasi Bauh. Hist.* 2. *p.* 504.

In agro Romano habitat multis in locis, sicuti etiam alla Magliana, Fiumicino etc.

122. CYPERVS (*flavescens*, *vulgo* Sgarzichella) culmo triquetro nudo, umbella triphylla, pedunculis simplicibus, inaequalibus, spicis confertis lanceolatis.

Cyperus culmo triquetro nudo, panicula foliosa supradecomposita, spicis confertis distiche compressis. *Dalib. Par.* 14.

Cyperus minimus panicula sparsa flavescente. *Scheuchz. gram.* 385. *Hal. hel.* 246.

Cyperus minor pulcher panicula lata compressa subflavescente. *Moris. Hist.* 3. *p.* 239. *s.* 8. *t.* 11. *f.* 37.

Gramen cyperoides minus, panicula sparsa subflava. *C. B. P.* 6. *Theat.* 88. *t.* 88.

Crescit alla Ranella et alibi.

Planta infestissima.

123. CYPERVS (*papyrus*) culmo triquetro nudo, umbella simplici foliosa, pedunculis simplicissimis distiche spicatis. *Roy. Lugbd.* 50.

Cyperus omnium maximus papyrus dictus locustis minimis. *Mich. Gen.* 44. *T.* 19.

Cyperus enodis nudus, culmis e vaginis brevibus prodeuntibus, spicis tenujoribus. *Scheuch. gram.* 387.

Cyperus niloticus vel syriacus maximus papyraceus. *Moris. Hist.* 3. *p.* 239. *s.* 8. *t.* 11. *f.* 41.

Papyrus syriaca et siciliana. *C. B. P.* 19. *Theat.* 333.

Ad Ostiam.

124. CYPERVS (*repens nodosus* vulgo Sgarzica marittima) caule triquetro, spica simplici, involucro triphyllo longissimo, radice repente nodosa, ad singulos nodos novam plantam emittens vix uncialem, folia humi strata.

Ad ora maritima.

SCIRPVS

SPICA VNICA

125. SCIRPVS (*palustris*) culmo tereti nudo, spica subovata imbricata. *Dalib. Par.* 16.
Scirpus culmo nudo, spica terminali subovata. *Roy. Lugbd.* 48.
Scirpus equiseti capitulo majore. *Scheuchz. gram.* 360.
Iuncus palustris capitulo equiseti major. *C. B. P.* 12.
Ad Flumicinum.

126. SCIRPVS (*fluitans*) culmis teretibus nudis alternis, caule folioso flaccido.
Scirpus foliis linearibus planis alternatim fasciculatis, spica terminatis. *Guet. stamp.* 141.
Scirpus caule folioso flaccido, scapis alternis capitatis. *Roy. Lugbd.* 49. *Savu. Monsp.* 9.
Scirpus equiseti capitulo minori. *Scheuchz. gram.* 365. *t.* 7. *f.* 20.
Iuncellus capitulis equiseti minor fluitans. *C. B. P.* 12. *Prod.* 23. *Theath.* 187.
Gramen iunceum clavatum minimum. *Rai. Hist.* 1310. *Moris. Hist.* 3. *p.* 230. *s.* 8. *t.* 10. *f.* 31. *Pluk. Alm.* 180. *T.* 35. *f.* 1.
Ad Flumicinum.

CVLMO TERETI POLYSTACHIO

127. SCIRPVS (*lacustris*) culmo tereti nudo, spicis ovatis pluribus pedunculatis terminalibus. *Dalib. Paris.* 16.

Scirpus spicis copiosis. *Roy. Lugbd.* 48.

Iuncus maximus seu Scirpus major. *C. B. P.* 12. *Theath.* 178.

Ad Insulam Sacram.

128. SCIRPVS (*romanus*, *vulgo* Giunco appuntato che nasce vicino alli fossi) culmo tereti nudo, capitulo laterali conglobato, bractea reflexa. *Linn. Spec. Plant.* 11. *p.* 72.

Scirpus capitulo singulari, radice tomentosa. *Barr. rar.* 1249. *t.* 255. *f.* 3.

Scirpoides acutum maritimum capitulo glomerato solitario. *Scheuchz. gram.* 373. *Mich. gen.* 52.

Ad locum vulgo Inzuccherata.

129. SCIRPVS (*setaceus*, *vulgo* Giunco piccolo) culmo nudo setaceo, spicis lateralibus subsolitariis sessilibus. *Linn. Flor. Svec.* 2. *n.* 45. *It. Scan.* 227.

Scirpus culmo nudo setaceo, spicis pedunculatis. *Roy. Lugbd.* 49.

Scirpus omnium minimus, capitulo breviore. *Scheuchz. gram.* 358.

Iuncellus omnium minimus. *Moris. Hist.* 3. *p.* 232. *s.* 8. *t.* 10. *f.* 23.

Ad Marcis Simonis domum.

130. SCIRPVS (*nudus*) culmo nudo satis crasso, spicis lateralibus pedunculatis et pendulis.

Ad Flumicinum.

131. SCIRPVS (*polystachion*) culmo in apice folioso, foliolis longissimis carinatis, spicis ovalibus polystachiis.

Ad Flumicinum.

CVLMO TRIQVETRO

132. SCIRPVS (*mucronatus, vulgo* Giunco che nasce vicino al mare con il gambo triangolares) culmo triquetro nudo acuminato, panicula conglomerata nuda.

Scirpus culmo triquetro nudo acuminato laterali, spicis conglomeratis. *Lin. spec. Pl.* 13. *p.* 73.

Scirpo-Cyperus maritimus. *Mich. gen.* 47. *ord. c.* 2. 3.

Iuncus acutus maritimus, caule triangulo. *C. B. P.* 11. *Prodr.* 22. *Moris. Hist.* 3. *p.* 232. *s.* 8. *t.* 10. *f.* 20.

Ad Ostiam.

133. SCIRPVS (*maritimus*) culmo triquetro, panicula conglobata foliacea, spicularum

squamis trifidis intermedia subulata . *Dalib. Paris.* 15. *Flor. Svec.* 39. 47.

Cyperus culmo triquetro , panicula foliacea, pedunculis simplicissimis, spicis confertis. *Roy. Lugbd.* 50.

Cyperus panicula subsessili , capitulis subovatis . *Guett. stam.* 2. *p.* 414.

Cyperus rotundus inodorus Germanicus. *C. B. P.* 14. *Theat.* 215.

Cyperus rotundus inodorus anglicus . *C. B. P.* 14 (*Vulgo* Cipero con le radiche tonde senza odore .) *(a)*

Cyperus panicula compacta e spicis teretibus crassioribus composita. *Scheuchz. Hist.* 400. *(b)*

Gramen Cyperoides , panicula sparsa majus. *C. B. P.* 6. (*Vulgo* Gramiccia con le radiche nodose e spiche sparpagliate .) *(c)*

Scirpo - Cyperus palustris , radice repente inodora nodosa , panicula sparsa , capitulis majoribus . *Mich. gen.* 48. *(d)*

Juxta Tiberim.

134 SCIRPVS (*michelianus vulgo* Sgarzichella piccola) culmo triquetro , capitulo globoso , involucro polyphyllo longo . *Lin. spec. Pl.* 26. *p.* 76.

Cyperus Italicus omnium minimus . *Til. Pis.* 51. *Tab.* 20. *fig.* 5.

Juxta fluvium Tiberim , et signanter alla Renella .

ERIOPHORVM

135. ERIOPHORVM (*polystachion. vulgo* Gramiccia pelosa) culmis teretibus , foliis planis spicatis pedunculatis . *Dalib. Par.* 18. *Flor. Svec.* 44. 49.

Eriophorum spicis pendulis . *Roy Lugbd.* 51.

Gramen pratense, tomentosum , panicula sparsa . *C. B. P.* 4.

Crescit in Villa Madama , in Monte Mario et alibi .

136. ERIOPHORVM (*montanum vulgo* Giunco con la bambage) culmis nudis triquetris , spica pappo breviore . *Linn. Flor. Svec.* 46. 51.

Linagrostis juncea alpina , capitulo parvo , tomento rariore . *Scheuchz. gram.* 305. *t.* 7. *f.* 4.

Iuncus alpinus bombycinus . *C. B. P.* 12. *Prodr.* 6.

Pariter in Villa Madama et Monte Mario.

NARDVS

137. NARDVS (*stricta*) spica lineari. *Linn. Hort. Cliff.* 42.

Gramen sparteum iuncifolium . *C. B. P.* 5. *Scheuch. gram.* 90.

Centumcellis et locis sterilibus.

138. NARDVS (*gangitis*) spica recurva. *Linn. Spec. Plant.* 2. *p.* 78.

Nardus spuria narbonensis . *C. B. P.* 13.

Nardus gangitis spuria narbonensis . *Lob. Icon.* 84. *Moris. Hist.* 3. *p.* 257. *s.* 8. *Tab.* 13. *f. ultima.*

Civitavecchia.

139. NARDVS (*articulatus*) spica cylindrica articulata.

Nardus spica subulata disticha. *Roy. Lugbd.* 58.

Gramen loliaceum , spicis articulosis erectis. *Scheuch. gram.* 43.

Gramen loliaceum maritimum , spicis articulatis . *Moris. Hist.* 3. *p.* 182. *s.* 8. *Tab.* 5. *f.* 1.

Gramen myusuros erectum minimum arundinaceum. *Bocc. Mus.* 70. *t.* 59.

Habitat a Piperno.

140. NARDVS (*aristatus*) calycibus aristatis. *Govan.*

Gramen iunceum nodosum minimum capillare. *Barr. rar.* 106. *t.* 117. *f.* 1.

Vegetat Romae.

TRIANDRIA DIGYNIA

PHALARIS

141. PHALARIS (*canariensis*) panicula subovata spiciformi , glumis carinatis . *Linn. Hort. Vpsal.* 19.

Vide notam ad num. 182.

142. PHALARIS (*arundinacea*) major semine albo. *C. B. P.* 28.

Phalaris panicula oblonga ventricosa. *Lin. Spec. Plant.* 6. *p.* 80.

Phalaris panicula oblonga. *Dal. Paris.* 19.

Gramen aquaticum paniculatum Phalaridis semine. *Scheuch. gr.* 126.

Gramen arundinaceum spicatum. *C. B. P.* 6. *The.* 94.

Gramen aquaticum paniculatum latifolium. *C. B. P.* 6. *(a)*

Inter agros (a) a Malafede e Castel di Guido.
Semina valde aperientia.

P A N I C V M

S P I C A T A

143. PANICVM (*viride*) spica tereti, involucellis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus nervosis. *Lin. spec. Pl.* 5. *p.* 83.

Gramen alopecurides Madraspatanum, spica quasi geniculata molli. *Pluk. Alm.* 177. *t.* 190. *f.* 6.

Gramen paniceum, seu Panicum sylvestre, simplici spica.

Schauch. gram. 46.

Crescit a Castel di Guido, e a Mala Grotta.

144. PANICVM (*crus galli*) spicis alternis conjugatisque, spiculis subdivisis, glumis ari-

statis hispidis, rachi quinquangulari. *Flor. Svec.* 2. *n.* 55.

Panicum spicis alternis remotis declinatis compositis. *Roy. Lugbd.* 55. *Lin. virid. Cliff.* 7. *Dalib. Par.* 22.

Gramen paniceum spica divisa. *C. B. P.* 8. *Scheuch. gram.* 49. *Moris. Hist.* 3. *p.* 189. *s.* 8. *t.* 4. *f.* 15.

Gramen paniceum, spica divisa aristis longis armata. *C. B. P.* 8.

Dens caninus secundus. *F. B. Hist.* 2. *p.* 434.

Perennat a malagrotta.

Est aperiens et in humorum acredine convenit.

145. PANICVM (*polystachium*) spica multiplici divisa, aristis longissimis, foliis hirsutis.

Invenitur alla Crescenza.

146. PANICVM (*sanguinale*) spicis aggregatis, basi interiore nodosis, flosculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis.

Panicum spicis alternis oppositisque linearibus patentissimis muticis, flosculis alternatim binis, altero pedunculato. *Roy. Lugbd.* 55. *Gronov. Virg.* 154. *Dalib. Par.* 22.

Gramen dactylon folio latiore. *C. B. P.* 8. *Theat.* 114. *Scheuc. gram.* 101.

Gramen dactylon majus panicula longa e spi-

cis plurimis gracilioribus purpureis et viridibus mollibus constante. *Sloan. Iamaic.* 3. *Hist.* 1. *p.* 113. *t.* 70. *f.* 2. (*a*)

Panicum culmo geniculato, extremo geniculo undique spicis perpendicularibus et orizontalibus vestito. (*b*)

Ad Tiberim.

147. PANICVM (*dactylon et officinarum*, *vulgo* Gramiccia volgare) spicis digitatis patentibus basi interiore villosis, floribus solitariis, sarmentis repentibus. *Lin. Sp. Pl.* 14. *p.* 85.

Gramen dactylon folio arundinaceo majus aculeatum. *C. B. P.* 7.

Gramen dactylon radice repente seu officinarum. *Scheuch. gram.* 104.

Gramen legitimum. *Clus. Hist.* 2. *p.* 217.

Fere ubique.

Aperiens etc.

PHLEVM

148. PHLEVM (*pratense*) spica cylindrica longissima, culmo recto. *Roy. Lugbd.* 53. *Dalib. Paris.* 20.

Gramen typhoides maximum, spica longissima. *C. B. P.* 4. *Scheuc. gram.* 60.

Fere ubique.

149. PHLEVM (*alpinum*) spica ovato-cylindracea. *Dalib. Paris.* 20.

Gramen typhoides alpinum, spica brevi densa et velut villosa. *Scheuch. gram.* 64.

Extat ad planum duarum Turrium.

150. PHLEVM (*arenarium*) spica ovata ciliata, caule ramoso. *Roy. Lugbd.* 54.

Gramen typhinum maritimum minus. *Pluk. Alm.* 177. *t.* 33. *f.* 8.

Extat ibidem.

151. PHLEVM (*schoenoides*) spicis ovatis obvolutis, foliis brevissimis mucronatis amplexicaulibus. *Lin. Spec. Plant.* 5. *p.* 88.

Gramen maritimum typhinum, brevi et crassiori spica ad singula genicula prodeunte. *Scheuch. gram.* 86.

In eodem loco.

ALOPECVRVS

152. ALOPECVRVS (*pratensis*) culmo spicato erecto, glumis villosis. *Roy. Lugbd.* 54. *Flor. Svec.* 52. 59. *Dalib. Par.* 21.

Gramen phalaroides majus seu italicum. *C. B. P.* 4.

Gramen alopecuro simile glabrum, cum pilis longiusculis in spica: *Onopordon. Plinii. Bauh. Hist.* 2. *p.* 475. (*a*)

Grameu typhoides spica angustiore. *C. B. P.* 4. . (*b*)

Ad Theatrum flavianum cum (a) (b)

Detergens et aperiens.

153. ALOPECVRVS (*geniculatus*) culmo spicato infracto. *Dalib. Par.* 20.

Alopecurus culmo infracto, aristis gluma longioribus. *Roy. Lugbd.* 54.

Gramen aquaticum geniculatum spicatum. *C. B. P.* 3. *Scheuch. Gram.* 72.

In Theatro flaviano, vulgo Colosseo.

154. ALOPECVRVS (*racemosus*) culmo spicato, spica racemosa, aristis longissimis.

Ad ripas Tiberis.

155. ALOPECVRVS (*monspeliensis*) panicula villosa oblonga folio involuta. *Savu. Monsp.* 37.

Gramen alopecurum majus, spica longiore. *C. B. P.* 4. *Theat.* 57. *Scheuch. gram.* 154.

Gramen alopecurum majus, spica virescente divulsa. *Barr. Icon.* 115. *f.* 1.

Cauda vulpis monspeliensium: Alopecurus. *Theophrasti. Lob. Icon.* 45.

Fere ubique in macris et sterilibus.

Apertiens et detergens.

MILIVM

156. MILIVM (*effusum*) floribus paniculatis

dispersis muticis. *Flor. Svec.* 55. 61. *Dalib. Paris* 23.

Gramen sylvaticum, panicula miliacea sparsa. *C. B. P.* 8. *Theat.* 141. *Scheuch. gram.* 133. *Moris. Hist.* 3. *s.* 8. *Tab.* 5. *f.* 10.

In collibus Marii.

157. MILIVM (*confertum*) floribus paniculatis confertis. *Roy. Lugbd.* 57.

Gramen paniculatum alpinum latifolium, panicula miliacea sparsa. *Scheuch. gram.* 134. *Hal. hel.* 220.

Ad nemus Madamae.

AGROSTIS

ARISTATAE

158. AGROSTIS (*spica venti*) petalo exteriore exserente aristam rectam strictam longissimam. *Roy. Lugbd.* 59. *Flor. Svec.* 58. 62.

Gramen segetum altissimum, panicula sparsa. *Scheuch. gram.* 144.

Gramen capillatum. *I. B. His.* 3. *p.* 462.

Prope Ponzanum.

159. AGROSTIS calycum squama, exteriore aristata longiore, interiore acuminata mutica. *Roy. Lugbd.* 59.

Prope Civitellam.

160. AGROSTIS (*canina, vulgo* Gramigna *cum antecedentibus et sequentibus*) calyci-

bus coloratis, petalorum arista dorsali recurva, culmis prostratis subramosis. *Flor. Svec.* 1138. 65.

Gramen paniculatum supinum, ad infima culmorum genicula foliorum capillarium geniculis fasciculatis donatum. *Scheuch. gram.* 141.

Gramen supinum caninum paniculatum folio varians. *C. B. P.* 1. *Thea.* 12.

Fere ubique.

Radices ingrediuntur cataplasmata resolventia et emollientia.

161. AGROSTIS (*latifolium*) flosculis aristatis gemellis, altero sterili, terminalibus ternis. *Savu. Monsp.* 35.

Gramen paniculatum latifolium, locustis crassioribus, semine nigro Aquilegiae simili. *T. I. R. H.* 522.

Gramen avenaceum paniculatum gallo-provinciale Aquilegiae semine. *Moris. Hist.* 3. *p.* 214. *n.* 29. *Pluk. Alm.* 174. *t.* 33. *f.* 2. (*a*)

Fere ubique (a) ad muros.

162. AGROSTIS (*tridentata*) flosculis aristatis, aristis tridentatis seu cuspidatis.

(Culmus vix sex uncias longus, panicula inversa, foliis carinatis, aristis singulis in apice bifidis, et in singulo flosculo tribus rigidis.)

Ad Portam Nettunni.

ARISTIS CARENS

163. AGROSTIS (*stolonifera*) culmo repente, vagina supremi folii ventricosa. *Roy. Lugbd.* 59. *Dalib. Paris.* 23.

Gramen caninum supinum minus. *Scheuch. gram.* 128.

Iuxta vias.

Detergens et aperiens.

164. AGROSTIS (*capillaris*) panicula capillari patente, calycibus subulatis aequalibus hispidiusculis coloratis, flosculis muticis. *Roy Lugbd.* 59. *Dalib. Paris* 23.

Gramen montanum panicula spadicea delicatiore. *Scheuchz. gram.* 129. *C. B. Prodr.* 12.

Vide notam ad numerum 182.

165. AGROSTIS (*minima*) panicula mutica filiformi. *Lin. spec. Pl.* 11. *p.* 93.

Gramen spartum capillaceo folio minimum. *Dill. app.* 173.

Gramen minimum, paniculis elegantissimis. *Bauch. Pin.* 2. *Scheuch. gram.* 40. *Moris. Hist.* 3. *p.* 300. *s.* 8. *t.* 2. *f.* 10.

Nardus panicula spicata, floribus solitariis alternis. *Guett. stamp.* 155. *Dalib. Par.* 155.

Prope Castrum in Samnitos.

A I R A

MVTICAE

166. AIRA (*cristata*) panicula spicata, floribus muticis pedunculo longioribus, glumis acuminatis inaequalibus. *Roy. Lugbd.* 61. *Dalib. Paris.* 27.

Gramen spica cristata subhirsutum. *C. B. P.* 13 *Prodr.* 8. *Moris. Hist.* 3. *p.* 194. *s.* 8. *t.* 4. *f.* 7. *Scheuch. gram.* 166.

Ad duas Turres.

167. AIRA (*caerulea*) foliis planis, panicula coarctata, floribus pedunculatis muticis convoluto-subulatis. *Dalib. Part.* 26. *Linn. Flor. Svec.* 71. 67.

Poa spiculis subulatis, panicula rara contracta. *Roy. Lugbd.* 61.

Gramen arundinaceum minus enode sylvaticum. *C. B. P.* 7. *Theat.* 97. *Scheuch. gram.* 209.

Gramen pratense serotinum, panicula rara purpurascente. *Moris. Hist.* 3. *p.* 201. *s.* 8. *t.* 5. *f.* 22.

In eodem loco.

168. AIRA (*aquatica*) foliis planis, panicula patente, floribus muticis laevibus calyce longioribus. *Dalib. Paris.* 26. *Linn. Flor. Svec.* 66. 68.

Aira culmo inferiore repente, flosculis muticis calyce longioribus, altero pedunculato. *Roy. Lugbd.* 60.

Gramen aquaticum miliaceum. *Scheuc. gram.* 176. *Vaill. Paris.* 89. *t.* 17. *f.* 7.

Gramen caninum supinum paniculatum dulce. *C. B. P.* 2.

Prope Ardeam.

ARISTATAE

169. AIRA (*cespitosa*) foliis planis, panicula patente, petalis basi villosis aristatisque, arista recta brevi. *Linn. Flor. Svec.* 63. 70.

Gramen segetum panicula arundinacea. *Bauh. Pin.* 3. *Theat.* 35. *Scheuch. gram.* 244.

Gramen pratense paniculatum, locustis parvis splendentibus non aristatis. *T. Vaill. Paris.* 26.

Ad prata trium fontium.

170. AIRA (*flexuosa*) foliis setaceis, culmis subnudis, panicula divaricata, pedunculis flexuosis. *Dalib. Paris.* 26. *Linn. Flor. Svec.* 64. 71.

Gramen alpinum nemorosum paniculatum, foliis angustissimis, locustis splendentibus aristatis. *Scheuch. gram.* 218. *t.* 6. *f.* 1.

Gramen nemorosum, paniculis albis, capilla-

ceo folio. *C. B. P.* 7. *Prodr.* 14. *Moris. hist.* 3. *p.*300. *s.* 8. *t.* 7. *f.* 9.

Ad tres fontes Fajolam Nemi et alibi.

171. AIRA (*canescens*) foliis setaceis, summo spataceo paniculam inferne obvolvente. *Roy. Lugbd.* 60. *Fl. Svec.* 73. 74. *Dalib. Paris* 25.

Aira foliis setaceis, arista a basi glumarum calycem aequante. *Hort. Clif.* 495.

Gramen foliis junceis, radice jubata. *C. B. P.* 5. *Scheuch. gram.* 243.

Gramen sparteum variegatum. *C. B. P.* 5.

Habitat fere ubique.

172. AIRA (*praecox*) foliis setaceis, vaginis angulatis, floribus paniculato-spicatis, flosculis basi aristatis. *Hin. Scan.* 226. *Flor. Svec.* 2. *n.* 75.

Gramen minimum, spica brevi habitiore nostrum. *Scheuch. gram.* 219.

Gramen parvum praecox, panicula laxa canescente. *Raii. Angl.* 3. *p.* 407. *t.* 22. *f.* 2. *Pluk. Alm.* 177. *t.* 33. *f.* 9.

Fere ubique vivit.

173. AIRA (*caryophyllea*) foliis setaceis, panicula divaricata, floribus aristatis distantibus. *Linn. spec. Pl.* 14. *p.* 97.

Aira foliis subulatis, aristis a basi flosculorum

tortilibus, flosculo altero pedunculato. *Roy. Lugbd.* 60. *Dalib. Paris.* 26.

Gramen phalaroides, sparsa panicula, minimum angustifolium. *Barr. rar.* 1218. *t.* 44. *f.* 1.

Gramen paniculatum, locustis purpureo-argenteis annuum. *Raii. Angl.* 3. *p.* 407. *Moris. Hist.* 3. *p.* 200. *s.* 8. *t.* 5. *f.* 11.

Gramen paniculatum minimum molle. *Magn. Monsp.* 296. *Scheuch. gram.* 215.

Caryophyllus arvensis glaber minimus. *Bauh. Prodr.* 105.

Iuxta Tiberim et alibi.

MELICA

174. MELICA (*ciliata*) petalis exterioribus ciliatis.

Melica floribus orizontaliter patentibus. *Roy. Lugbd.* 57.

Gramen avenaceum montanum lanuginosum. *C. B. P.* 10.

Gramen avenaceum, spica simplici, locustis densissimis candicantibus et lanuginosis. *Scheuch. gram.* 174.

Multis in locis et signanter prope Templum D. Paule ad foveas.

175. MELICA (*barbata*) petalis integerrimis, flosculis rigidissimis, panicula multiplici barbata.

Collibus sterilibus.

176. MELICA (*nutans*) petalis imberbibus, panicula nutante simplici . *Linn. spec. Pl.* 2. *p.* 98.

Gramen montanum avenaceum, locustis rubris . *Bauh. Pin.* 10. *Prodr.* 20.

Gramen avenaceum, locustis rarioribus. *Bauh. Pin.* 10. *Prodr.* 20.

In montosis et saxosis.

P O A

177. POA (*aquatica*) panicula diffusa, spiculis sexfloris linearibus. *Dalib. Por.* 29. *Linn. Flor. Svec.* 73. 78.

Poa panicula contracta, spicis ovatis teretiusculis . *Roy. Lugbd.* 61.

Gramen palustre paniculatum altissimum . *Bauh. Pin.* 2. *Theat.* 38. *Scheuch. Gram.* 191.

Gramen aquaticum paniculatum latifolium. *Moris. Hist.* 3. *p.* 201. *s.* 8. *t.* 6. *f.* 25.

Ad rivulum Maglianae.

178. POA (*trivialis*) panicula subdiffusa, spiculis trifloris basi pubescentibus, culmo erecto tereti. *Dalib. Par.* 28. *Linn. Flor. Svec.* 78. 80.

Gramen pratense paniculatum medium. *C. B. P.* 2. *Scheuch. gram.* 180.

Habitat cum praecedenti.

179. POA (*angustifolia*) panicula diffusa, spiculis quadrifloris pubescentibus, culmo erecto tereti. *Dalib. Par.* 28. *Linn. Flor. Svec.* 77. 81.

Gramen pratense paniculatum majus, angustiore folio. *C. B. P.* 2. *Prodr.* 5. *Scheuch. gram.* 178.

Ad montem Marium.

180. POA (*pratensis*) panicula diffusa, spiculis quinquefloris glabris, culmo erecto tereti. *Dalib. Par.* 27. *Linn. Flor. Svec.* 76. 82.

Poa spiculis ovatis compressis muticis. *Roy. Lugbd.* 61.

Gramen pratense paniculatum majus, latiore folio. *C. B. P.* 2. *Scheuch gram.* 177.

(Vix specie differunt 170. 171. 172. 173.; sed potius variare inter se dici possunt.)

Habitat ad pratum Primae Portae.

181 POA (*annua*) panicula diffusa, angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso. *Dalib. Par.* 28. *Linn. Flor. Svec.* 75. 83.

Gramen pratense paniculatum minus. *C. B. P.* 2. *Theatr.* 31.

Gramen pratense paniculatum minus rubrum. *I. R. H.* 522.

Fere ubique vegetat.

182. POA (*pilosa*) panicula patente stricta, ramificationibus primariis pilosis. *Linn. Spec. Pl.* 9. 100.

Gramen paniculis elegantissimis majus, locustis purpureo-spadiceis minoribus. *Scheuch. gram.* 193.

(Indiscriminatim *Gramicce* vocantur varietates omnes.)

Iuxta Tiberim. Gramina omnia a Num. 135. usque ad Num. 253. inclusive fere ubique in agro Romano vivunt.

183. POA (*eragrostis*) panicula patente, pedicellis flexuosis, spiculis serratis decemfloris. *Linn. Spec. Plant.* 11. *p.* 100.

Gramen paniculis elegantissimis minimum. *Scheuch. gram.* 192.

Gramen phalaroides sparsa Brizae panicula minus. *Barr. Icon. t.* 44. *f.* 2.

Vide Superiorem notam.

184. POA (*tomentosa*) panicula sparsa, pedicellis flexis, spiculis integerrimis tomentosis pentafloris.

Ad Tiberim,

185. POA (*compressa*) panicula secunda coarctata, culmo obliquo compresso. *Flor. Svec.* 74. 84. *Dalib. Par.* 28.

Poa spiculis ovatis compressis muticis, pa-

nicula secunda coarctata. *Act. Stock.* 1741. *p.* 184.

Gramen murorum, radice repente. *Bauh. p.* 2. *Prodr.* 2.

Gramen paniculatum, radice repente, culmo compresso. *Vaill. Par.* 91. *t.* 18. *f.* 5.

Multis in locis.

Aperiens et diluens.

186. POA (*nemoralis*) panicula attenuata, spiculis subifloris mucronatis scabris, culmo incurvo. *Flor. Svec.* 2. *n.* 85.

Gramen sylvaticum, panicula tenui e raris locustis composita. *Dill. spec.* 57.

Gramen nemorosum, panicula laxa, radice repente. *Vaill. Par.* 90.

Gramen loliaceum alpinum, paniculis ex rarioribus et exiguis locustis compositum. *Mont. gram.* 39.

Gramen cirrhosa et villosa spongia ad singula genicula donatum paniculatum minimum alpinum. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 70. *t.* 59. *(a)*

In locis dictis Fajola, monte Cavo et Nemi.

087. POA (*bulbosa*) panicula secunda patentiuscula, spiculis quadrifloris. *Linn. spec. Plant.* 19. *p.* 102.

Poa culmorum basi tuberosa. *Guett. stam.* 1. *p.* 168. *Dalib. Paris.* 29.

Gramen xerampelinum, miliacea pertenui ramosaque panicula, seu xerampelino congener arvense aestivum, minutissimo semine. *Lob. Illust.* 14. *Scheuch. gram.* 185. (*a*)

Gramen arvense, panicula crispa. *C. B. P.* 3. *Barr. Icon.* 703. (*b*)

Gramen arvense angustifolium, panicula densa foliacea, foliolis in panicula angustissimis. *Scheuch. gram.* 211.

Gramen vernum, radice ascolonica. *Vaill. Paris.* 91. *t.* 17. *f.* 8.

Ad montem Marium, ad montem Cavum, alla Fajola etc.

B R I Z A

188. BRIZA (*minor*) spiculis triangulis, calyce flosculis septem longiore. *Roy. Lugbd.* 63.

Gramen tremulum minus, panicula parva. *C. B. P.* 2. *Prodr.* 4.

189. BRIZA (*media*) spiculis ovatis, calyce flosculis septem breviore. *Roy. Lugbd.* 63. *Linn. Hort. Cliff.* 23. *Flor. Svec.* 80. 86.

Gramen tremulum majus. *C. B. P.* 2. *Scheuch. gram.* 204.

In montanis pratis.

190. BRIZA (*maxima*) spiculis cordatis, flosculis septendecim. *Roy. Lugbd.* 63. *Hort. Cliff.* 23. *Hort. Upsal.* 20.

Gramen tremulum maximum. *C. B. P.* 2. *Scheuch. gram.* 202.

Habitat alla Fajola, a Grotta Lupara et alibi.

191. BRIZA (*eragrostis*) spiculis lanceolatis, flosculis viginti. *Linn. Spec. Plant.* 5.*p.* 103.

Briza panicula spicata, spiculis lanceolatis. *Guett. Stamp.* 1. 163.

Vniola calycibus diphyllis, spiculis ovato-lanceolatis. *Gron. Virg.* 136.

Gramen paniculis elegantissimis. *C. B. P.* 2. *Scheuc. gram.* 194. *Moris. Hist.* 3. *p.* 204. *s.* 8. *t.* 6. *f.* 52.

Gramen Eranthemum seu Eragrostis. *Barr. Rar. t.* 43.

Vivit ad montem Cavum et ad Palazzuolam.

192. BRIZA (*argentea*) spiculis ovatis flosculis tribus.

(Paniculae quatuor unciarum et ultra est altitudo. Spiculae vix duabus lineis longae sesquilineae latae, singulae triflorae. Culmus enodis, octo ad summum uncias altus. Panicula in perfecta maturitate est argentea; antea vero subargentea virens.)

Circa litus Ostiae Tiberinae.

DACTYLIS

193. DACTYLIS (*cynosuroides*) spicis sparsis secundis scabris numerosis. *Loefl. it.* 115.

Gramen maritimum, spica crassa dactyloide terminali, odore rancido, culmo albo. *Gron. Virg.* 135.

(Culmus arundinaceus bipedalis et tripedalis; calamus anterinus minor; crassa folia in culmo ad summum quatuor, et eo duplo longiora, hispida in margine, admodum scabra; spicae 5. 6. 7. 8. et ultra; secundae divergentes villosae, flosculis imbricatis latere postico teretibus; calycibus unifloris; carina scabris aristatis flosculo longioribus sessilibus; pistillis lanatis longissimis.)

Ad litus Mediterranei prope Maccharese.

194. DACTYLIS (*glomerata*) panicula secunda glomerata. *Linn. Flor. Svec.* 1. *n.* 87.

Cynosurus panicula secunda glomerata. *Linn. Flor. Svec.* 2. *n.* 85.

[Poa flosculis confertis uno versu dispositis. *Hort. Cliff.* 28. *Roy. Lugbd.* 62.

Gramen spicatum folio aspero. *Bauh.* 3. *Prodr.* 9. *Scheuch. gram.* 299. *Moris. Hist.* 3. *s.* 8. *t.* 6. *f.* 38.

Ad Tiberis ripas et ad campos etc.

CYNOSVRVS

195. CYNOSVRVS (*cristatus*) bracteis pinnatifidis. *Roy. Lugbd.* 64. *Hort. Cliff.* 493.

Gramen pratense cristatum seu spica crista-

ta seu spica cristata laevi. *C. B. P.* 2. *Prodr.* 8. *Scheuc. gram.* 79.

In pratis.

196. CYNOSVRVS (*echinatus*) bracteis pinnato-paleaceis aristatis. *Roy. Lugbd.* 64.

Gramen alopecuroides spica aspera. *C. B. P.* 4. *Scheuch. gram.* 80.

Gramen alopecurum spica aspera. *Barr. Rar. t.* 123.

In cultis et ruderatis.

197. CYNOSVRVS (*durus*) spiculis alternis secundis sessilibus rigidis obtusis adpressis. *Linn. spec. Pl.* 4. *p.* 105.

Gramen arvense, Polypodii panicula crassiore. *Barr. Rar.* 1213. *t.* 50.

In agrorum marginibus.

198. CYNOSVRVS (*coeruleus*) bracteis integris. *Roy. Lugbd.* 64. *Hort. Cliff.* 495. *Flor. Svec.* 82. 89.

Gramen glumis variis. *C. B. P.* 10. *Prodr.* 21. *Scheuch. gram.* 83.

Cum praecedenti et inter saxa.

199. CYNOSVRVS (*asper*) panicula subspicata, flosculis simplicibus biaristatis.

Panicum floribus conglomerato-spicatis laevibus, arista dimidio breviore. *Linn. Flor. Svec.* 54.

Panicum spica composita, aristis spica longioribus. *Roy. Lugbd.* 55. *(a)*

Panicum spiculis spicatis scabritiae adhaerentibus. *Linn. Hort. Cliff.* 27. *(b)*

Gramen Panicum spica aspera. *C. B. P.* 8. *Scheuc. gram.* 47.

Ad Ostia Tiberina (a) (b).

200. CYNOSVRVS (*aureus*) paniculae spiculis sterilibus pendulis, ternatis floribus aristatis. *Linn. Spec. Plant.* 10. *p.* 107.

Gramen Barcinonense panicula densa aurea. *T. I. R. H.* 523.

Gramen panicula pendula aurea. *C. B. P.* 3. *Theat.* 33. *Scheuch. gram.* 149.

Gramen Sciurum seu Alopecurum minus, heteromalla panicula. *Barr. Rar.* 1180. *t.* 4.

(Spiculae ternatae faetiferae, calyce bivalvi, valva una majori, minima altera, ambobus acuminatis involventibus glumas geminas subovatas bifidas.)

Inter saxa et ad ruderata montis Albani et alibi.

FESTVCA

PANICVLA SECVNDA

201. FESTVCA (*ovina*) panicula secunda coarctata aristata, culmo tetragono nudiusculo, foliis setaceis. *Linn. Flor. Svec.* 95. 91.

Poa foliis setaceis compressis, caulino latiore, panicula contracta foecunda, corollis acuminato-aristatis. *Act. Stokol.* 1741. *p.* 184.

Poa foliis setaceis, panicula ramosa, floribus petiolatis antrorsum spectantibus, glumis subulatis. *Roy. Lugbd.* 62.

Gramen foliis junceis brevibus majus, radice nigra. *Bauh. P.* 5. *Prodr.* 34. *Scheuch. gram.* 279.

Ad montem Gennarum et Fajolam.

202. FESTVCA (*vivipara*) panicula secunda, spiculis viviparis. *Flor. Svec.* 1. *n.* 94.

Gramen paniculatum sparteum alpinum, panicula angusto-spadiceo-viridi proliferum. *Scheuch. gram.* 213. *t.* 1. *Rai Angl.*3. *t.* 22. *f.* 1.

Ad montem Ciminum et montem Gennarum.

203. FESTVCA (*duriuscula*) panicula nutante inferne ramosa, spicis adscendentibus hispidis, foliis setaceis. *Roy. Lugbd.* 68.

Gramen pratense panicula duriore laxa unam partem spectante. *Rai Hist.* 1286. *Scheuch. gram.* 285.

Gramen tenue duriusculum et pene junceum. *Bauh. hist.* 2. *p.* 463.

Ad prata acciora.

204. FESTVCA (*amethystina*) panicula spicata, spiculis uno versu inclinatis submuticis. *Roy. Lugbd.* 68.

Gramen montanum foliis capillaribus longioribus, panicula heteromalla spadicea et velut amethystina. *Scheuch. gram.* 276.

Gramen paniculatum elatius spicis longis muticis squamosis. *Rai. Hist.* 1286. *Angl.* 3. *p.* 411.

In loco dicto Desertini.

205. FESTVCA (*myuros*) panicula spicata nutante, calycibus minutissimis muticis, floribus scabris longius aristatis. *Roy. Lugbd.* 68.

Gramen festuceum myurum minori spica heteromalla. *Barr. Ic. t.* 99. *f.* 1. *Scheuch. gram.* 194.

Gramen murorum, spica longissima. *Rai Angl.* 3. *p.* 415. *Hist.* 286. *Moris. Hist.* 3. *p.* 215. *s.* 8. *t.* 7. *f.* 43.

Ad montem Savellum et alibi.

206 FESTVCA (*maritima*) spica lineari secunda recta, floribus adpressis subaristatis. *Loesel. It.* 44.

Gramen exile duriusculum maritimum. *Scheuch. gram.* 272.

Ad clivos prope Nemi.

207. FESTVCA (*decumbens*) panicula erecta, spiculis subovatis muticis, calyce flosculis majore, culmo decumbente. *Flor. Svec.* 92. 93.

Gramen montanum avenaceum locustis muticis tumentibus pilosum. *Scheuch. gram.* 70.

Gramen avenaceum parvum procumbens, paniculis non aristatis. *Rai Angl.* 3. *p.* 408. *hist.* 1288. *Pluk. Alm.* 174. *t.* 34. *f.* 1. *Monti Prodr.* 53. *t.* 2. *f.* 1.

In pratis siccis.

208. FESTVCA (*elatior*) panicula secunda erecta, spiculis subaristatis exterioribus teretibus. *Linn. Flor. Svec.* 91. 94.

Festuca panicula spicata, spiculis uno versu inclinatis submuticis. *Roy. Lugbd.* 68.

Gramen pratense majus, locustis tumidis. *Bux. Cent.* 5. *p.* 41. *t.* 16. *(a)*

In pratis crassioribus.

209. FESTVCA (*fluitans*) panicula ramosa erecta, spiculis subsessilibus teretibus muticis. *Flor. Svec.* 90. 95.

Poa spiculis oblongis erectis. *Roy. Lugbd.* 62. *Hort. Cliff.* 28.

Gramen aquaticum fluitans, multiplici spica. *Bauh. P.* 41. *Theat.* 41. *Scheuch. gram.* 199.

Gramen loliaceum fluitans, spica longissima divisa. *Moris. hist.* 3. *p.* 183. *s.* 8. *t.* 3. *f.* 16.

Ad lacus Nemi et Castelli multisque in fossis agri nostri.

BROMVS

210. BROMVS (*secalinus*) panicula patente, spiculis ovatis, aritstis rectis. *Lin. Flor. Svec.* 84. 96.

Festuca culmo paniculato, spicis compresso-ovatis. *Lin. Flor. Lapp.* 28. *Roy Lugbd.* 67.

Festuca graminea, glumis hirsutis. *C. B. P.* 9. *The.* 143. *Scheuch. gram.* 250.

Gramen avenaceum segetale majus, gluma turgidiore. *Moris. hist.* 3. *s.* 8. *t.* 7. *f.* 17.

In agris multis in locis.

211. BROMVS (*squarrosus*) panicula nutante, spicis ovatis, aristis divaricatis. *Lin. Spec. Pl.* 3. *p.* 112.

Festuca graminea, glumis vacuis. *Scheuch. gram.* 251. *t.* 5. *f.* 11.

Gramen avenaceum, locustis amplioribus candicantibus glabris aristatis. *Ins. R. H.* 525.

Gramen phalaroides acerosum, nutante spica. *Barr. Icon.* 24. *f.* 1.

Gramen festuceum majus, locustis crassis, lanuginosis. *Bux. Cent.* 5. *p.* 19. *t.* 38. *f.* 1. (*a*)

Ad montem Cavum et ad Fajolam.

Deteregentia et resolventia semina etc.

212. BROMVS (*sterilis*) panicula patula, spiculis oblongis distichis, glumis subulato-aristatis. *Lin. Spec. Plant.* 6. *p.* 113.

Festuca avenacea sterilis elatior. *C. B. P.* 9. *Moris. Hist.* 3. *p.* 212. *s.* 8. *t.* 7. *f.* 11.

Gramen avenaceum panicula sparsa, locustis majoribus et aristatis. *Scheuch. gram.* 258.

Ad sylvas agrosque.

213. BROMVS (*tectorum*) panicula nutante, spiculis linearibus. *Flor. Svec.* 86. 98.

Gramen murorum, spicis pendulis angustioribus. *Tour. Paris.* 91.

Crescit ad rocca di Papa et alle Pentime sotto la Riccia.

214. BROMVS (*cristatus*) spiculis distiche imbricatis sessilibus depressis. *Amoen. Acad.* 2. *p.* 339.

Gramen triticeum, spica latiore compacta, cristatum. *Bux. Cent.* 1. *p.* 32. *t.* 50. *f.* 3.

Supra Palazzolam.

S T I P A

215. STIPA (*pennata*) aristis lanatis. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 115.

Festuca aristis paniculae circiter longitudine plumosis. *Roy. Lugbd.* 68.

Gramen spicatum aristis pennatis. *I. R. H.* 518. *Scheuch. gram.* 153.

Gramen sparteum pennatum. *Bauh. Pin.* 5. *Theat.* 70.

Spartum austriacum. *Clus. Hist.* 2. *p.* 221.

Vide notam ad num. 182.

216. STIPA (*avenacea*) aristis nudis, calycibus semen aequantibus. *Linn. Spec. Plant.* 5. *p.* 116.

Andropogon folio superiore spathaceo, pedunculis lateralibus oppositis unifloris, aristis flexuosis. *Gron. Virg.* 133.

(Culmi geniculati tenues, folium summum ventricosum longitudine paniculae, panicula coarctata, pedunculi conjugati, flosculi rubentes.)

Ad Supinum et Carpinetum.

AVENA

217. AVENA (*sibirica*) paniculata, calycibus unifloris, seminibus hirsutis, aristis calyce triplo longioribus. *Lin. Spec. Plant.* 1. *p.* 117.

Festuca glumis villosis, aristis calyce triplo longioribus. *Gmel. sibir.* 1. *p.* 113. *t.* 22.

Ad Sonninum.

218. AVENA (*elatior*) paniculata, calycibus bifloris, flosculo hermaphrodito mutico, masculo aristato. *Flor. Svec.* 98. 102.

Avena calycibus bifloris, panicula laxe spica-

ta, pedunculis prioribus fasciculatis. *Guett. stamp.* 1. *p.* 182.

Gramen avenaceum elatius, juba longa splendente. *Rai. Meth.* 779. *Angl.* 3. *p.*406. *Moris. Hist.* 3. *p.* 214. *s.* 8. *t.* 7. *f.* 37. *Sceuch. gram.* 239. *Hall. hel.* 225. (*a*)

Avena panicula nutante, calycibus bifloris, altero flosculo aristato. *Roy. Lugbd.* 66,

Gramen nodosum, avenacea panicula, radice tuberibus praedita. *Bauh. P.* 2. *Prodr.* 3. *Theat.* 18. *Scheuch. gram.* 237.

In locis vulgo Molella e torre di due Ponti.

219. AVENA (*villosa*) panicula contracta, flosculis binis hermaphroditis, seminibus villosis, arista dorsi contorta tereti.

(Gramen duas ulnas longus, culmi plures ex eadem radice, folia plana laevia, panicula admodum crassa spadicea, aristis terminalibus brevissimis, dorsi longissima.)

Ad aqua puzza.

Semina detergunt et resolvunt etc.

220. AVENA (*sativa*) paniculata, calycibus dispermis, seminibus laevibus. *Roy. Lugbd.* 65.

Avena nigra. *C. B. P.* 23. (*Vulgo* Biada o avena nereggiante.)

Avena alba. *C. B. P.* 23. (*Vulgo* avena bianca.)

Vegetat a Rocca secca a Pisterno et alibi,

221. AVENA (*fatua vulgo* Avena pelosa giallastra) panicula patente , calycibus trifloris, flosculis basi pilosis . *Lin. Flor. Svec.* 97.

Avena seminibus hirsutis . *Roy Lugbd.* 65.

Festuca utriculis lanugine flavescentibus . *C. B. P.* 10.

Gramen avenaceum , locustis lanugine flavescentibus . *Scheuch. gram.* 239.

Crescit ad Rocca secca et Supino .

222. AVENA (*flavescens* , *vulgo* Gramiccia simile alla vena o biade) panicula laxa , calycibus trifloris brevibus , flosculis omnibus aristatis . *Roy Lugdb* 66.

Gramen avenaceum pratense elatius, panicula flavescente locustis parvis . *Raii Angl.* 3. *p.* 407. *Hist.* 1284. *Scheuch. gram.* 223.

Gramen avenaceum, spica sparsa flavescente, locustis parvis . *Moris. Hist.* 3. *p.* 215. *s.*8. *t.*7. *f.* 42.

In pratis di Vallecorsa e Pisterno .

223. AVENA (*fragilis vulgo* Gramiccia simile al gioglio peloso) spicata,flosculis subquaternis , calyce longioribus . *Biennis. Lin. spec. Pl.* 10. *p.* 119.

Gramen loliaceum lanuginosum, spica fragili articulata, glumis pilosis aristatum . *Scheuch. gram.* 32.

Gramen loliaceum spurium hirsutum, aristis geniculatis. *Barr. Icon.* 905. *f.* 1. 2. 3. *(a)*

In agris.

224. AVENA (*pratensis*) spicata, calycibus quinquefloris. *Lin. spec. Plant.* 11. *p* 119.

Avena panicula spicata, spiculis cylindricis culmo appressis. *Guett. stamp.* 1. *p.* 182.

Avena spicis erectis calyce spiculis breviore. *Lin. Flor. Svec.* 96. 104. *(a)*

Avena calycibus trifloris, panicula nutante, foliis planis. *Gmel. sybir.* 1. *p.* 129. *(b)*

Gramen avenaceum montanum, spica simplici, aristis recurvis. *Raii Angl.* 3. *p.* 252. *T.* 21. *Scheuch. gram.* 226.

Gramen (*vulgo* Gramiccia simile all'avena di colore rossiccio e risplendente) avenaceum glabrum seu potius hirsutum, panicula purpureo-argentea splendente. *Raii Angl.* 3. *p.* 406. *t.* 21. *f.* 2.

Festuca dumetorum. *Bauh. Pin.* 20. *Prodr.* 19. *ex Vaill. Paris.* 89.

In apricis siccisque pascuis et ad Carpineto Rocca secca etc.

225. AVENA (*nutans*) calycibus eptafloris duobus hermaphroditis quinque sterilibus, panicula nutante amplissima.

Ad montem Lanicum et Sonninum.

LAGVRVS

226. LAGVRVS (*ovatus*,*vulgo* Gramiccia fatta a coda di volpe) spica ovata aristata. *Linn. Hort. Cliff.* 25.

Gramen alopecuroides spica rotundiore. *Bauh. P.*4. *Theat.* 56.

Gramen spicatum tomentosum longissimis aristis donatum. *Scheuh. gram.*58.

Lagurus spica cylindrica. (*a*)

Lagurus spica clavata (*b*)

Nascitur alle case nuove e alla Fajola.

ARVNDO

227. ARVNDO (*Donax*, *vulgo* Canna domestica) calycibus trifloris, panicula diffusa. *Roy. Lugbd.* 66.

Arundo sativa. *Linn. Virid. Cliff.* 7. *Hort. Cliff.* 26.

Arundo sativa: quae Donax Dioscoridis. *Bauh. P.* 17. *Theat.* 27.

Producitur a Fiumicino et ad Colliquias.

228. ARVNDO (*Phragmitis*, *vulgo* Canna volgare) calycibus quinquefloris, panicula laxa. *Roy. Lugbd.* 66. *Gronov. Virg.* 137.

Arundo panicula laxa, flosculis quinis. *Linn. Flor. Svec.* 99. 105.

Arundo panicula laxa, calycibus subbifloris. *Savu. Monsp.* 38.

Arundo vulgaris seu Phragmites Dioscoridis. *C. B. P.* 17. *Scheuch. gram.* 161.

Iuxta rivulos.

229. ARVNDO (*epigeios*, *vulgo* cannuccia per le scopette) calycibus unifloris, panicula erecta, foliis subtus glabris. *Linn. Spec. Pl.* 4. *p.* 120.

Arundo panicula coarctata erecta integra, foliis inferne glabris. *Linn. Flor. Svec.* 101. 106.

Gramen arundinaceum paniculatum montanum, panicula spadiceo-viridi, semine papposo. *Scheuch. gram.* 124.

Cum praecedenti.

230. ARVNDO (*pumila*) panicula sparsa, glumis bifloris, foliis vix duas lineas latis.

Ad stagna.

231. ARVNDO (*calamogrostis*) calycibus unifloris, culmo ramoso. *Roy. Lugbd.* 66. *Linn. Flor. Lapp.* 42. *Svec.* 100. 107.

Gramen arundinaceum, panicula molli spadicea, majus. *Bauh. P.* 7. *Theat.* 64. *Scheuch. gram.* 122. *t.* 3. *f.* 5.

Ad Flumicinum.

Radix est resolvens et emolliens.

232. ARVNDO (*arenaria*) calycibus uniflo-

ris, foliis involutis mucronato-pungentibus. *Linn. Spec. Pl.* 6. *p.* 121.

Arundo foliorum lateribus convolutis, acumine pungente. *Linn. Flor. Svec.* 102. 108.

Gramen sparteum spicatum, foliis mucronatis longioribus. *C. B. P.* 5.

Gramen spicatum secalinum maritimum maximum, spica longiore. *Scheuch. gram.* 138.

Iuxta rivulos et in arenosis Mediterranei.

233. ARVNDO (*argentea, vulgo* Cannuccia con la spazzola quasi di colore d'argento) calycibus bifloris, foliis serratis hispidis, panicula rigida argentea.

Cum praecedenti.

LOLIVM

234. LOLIVM (*perenne, vulgo* gioglio con le foglie e spighe strette) spica mutica, spiculis compressis multifloris. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 122.

Lolium spicis muticis. *Hort. Cliff.* 24. *Roy. Lugbd.* 69.

Lolium spicis compressis radice perenni. *Flor. Lapp.* 32.

Gramen loliaceum, angustiore folio et spica. *Bauh. P.* 9. *Theat.* 127. *Scheuch. gram.* 25.

Inter segetes.

235. LOLIVM (*molle*) spica mutica, glumis villosis, villis mollibus.

Cum praecedenti.

236. LOLIVM (*rigidum*, *vulgo* Gioglio peloso) spica mutica, glumis villosis, villis rigidis.

Cum praecedenti.

237. LOLIVM (*temulentum* , *vulgo* Gioglio con le spighe appuntate) spica aristata, spiculis compressis aristatis. *Linn. Spec. Pl.* 3. *p.* 122.

Lolium spicis aristatis, radice annua. *Roy. Lugbd.* 69. *Hort. Cliff.* 23.

Gramen loliaceum, spica longiore, seu Lolium Dioscoridis. *Bauh P.* 9. *The.* 121. *Scheuch. gram.* 31.

Lolium spicis aristatis in culmo adversis. *(a)*

Lolium spicis aristatis in culmo alternis laevibus. *(b)*

Lolium spicis aristatis, in culmo alternis rigidis et villosis. *(c)*

Lolium spicis aristatis, arista in apice tricuspidata. *(d)*

Ad agros.

Externe detergit attenuat etc.

ELYMUS

238. ELYMVS (*arenarius*) spica erecta ar-

cta, calycibus tomentosis flosculo longioribus. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 122.

Elymus foliis mucronato-pungentibus. *Linn. Iter. Scan.* 336.

Secale spiculis geminatis. *Flor. Svec.* 106. 111.

Triticum foliis acuminatis pungentibus. *Roy. Lugbd.* 71.

Gramen caninum maritimum, spica triticea nostras. *Raii hist.* 1256. *Scheuch. gram.* 6.

Crescit ad Flumicinum ad Turrim Vajanico et alibi ad littora maris Tyrrreni.

239. ELYMVS (*caput Medusae*) spiculis bifloris, involucris setaceis patentissimis. *Linn. Spec. Pl.* 6. *p.* 123.

Elymus involucris reflexo-patentibus. *Amoen. Acad.* 3. *p.* 21. *Linn.*

Avena lusitanica spicata caput Medusae referens. *Moris. hist.* 3. *p.* 210. *Raii Suppl.* 611.

Gramen hordeaceum, spica aristis longissimis circumvallata. *Scheuch. gram.* 20.

In locis maritimis.

SECALE

240. SECALE (*cereale*) glumarum ciliis scabris. *Linn. Hort. Vpsal.* 22.

Secale (*hybernum*) vel majus. *Bauh. P.* 22. *Theat.* 425.

Secale (*vernum*) sive minus. *C. B. P.* 23.

Secale (*villosum*) glumarum ciliis villosis, squamis calycinis cuneiformibus. *Linn. Spec. Plant.* 2. *p* 124.

Gramen spicatum secalinum, glumis villosis in aristas longissimas desinentibus. *T. I. R. H.* 518.

Gramen secalinum maximum. *Park. The.* 1144. (*Vulgo* Segala maggiore)

Gramen creticum spicatum secalinum, glumis ciliaribus. *Tour. Coroll.* 39. *Buxb. Cent.* 5. *p.* 21. *t.* 41.

Habitat locis montani.

Farina seminum est emolliens et detergens Panis optimus conficitur etc.

241. SECALE (*hirsutum, vulgo* Segala con le spighe appuntate) glumis hirsutis, squamis calycinis emarginatis et biaristatis.

Cum praecedentibus etc.

HORDEVM

242 HORDEVM (*vulgare, vulgo* Orzo volgare) flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, ordinibus duobus erectioribus. *Linn. Spec. Plant* 1. *p.* 125.

Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis, seminibus corticatis. *Linn. Hort. Vpsal.* 22.

Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis. *Roy Lugbd.* 69. *Linn. Hort. Cliff.* 24.

Hordeum flosculis omnibus hermaphroditis seminibus decorticatis. *Linn. Hor. Vpsal.* 23.

Seritur in Sabinis.

Humectans et detergens atque expectorans.

243. HORDEVM (*hexasticon*) flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, seminibus sexfariam aequaliter positis. *Linn. Hort. Vpsal.* 23.

Ad Case nuove.

244. HORDEVM (*marinum*) flosculis lateralibus masculis aristatis, involucris intermediis ciliatis. *Linn. Hort. Cliff.* 24. *Roy. Lugbd.* 69.

Gramen hordeaceum minus et vulgare. *Bauh. P.*9. *The.*134. *Scheuch. gram.*14. (*Vulgo* Gramiccia volgare con li vachi d'orzo.)

Gramen spicatum secalinum minus, *Scheuch. gram.* 17. *Vaill. Paris.* 83. *t.*17. *f.* 6. (*Vulgo* Gramiccia con li vachi di segala.)

Ad Carpinetum Normam et alibi, juxta et supra muros dirutos.

245. HORDEVM (*villosum*, *vulgo* Orzo salvatico peloso) flosculis binis binis hermaphroditis omnibus aristatis, aristis villosis.

Ad montem Lanico et prope amasenum.

TRITICVM

246. TRITICVM (*aestivum*, *vulgo* Grano estivo e gentile) glumis ventricosis glabris imbricatis aristatis integris.

Triticum radice annua, spica glabra aristata. *Roy. Lugbd.* 170.

Triticum aestivum. *C. B. P.* 21.

Triticum aristis longissimis et una cum glumis atro-ferrugineis, semine ovato turgido. *(a)*

Triticum aristis longissimis, et una cum glumis atro-ferrugineis, semine oblongo. *(b)*

Seritur.

247. TRITICVM (*hybernum*, *vulgo* Grano vernino e forte) glumis ventricosis laevibus imbricatis submuticis.

Triticum radice annua, spica mutica. *Roy. Lugbd.* 70.

Triticum hybernum aristis carens. *C. B. P.* 21.

Seritur ut supra.

248. TRITICVM (*turgidum*, *vulgo* Grano e Frumento con la spiga corta e di quattro cantoni) glumis ventricosis villosis imbricatis obtusis. *Linn. Hort. Vpsal.* 21.

Triticum radice annua, glumis villosis. *Roy. Lugbd.* 70.

Triticum spica villosa quadrata breviore et turgidiore. *Moris. Hist.* 3. *p.* 176. *S.* 8. *t.* 1. *f.* 14.

Seritur hoc etiam.

Ex farina seminis fit panis quem vulgo commedimus. Est anodina et suppurans in cataplasmatibus etc.

249. Triticum (*Spelta, vulgo* Spelta) calycibus truncatis quadrifloris, flosculis aristatis hermaphroditis, intermedio neutro. *Linn. Hort. Vpsal.* 21.

Hordeum flosculis lateralibus masculis muticis involucro destitutis. *Sauv. Monsp.* 39.

Zea Dicoccos vel Spelta major. *Bauh. P.* 22. *Theat.* 412. *t.* 414.

Seritur locis montanis.

250. TRITICVM (*distichum*) involucris unifloris, floribus aristatis, spica disticha. *Sauv. Monsp.* 39.

Hordeum distichum, spica nitida seu Briza nuncupatum. *I. R. H.* 513.

Zea Briza dicta seu Monococcos germanica. *C. B. P.* 21.

(A Num. 247. usque ad 251. sunt annualia Tritica descripta : sequentia vero sunt perennia.)

In locis ut supra et alibi,

251. TRITICVM (*repens*, *vulgo* Gramiccia volgare con le radiche serpeggianti ed infestissima alle campagne) calycibus subulatis trifloris acuminatis.

Triticum radice repente, foliis viridibus. *Roy. Lugbd.* 70. *Lin. H. Cliff.* 24. *Flor. Lapp.* 33. *Flor. Svec.* 105. 114.

Gramen caninum arvense sive gramen Dioscoridis. *C. B. P.* 1. *Scheuc. gram.*5.

Vegetat alle Case nuove Maenza et alibi juxta vias.

252. TRITICVM (*non repens* , *vulgo* Gramiccia con la spiga quasi di Grano) calycibus subulatis quadrifloris aristatis .

Gramen caninum non repens elatius, spica aristata. *Moris. hist.*3.*p.* 177. *s.* 8. *t.* 1.*f.* 2. *Buxb. Cent.* 4. *p.* 29. *t.* 50.

Gramen loliaceum , radice repente, seu gramen officinarum longioribus aristis donatum . *Vaill. Paris.* 81. *t.* 17. *f.* 2.

(Graminis spica triticea repentis , vulgaris varietas cum spica aristata. *Scheuch. gram.* 9.)

Iuxta vias .

Aperiens et detergens.

TRIANDRIA TRIGYNIA

ERIOCAVLON

253. ERIOCAVLON (*cylindraceum*) culmo cylindraceo ramoso , ramis dicothomis, calyce prolifero .

In paludoso di Maccarese .

MONTIA

254. MONTIA (*fontana*) . *Roy Lugbd.* 199. *Lin. Flor. Lapp.* 51. *Flor. Svec.* 108. 115.

Montia aquatica minor . *Mich. gen.*18. *t.* 13.*f.*2.

Cameraria arvensis minor . *Dill. giss.* 46.

Alsinoides annua verna. *Vaill. Paris. l. 3. f. 4.*

Alsine palustris Portulacae aquaticae similis. *Raii hist.* 1035. *Pet. herb. t.* 10. *f.* 12.

Portulaca arvensis. *C. B. P.* 288.

Vivit in loco vulgo malafede.

HOLOSTEVM

255. HOLOSTEVM (*umbellatum*) floribus umbellatis. *Loesel. t.* 120.

Spergula foliis oppositis, pedunculis umbellatis. *Dalib. Paris.* 134. *Guett. stamp.* 298.

Holosteum caryophyllaeum arvense. *Tabern. Icon.* 233.

Lychnis graminea hirsuta umbellifera. *Moris. hist.* 2. *p.* 546. *s.* 5. *t.* 22. *f.* 46.

Caryophyllus arvensis umbellatus, folio glabro. *C. B. P.* 210.

Prope arcem Pali et alibi.

MOLLVGO

256. MOLLVGO (*quadrifolia*) foliis quaternis ovatis, panicula dicothoma. *Roy. Lugbd.* 215.

Anthyllis marina alsinefolia. *C. B. P.* 282.

Antyllis alsinefolia polygonoides major. *Barr. Rar.* 103. *t.* 534.

Ad Ostia Tiberina.

257. MOLLVGO (*verticillata*) foliis verticillatis cuneiformibus acutis, caule subdiviso

decumbente, pedunculis unifloris. *Lin. Hort. Vps.* 24.

Mollugo foliis saepius septenis lanceolatis. *Gronov. virg.* 14.

Alsine Spergula mariana latiori folio, floribus ad nodos, pediculis curtis circa caulem insidentibus, calycibus eleganter punctatis. *Pluk. mant.* 9. *t.* 332. *f.* 5.

Alsine procumbens Galii facie. *Ehret. pict. t.* 6. *f.* 3.

Iuxta Arcem Pali.

Aperiens.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA

TETRANDRIA MONOGYNIA

GLOBVLARIA

258. GLOBVLARIA (*Alypum*) caule fruticoso, foliis lanceolatis tridentatis integrisque. *Roy. Lugbd.* 190.

Globularia fruticosa Myrti folio tridentato. *T. Garid. Aix* 210.

Alypum monspeliensium seu frutex terribilis. *I. B. Hist.* 1. *p.* 598. *Niss. Act.* 1712. *p.* 336. *t.* 18.

Thymelaea foliis acutis, capitulo Succisae. *C. B. P.* 463.

Ad montem Marium.

259. GLOBVLARIA (*vulgaris*, *riz.* vocant Bellide con fiore torchino ed anche Globularia turchina.) caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis, caulinis lanceolatis. *Dalib. Paris.* 43. *Linn. Flor. Svec.* 109. 116.

Globularia caule folioso, foliis ovatis integerrimis. *Roy. Lugbd.* 190. *Haller. Helv.* 667.

Aphyllantes Anguillarae. *Cam. Hort.* 18. *t.* 7.

Bellis caerulea, caule folioso. *C.B.P.* 262. (*a*)

Bellis caerulea apula. *Tab. Hist.* 2. *p.* 709. (*b*)

Bellis spinosa caerulea monspeliaca. *Tab. Hist.* 2. *p.* 709.

Ad Castrumnovum et juxta montem Sorat.

260. GLOBVLARIA (*spinosa*, *riz.* Bellide turchina e spinosa) foliis radicalibus crenato-aculeatis, caulinis integerrimis mucronatis. *Linn. Spec. Plant.* 4. *p.* 139.

Globularia spinosa. *T. I. R. H.* 476.

Bellis caerulea spinosa *C. B. P.* 262.

Bellis spinosa, flore globoso *C. B. Prodr.* 121.

Cum praecedenti et ad Supinum et alibi.

261. GLOBVLARIA (*cordifolia*, *riz.* scabiosa piccola con le foglie di bellide) caule subnudo, foliis cuneiformibus tricuspidatis, intermedio minimo. *Linn. Spec. Plant.* 5. *p.* 139.

Globularia foliis radicalibus cuneiformibus re-

tusis dentatis, denticulo intermedio minimo. *Roy. Lugbd.* 190. *Linn. Hort. Cliff.* 491.

Scabiosa Bellidis folio humilis, caule nudo, radice repente, folio cordato. *Moris. hist.* 3. *p.* 50. *s.* 6. *t.* 15. *f. ultima.*

Globularia alpina minima Origani folio. *I. R. H.* 467. (*a*)

Bellis caerulea montana frutescens. *C.B.P.* 262.

Scabiosa Bellidis folio pyrenaica minima. *Moris. Hist.* 3. *p.* 51.

Ad Palumbariam Supinum et Carpinetum.

262. GLOBVLARIA (*nudicaulis*) caule nudo, foliis integerrimis lanceolatis. *Linn. Spec. Pl.* 6. *p.* 140.

Globularia pyrenaica, folio oblongo, caule nudo. *Tour. I. R. H.* 467.

Scabiosa Bellidis folio humilis, caule nudo, radice non repente. *Moris. Hist.* 3. *p.* 50. *s.* 6. *t.* 15. *f.* 4.

Bellis caerulea, caule nudo. *C. B. P.* 262. *Raii Hist.* 281.

In arce Praenestina et alibi.

263. GLOBVLARIA (*tetragona*) caule tetragono alato et folioso, foliis cuneiformibus integerrimis decurrentibus.

Iuxta Velinum.

DIPSACVS

264. DIPSACVS (*fullonum* , *vulgo* labbro di Venere, *riz.* Dissaco e Scardalana) foliis sessilibus serratis. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 140.

Dipsacus foliis connato-perfoliatis, aristis fructus rectis. *Sauv. Monsp.* 156.

Dipsacus capitulis florum conicis. *Roy. Lugbd.* 188. *Dalib. Paris.* 44.

Dipsacus sylvestris aut Virga pastoris major. *C. B. P.* 385.

Dipsacus sylvestris. *Dod. Pempt.* 735.

Fere ubique.

265. DIPSACVS (*laciniatus*, *vulgo* Dissaco e Scardalana) foliis connatis sinuatis . *Linn. Spec. Plant.* 2. *p.* 141.

Dipsacus folio laciniato. *C. B. P.* 385. *Moris. Hist.* 3. *p.* 158. *s.* 7. *t.* 36. *f.* 4.

Ad Centumcellas.

266. DIPSACVS (*pilosus* , *vulgo* Dissaco e Scardalana minore) foliis petiolatis appendiculatis . *Roy. Lugbd.* 188. *Dalib. Paris.* 44. *Linn. Hort. Vpsal.* 25.

Dipsacus sylvestris, capitulo minore seu Virga pastoris minor *C. B. P.* 385.

Signanter Viterbii.

SCABIOSA

COROLLVLIS QVADRIFIDIS

267. SCABIOSA (*alpina*) corollulis quadrifidis aequalibus, floribus cernuis , foliis pinnatis, foliolis lanceolatis serratis. *Roy. Lugbd.* 188. *Lin. Hort. Cliff.* 30.

Scabiosa alpina , foliis Centaurei majoris. *C. B. P.* 270.

Scabiosa alpina centauroides. *Besl. Eyst. aest.* 122.

Vegetat in monte Gennaro.

268. SCABIOSA (*leucantha* , *vulgo* Scabbiosa grande con le frondi strette e fiore bianco) corollulis quadrifidis aequalibus, squamis calycinis ovatis obtusis , foliis pinnatifidis . *Roy. Lugbd.* 188. *Linn. Hort. Cliff.* 30. *Sauv. Meth.* 241.

Scabiosa flore globoso niveo . *C. B. P.* 207.

Scabiosa fruticans angustifolia alba . *C. B. P.* 270.

Prope Fellettinum.

269. SCABIOSA (*Succisa*, *vulgo* Scabbiosa con le frondi sane,et etiam Morsus diaboli) corollulis quadrifidis aequalibus,caule simplici,ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis integerrimis . *Roy Lugbd.* 188. *Dalib. Par.* 45. *Lin. Hort. Cliff.* 30.

Succisa glabra. *C.B.P.* 269.

Succisa seu Morsus diaboli. *Cam. epit.* 397.

Succisa hirsuta. *C.B.P.* 269. (*a*)

Prope monasterium Sublaci.

270. SCABIOSA (*tatarica, vulgo* Scabbiosa di campagna grande) corollulis quadrifidis radiantibus, caule hispido, foliis lanceolatis pinnatifidis, lobis imbricatis. *Linn. Spec. Plant.* 9. *p.* 143.

Scabiosa flosculis quadrifidis, foliis pinnatifidis, laciniis lateralibus erectiusculis. *Acta Upsal.* 1744. *p.* 11. *t.* 1.

Scabiosa altissima segetum. *Triumph. Raii. Suppl.* 236.

Ad montem Gennarum.

Demulcens et pectoralis insignis.

271. SCABIOSA (*arvensis, vulgo* Scabbiosa volgare; *riz.* con le frondi intere ed irsuta) corollulis quadrifidis radiantibus, caule hispido, foliis pinnatifidis, lobis distantibus. *Roy. Lugbd.* 188. *Dalib. Paris* 44. *Lin. Hort. Cliff.* 31.

Scabiosa major hirsuta. *C. B. P.* 269.

Scabiosa arvensis. *Taber. hist.* 442.

Scabiosa major communior hirsuta, folio non laciniato. *I. B. Hist.* 3. *p.* 2.

Fere ubique.

Attenuans et lubricans.

272. SCABIOSA (*gramontia*, *vulgo* Scabbiosa con le frondi tagliate sottilmente) corollulis trifidis, foliis caulinis tripinnatis filiformibus. *Sauv. Monspel.* 268.

Scabiosa capitulo globoso, foliis in tenuissimas lacinias divisis. *C. B. P.* 271. *Magnol. Monsp.* 231.

Secus vias et campos fere ubique autumno floret.

Materiam crassam pectoris attenuat et lubricat.

COROLLVLIS QVINQVEFIDIS

273. SCABIOSA (*columbaria*, *vulgo* Scabbiosa minore) corollulis quinquefidis radiantibus, foliis radicalibus ovatis crenatis, caulinis pinnatis setaceis. *Roy. Lugbd.* 139. *Dalib. Paris.* 45. *Sauv. Monsp.* 242. *Lin. Hort. Cliff.* 31.

Scabiosa capitulo globoso major. *C. B. P.* 270.

Scabiosa minor. *Cam. epit.* 711.

Scabiosa capitulo globoso minor. *C. B. P.* 270.

274. SCABIOSA (*stellata*, *vulgo* Scabbiosa con il calice fatto a stella e foglie tagliate) corollulis quinquefidis, foliis dissectis, receptaculis florum subrotundis. *Roy. Lugbd.* 189. *Lin. Cliff.* 31.

Scabiosa stellata folio laciniato major. *C. B. P.* 271.

Scabiosa major hispanica. *Clus. Hist.* 2. *p.* 1. (*a*)

Scabiosa stellata folio laciniato minor. *C. B. P.* 271. (*b*)

275. SCABIOSA (*papposa*) corollulis quinquefidis, caule herbaceo, calycibus foliosis caulem superantibus, pappo plumoso. *Roy. Lugbd.* 189.

Scabiosa cretica, capitulo papposo mentiente. *Tour. Coroll.* 34. *Boerh. Lug.* 1. *p.* 130.

276. SCABIOSA (*pedunculata*) corollulis quinquefidis, omnibus pedunculatis.

Vegetant in pratis campis et juxta vias et signanter a num. 274. usque ad 277. juxta septa pineti Sacchetti et alibi.

Omnes pectorale sunt mirabiles.

SHERARDIA

277. SHERARDIA (*arvensis, riz.* Rubbiola con li fiori turchini) foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus. *Lin. spec. Plant.* 1. *p.* 149.

Sherardia. *Dill. gen.* 96. *Roy Lugbd.* 257. *Dalib. Paris.* 46. *Lin. Hort. Cliff.* 33.

Rubeola arvensis repens caerulea. *C. B. P.* 334. *Prodr.* 145.

Rubia parva flore caeruleo se spargens. *I. B. Hist.* 2. *p.* 719.

Ad montem Marium et all' Inzuccherata.

278. SHERARDIA (*muralis*) foliis floralibus

binis oppositis, binis floribus. *Lin. spec. Plant.* 2. *p.* 149.

Asperula verticillata luteola. *C. B. P.* 334.

Asperula verticillata muralis minima. *Col. Ecph.* 302. *t.* 300.

Ad clivos lacus castri Gandulfi et Nemi.

Anginam curat.

ASPERVLA

279. ASPERVLA (*arvensis*, *vulgo* Rubbietta che nasce nelli campi) foliis senis, floribus sessilibus aggregatis terminalibus. *Lin. Hort. Vpsal.* 27.

Asperula foliis pluribus, floribus sessilibus. *Roy. Lugbd.* 255. *Dalib. Paris.* 47. *Lin. Hort. Cliff.* 33.

Asperula caerulea arvensis. *C. B. P.* 334.

Asperula caerulea. *Dod. Pempt.* 355.

Ad Carpinetum montem Lanicum Normam et locos umbrosos.

Ad catamaenia promovenda etc.

280. ASPERVLA (*taurina*, *vulgo* Rubbia maggiore) foliis quaternis ovato-lanceolatis, floribus fasciculatis terminalibus. *Lin. spec. Plant.* 3. *p.* 160.

Asperula foliis quaternis ovato-lanceolatis ramis alternis. *Roy. Lugbd.* 255. *Hall. Helv.* 457.

Rubia latifolia et quadrifolia laevis. *C. B. P.* 334. *Moris. Hist.* 3. *s.* 9. *t.* 31. *f.* 1.

In nemore Fajola et ad Desertini.

281. ASPERVLA (*tintoria, vulgo* Rubbia) foliis linearibus, inferioribus senis, intermediis quaternis, caule flaccido, floribus plerisque trifidis. *Lin. spec. Plant* 4. *p.* 150.

Asperula foliis quaternis linearibus, floribus saepius trifidis. *Sauv. Monsp.* 163. *Lin. Flor. Svec.* 115. 122.

Rubeola quadrifolia, caule ramoso flaccido, floribus trifidis. *Hall. rupp.* 8.

Galium album. 3. *Tab. Hist.* 433. *t.* 337. *f.* 1.

Ad Tibur S. Polum Maenzam et alibi.

In menstruis obstructis convenit.

282. ASPERVLA (*pyrenaica*) foliis quaternis lanceolato-linearibus, caule erecto, floribus saepius trifidis. *Lin. spec. Pl.* 5. *p.* 151.

Rubia cynanchica saxatilis. *C.B.P.* 333. *Prodr.* 145. *Burs. XIX.* 9.

Ad lacus Nemi castri Gandulfi et alibi.

283. ASPERVLA (*cynanchica, vulgo* Cruciata foliis inferioribus senis, intermediis quaternis subulatis triquetris, floribus quadrifidis.

Asperula foliis linearibus quaternis summis oppositis. *Roy. Lugbd.* 255. *Sauv. Monsp.* 163.

Rubeola foliis quaternis, seminibus glabris, floribus umbellatis. *Hall. Helv* 458.

Rubia cynanchica. *C. B. P.* 333. *I. B. Hist.* 3. *p.* 723.

Galium montanum, latifolium cruciatum. *Col. Ecph.* 1. *p* 296. *t.* 297. *f.* 1.

Ad montem Cavum Fajolam Tusculum vetus et alibi.

GALIVM

FRVCTV GLABRO

284. GALIVM (*rubioides*, *vulgo* Gallio cruciato) foliis quaternis lanceolato-ovatis aequalibus subtus scabris, caule erecto, fructibus glabris. *Lin. spec. Plant.* 2. *p.* 152.

(Facies Galii vulgaris; sed folia duplo latiora subtus scabra, caulis firmus lignosus erectus cylindraceus, panicula brevis conglomerata, semina laevia.)

Habitat sopra la Riccia, e alle Pentime del lago di Diana vulgo di Nemi.

Adstrigens.

285. GALIVM (*palustre*, *vulgo* Gallio acquatico) foliis quaternis ovatis inaequalibus, caulibus diffusis. *Lin. Flor. Svec.* 119. 126.

Galium palustre album. *C. B. P.* 335.

In limosis et humidis terris.

286. GALIVM (*uliginosum*) foliis senis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis

mucronatis rigidis,corollis fructu majoribus.

Aparine foliis lineari - lanceolatis acuminatis rigidis,corollis fructu majoribus. *Roy. Lugbd.* 255. *Lin. Flor. Svec.* 121. 127.

Aparine minor palustris parisiensis, flore albo. *T. I. R. H.* 114. *Vaill. Paris* 14.

Locis aquosis.

287. GALIVM (*spurium*) foliis senis lanceolatis carinatis scabris retrorsum aculeatis,geniculis simplicibus, fructibus glabris. *Lin. Hort. Vps.* 28.

Aparine semine laeviore. *Raii Hist.* 484.

Aparine foliis crebrioribus, semine laeviore. *Moris. Hist.* 3. *p.* 332.

In multis locis cultis.

288 GALIVM (*saxatile*) foliis senis ovatis obtusis, caule ramosissimo procumbente. *Lin. spec. Hant.* 9. *p.* 164.

Galium caule ramosissimo, foliis quinis obverse ovatis. *Roy Lugbd.* 257. *Lin. Hort. Cliff.* 34.

Galium saxatile supinum, molliore folio. *Iuss. Act. Paris.* 1714. *t.* 15. *p.* 492.

Ad Ardiam Praticam et turrim Vajanico.

In Vulneribus sanguinem sistit.

289. GALIVM (*minutum*) foliis octonis lanceolatis mucronatis serrato-aculeatis glabris

incurvis, fructibus reflexis. *Lin. spec. Plant.* 10. *p.* 154.

Galium saxatile minimum supinum et pumilum, flore luteo. *Tour. I. R. H.* 1151.

Ad montem Lanicum et Normam.

290. GALIVM (*pusillum*) foliis octonis hispidis linearibus acuminatis subimbricatis, pedunculis dichotomis. *Linn. Spec. Plant.* 11. *p.* 154.

Rubeola saxatilis. *C. B. P.* 334. *Prodr.* 145.

Locis montanis ad Rocca secca Sonnino Carpineto.

291. GALIVM (*verum*, *vulgo* Gallio con li fiori gialli) foliis octonis linearibus sulcatis, ramis floriferis brevibus. *Roy. Lugbd.* 256. *Hort. Cliff.* 34.

Galium luteum *C. B. P.* 335.

Ad Inzuccheratam montem Marium et multis aliis in locis.

292. GALIVM (*Mollugo, riz.* Mollugine e Gallio ramoso) foliis octonis ovato linearibus subserratis patentissimis mucronatis, caule flaccido, ramis patentibus. *Linn. Spec. Plant.* 14. *p.* 155.

Galium foliis pluribus acutis, caule flaccido, ramis patentissimis. *Roy. Lugbd.* 257. *Linn. Hort. Cliff.* 34.

Mollugo montana angustifolia ramosa. *C. B. P.* 334.

Rubia sylvestris laevis. *C. B. P.* 33.
Mollugo belgarum. *Lob. Icon.* 802.

Ad Pescherellum moletta et alibi.

Haemorrhagias sistit.

293. GALIVM (*purpureum*, *vulgo* Gallio con li fiori oscuri) foliis verticillatis lineari-setaceis pendulis capillaribus, folio longioribus. *Roy. Lugbd.* 256. *Linn. Hort. Cliff.* 34.
Galium nigro-purpureum montanum tenuifolium. *Col. Ecph.* 1. *p.* 298. *C. B. P.* 335.

Ad Nemi selvettum et alibi multis in locis.

294. GALIVM (*rubrum*, *vulgo* Gallio con fiore rosso) foliis verticillatis linearibus patulis, pedunculis brevissimis. *Roy. Lugbd.* 256. *Linn. Hort. Cliff.* 34.
Galium rubro flore. *Clus. Hist.* 2. *p.* 175.

Ad domus novas amasenum et in nonnullis aliis locis.

FRVCTV HISPIDO

295. GALIVM (*boreale*) foliis quaternis lanceolatis trinervis glabris, caule erecto, seminibus hispidis. *Roy. Lugbd.* 257. *Linn. Hort. Cliff.* 64
Rubia pratensis laevis acuto folio. *C. B. P.* 333. *Prodr.* 145.

Ad pinetam Sacchetti.

296. GALIVM (*rotundifolium*) foliis quaternis ovatis aculeato-ciliatis, seminibus hispidis.

Rubia semine duplici, hispido-latis et hirsutis foliis, *Bocconi*. *Moris. Hist.* 3. *p.* 329. *s.* 9. *t.* 21. *f.* 5.

Ad vallem Inferni.

Ejus radix aperien est.

297. GALIVM (*Aparine,riz.* Aparine volgare) foliis octonis lanceolatis carinatis, geniculis villosis, fructu hispido.

Aparine foliis lanceolatis acuminatis scaberrimis, corollis fructu minoribus. *Roy. Lugbd.* 455. *Linn. Flor. Svec.* 120. 128.

Aperine vulgaris. *C. B. P.* 334.

Vivit ubi antecedens.

298. GALIVM (*parisiense*) foliis verticillatis linearibus, pedunculis bifidis, fructibus hispidis.

Aparine foliis lineari-lanceolatis acuminatis flaccidis, corollis fructu minoribus. *Roy. Lugbd.* 255.

Aparine minima. *Rai. Angl.* 3. *p.* 255. *t.* 9. *f.* 1.

Galium parisiense tenuifolium, flore atro-purpureo. *Tour. Inst. R. H.* 664.

Prope sepulchrum Neronis et extra moenia Civitatis Ostiensis.

Syrupus florum menstrua provocat.

CRVCIANELLA

299. CRVCIANELLA (*angustifolia*, *vulgo* Regginella (erecta, foliis senis linearibus,

floribus spicatis. *Sauv. Monsp.* 164. *Linn. Hort. Vpsal.* 27.

Rubia angustifolia spicata. *C. B. P.* 334. *Prodr.* 145.

Ad Maccharese.

In morsu Viperino mirabilis.

300. CRVCIANELLA (*latifolia*) procumbens, foliis quaternis lanceolatis, floribus spicatis. *Sauv. Monsp.* 164.

Rubia latifolia spicata. *C. B. P.* 334.

Ad Baccanum et Fajolam.

301. CRVCIANELLA (*maritima*) procumbens, foliis quaternis, floribus subverticillatis nigris.

Crucianella erecta, foliis quaternis, corolla ad solem connivente. *Sauv. Monsp.* 164.

Rubia maritima. *C. B. P.* 334. *Dod. Pempt.* 357. *Clus. hist.* 2. *p.* 176.

Rubia seu Apparine spicata cretensis. *Clus. hist.* 2. *p.* 176.

Multis in locis, et ad sepes.

302. CRVCIANELLA (*verticillata*) erecta, foliis senis ovato-lanceolatis, floribus vercillatis atro-purpureis.

Ad Ostia Tiberina.

Radix Catamoenia provocat.

303. CRVCIANELLA (*monspeliaca*) repens,

foliis senis, spicis longis. *Sauv. Monsp.* 225.
Rubia spicata repens. *Mang. Monsp.* 225.

Ibidem.

RVBIA

304. RVBIA (*tinctorum*) foliis senis. *Roy. Lugbd.* 254.
Rubia sylvestris aspera. *C. B. P.* 33.
Rubia perennis, foliis saepius quinis. *Sauv. Monsp.* 161.
Rubia tinctorum sativa. *B. P.* 33.

Ad sepes.

Aperiens et sanguinam grumosum resolvit.

305 RVBIA (*peregrina*) foliis quaternis. *Roy. Lugbd.* 254.
Rubia quadrifolia asperrima peregrina. *Herm. Lug.* 523.

Ad Brachianum.

306. RVBIA (*fructu hispido*) quadrifolia, foliis teretibus, floribus racemosis, fructibus hispidis.

Ad Palumbariam.

Aperit et roborat.

EXACVM

307. EXACVM (*pedunculatum, vulgo* Centaurea minore con il fiore giallo) floribus pedunculatis. *Binn. Spec. Plant.* 2. *p.* 163.
Centaurium minus hypericoides, flore luteo,

Lini capitulis. *Pluk. mant* 43. *t.* 343. *f.* 3.

Ad theatrum flavianum vulgo Colosseo.

PLANTAGO

SCAPO NVDO

308. PLANTAGO (*major*) foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricatis. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 163. (Sed scapus est nudus, spica tereti.)

Plantago foliis ovatis glabris. *Roy. Lugbd.* 401. *Dalib. Par.* 50. *Linn. Hort. Cliff.* 43.

Plantago foliis sinuoso - ventricosis ovatis. (*Vulgo* Piantaggine con la foglia larga) (*a*)

Plantago latifolia glabra minor. *C. B. P.* 189. (*b*)

Plantago angusto folio et ovato in ambitu crenato. (*Vulgo* Piantaggine con la foglia più stretta. (*c*)

Ad loca humecta.

309. PLANTAGO (*angulata*) foliis ovatis glabris, scapo angulato et canaliculato, flosculis distinctis et foliolis interceptis.

Ad mala fede.

310. PLANTAGO (*media*, *vulgo* Piantaggine con la foglia biancheggiante) foliis ovato-lanceolatis pubescentibus, spica cylindrica, scapo tereti. *Roy. Lugbd.* 401. *Dalib. Paris.* 50. *Linn. Hort. Cliff.* 36.

Plantago latifolia incana. *C. B. P.* 189.
Plantago major incana. *Clus. Hist.* 2. *p.* 109.
Plantago latifolia hirsuta minor. *C. B. P.* 189. *(a)*
Plantago latifolia incana, spicis variis. *C. B. P.* 189. *(b)*

Vltra Reatem.

311. PLANTAGO (*lanceolata*, *vulgo* Piantaggine di foglia stretta) foliis lanceolatis, spica subovata nuda, scapo angulato. *Roy. Lugbd.* 401. *Hall. Helv.* 471. *Dalib. Paris.* 50. *Linn. Hort. Cliff.* 36.
Plantago angustifolia major. *C. B. P.* 189.
Plantago minor. *Dod. pempt.* 102.
Plantago trinervia, folio angustissimo. *C. B. P.* 189. *(a)*
Plantago minor. *Dod. pempt.* 102.
Plantago trinervia, folio angustissimo. *C. B. P.* 189. *Prodr.* 98. (*Vulgo* Piantaggine di tre nervi di foglia stretta.) *(a)*
Plantago angustifolia major, caulium summitate foliosa. *C. B. P.* 189. (*Vulgo* Piantaggine con le frondi strette; e nella sommità li suoi gambi sono frondosi.) *(b)*

Ad nemus Porcigliani.

Adstringens absque acerbitate; mundificat et consolidat etc.

312. PLANTAGO (*Lagopus*, *vulgo* Piantaggine

con la spiga corta e foglia stretta) foliis lanceolatis, spica ovata hirsuta, scapo angulato.

Plantago angustifolia, paniculis Lagopi. *C. B. P.* 189 *Moris. Hist.* 3. *s.* 8: *t.* 16. *f.* 13.

Ad montem Rotundum.

Adstringens.

313. PLANTAGO (*albicans*) foliis lineari-lanceolatis hirsutis, spica cylindrica erecta, scapo tereti foliis longiore.

Plantago foliis lanceolatis linearibus, scapo longitudine foliorum, spica oblonga. *Roy. Lugbd.* 401.

Plantago foliis lanceolato-linearibus, scapo foliis duplo longiore, spica oblonga. *Sauv. Monsp.* 26.

Holosteum hirsutum albicans majus. *C.B.P.* 190.

Holosteum salmaticense majus. *Clus. Hist.* 2. *p.* 110.

Holosteum hirsutum albicans minus. *C.B.P.* 190.

Non procul a Cavi.

Adstringens.

314. PLANTAGO (*alpina*) foliis linearibus planis hirsutis, spica oblonga. *Hall. Helv.* 471.

Holosteum hirsutum nigricans. *C. B. P.* 190.

Non procul a Cavi et ad Rocca di Papa.

Adstringens.

315. PLANTAGO (*maritima*, *vulgo* erba Stella salvatica che nasce nelle maremme) foliis semicylindraceis integerrimis basi lanatis, scapo tereti. *Lin Flor. Svec.* 127. 133.

Plantago scapo spicato, foliis linearibus subtus convexis. *Lob. Obs.* 163. *Lin. Flor. Lapp.* 63.

Coronopus maritimus major. *C. B. P.* 190.

Prope Piglium ubi adest crypta vulgo del pesce et etiam prope foce verde.

316. PLANTAGO (*subulata*, *vulgo* Serpentina con le frondi strette) foliis subulatis triquetris striatis scabris, scapo tereti. *Roy. Lugbd.* 402.

Plantago foliis triangulari-prisnaticis. *Guet. st.* 2. *p.* 428.

Holosteum strictissimo folio minus. *C. B. P.* 191.

Serpentina omnium minima. *Lob. Icon.* 439.

Holosteum massiliense. *C. B. P.* 190. *(a)*

Ad primam portam et alibi prope Mediterraneum.

Adstringens.

317. PLANTAGO (*Coronopus*) foliis linearibus subdentatis, scapo tereti.

Plantago foliis linearibus pinnato-dentatis. *Roy. Lugbd.* 401. *Dalib. Paris.* 50.

Coronopus sylvestris hirsutior. *C. B. P.* 190.

Herba Stella sive Cornu cervium. *Dod. Pempt.* 190.

Coronopus hortensis. *C. B. P.* 190. (*Vulgo* Erba Stella domestica)

Multis in locis glareosis.

Adstrigens.

318. PLANTAGO (*uniflora*) scapo unifloro. *Dalib. Paris* 50.

Plantago floribus femineis sessilibus ad exortum scapi uniflori maris. *Iust. Act.* 1742. *p.* 131. *t.* 7. *Guett. stamp.* 2. *p.* 26.

Gramen junceum, capitulis quatuor longissimis filamentis donatis. *Pluk. Alm.* 180. *t.* 35. *f.* 2. *Moris. hist.* 3. *s.* 8. *t.* 9. *f.* 30.

Ad S. Orestem et loca humida.

CAVLE RAMOSO

319. PLANTAGO (*psyllium, riz.* Psillo maggiore) caule ramoso, foliis integerrimis, spicis foliosis.

Plantago caule ramoso. *Roy. Lugbd.* 401.

Plantago annua foliis integerrimis, caule ramoso erecto. *Dalib. Par.* 51.

Psyllium majus erectum. *C. P. B.* 191.

Plantago foliis radicalibus dentatis, scapi ramosis integris.

Ad Theatrum flavianum et montem testaceum.

In Combustionibus,

320. PLANTAGO (*dentata*) caule ramoso, foliis omnibus dentatis, spicis foliosis.

Ad montem Narniae.

321. PLANTAGO (*crenata*) caule ramoso, foliis dentatis, spicis aphyllis.

Psyllium Dioscoridis vel indicum, foliis crenatis. *C. B. P.* 191.

Prope Cantalupum.

In Oculorum inflammationibus.

CENTVNCVLVS

322. CENTVNCVLVS (*minimus*, *vulgo* Cent' occhio piccolo.) *Dill. giss.* 161. *gen.* 3. *E. N. c.* 5. *app.* 92. *t.* 10. *f.* 31.

Centunculus foliis alternis ovatis. *Dalib. Paris.* 52.

Anagallidastrum exiguum, foliis lanceolatis alternis. *Mich. g.* 14. *t.* 18.

Anagallis paludosa minima. *Vaill. Paris.* 12. *t.* 4. *f.* 2.

In Paludosis.

Humectans.

SANGVISORBA

323. SANGVISORBA (*officinalis*, *riz.* Pimpinella salvatica maggiore) spicis ovatis. *Dalib. Paris.* 51. *Roy. Lugbd.* 240. *Linn. Hort. Cliff.* 39.

Pimpinella Sanguisorba major. *C. B. P.* 160.

Pimpinella sylvestris sive Sanguisorba major. *Dod. Pempt.* 1085.

Pimpinella major rigida praealta auriculata

subnuda. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 19. *t.* 7. (*a*)

Fere Vbique.

Adstringens et inter vulnerarias non ultimum locum tenet.

324. SANGVISORBA (*canadensis*, *riz.* Pimpinella maggiore con spiga lunga bianecheggiante) spicis longissimis. *Roy. Lugbd.* 240. *Linn. Hort. Cliff.* 39.

Pimpinella Sanguisorba canadensis major, spica longiore alba. *Moris. hist.* 3. *p.* 264. *s.* 8. *t.* 18. *f.* 12.

Pimpinella maxima canadensis, longius spicata. *Corn. Canad.* 175. *t.* 174. *Barr. rar.* 18. *f.* 739.

Ad Cantalupum.

In haemorrhagia et nimio mensium fluxu.

EPIMEDIVM

325. EPIMEDIVM (*alpinum*). *Roy. Lugbd.* 402. *Dod. Pempt.* 599. *Lob. Hist.* 176. *Linn. Hort. Clif.* 37.

Ad montem Sorat.

Adstringens et roborans in vulneribus.

CORNVS

326. CORNVS (*mas*, *vulgo* Grugniale salvatico piccolo) arborea, umbellis involucrum aequantibus. *Roy. Lugbd.* 249. *Dalib. Paris.* 52. *Linn. Hort. Cliff.* 38.

Cornus sylvestris mas. *C. B. P.* 447.

Cornus mas pumilus. *Clus. Hist.* 1. *p.*13.
Cornus hortensis mas. *C. B. P.* 447. *(a)*

Ad Aquam traversam et aliis multis in locis sylvosis.

Adstringentia folia et fructus.

327. CORNVS (*sanguinea*, *vulgo* Grugnale salvatico arboreo) cymis nudis. *Linn. Spec. Plant.* 3. *p.* 170.
Cornus umbellis involucro multoties longioribus. *Roy. Lugb.* 249. *Hall. Helv.* 463. *Dalib. Paris.* 52. *Linn. Hort. Cliff.* 38.
Cornus femina. *C. B. P.* 447.

Vegetat ubi supra.

Adstringens.

ISNARDIA

328. ISNARDIA (*palustris*) *Dalib. Paris.*53.
Dantia palustris. *Petit. gen.* 49. *t.* 49.
Dantia foliis subovatis pediculatis, floribus in foliorum alis sessilibus. *Guett. Stamp.* 2. *p.* 115.
Ocymophyllum. *Buxb. Act.* 4. 277. *t.* 27.
Alsine palustris, rotundifolia repens, foliis portulacae pinguibus. *Lind. Alsat.* 114. *t.* 2.
Glaux major palustris, flore herbaceo. *Moris. praelud.*268. *Rai. Hist.* 1102. *Supp.* 635. *Bocc. Mus.* 105. *t.* 84. *f.* 2.

Prope tractum vulgo Proxedis.

Vires saponaceas habet etc,

CAMPHOROSMA

329. CAMPHOROSMA (*acuta*) foliis subulatis, rigidis, glabris. *Linn. Spec. Plant.* 2. *p.* 178.
Camphorata altera. *Tabern. Hist.* 57.
Camphoratae congener. *C. B. P.* 486.
Anthyllis altera Italorum. *Lob. Icon.* 404. *Dalech. hist.* 1150.

Ad Cosimatam.

ALCHEMILLA

330. ALCHEMILLA (*vulgaris*, *vulgo* Alchimilla, e Piede di Leone volgare) foliis lobatis. *Linn. Flor. Svecica* 135. 141.
Alchemilla foliis palmatis. *Roy. Lugbd.* 231. *Linn. Hort. Cliff.* 38.
Alchemilla foliis simplicibus. *Linn. Flor. Lapp.* 66.
Alchemilla vulgaris. *C. B. P.* 319. *(a)*
Alchemilla minor. *I. R. H.* 502.

Ad montem Gennarum etc. Adstringens et in dysenteria etc.

331. ALCHEMILLA (*alpina*) foliis digitatis serratis. *Roy. Lugbd.* 232. *Linn. Flor. Svec.* 136. 142. *Hort. Cliff.* 39.
Alchemilla perennis incana argentea; sive sericea satinum provocans. *Moris. Hist.* 2. *p.* 195. *s.* 2. *t.* 20. *f.* 3.
Tormentilla alpina, foliis sericei. *C. B. P.* 326.

Alchemilla (*hybrida*) alpina pubescens minor. *I. R. H.* 508. *Pluk. Phyt.* 240. *f.* 1. (*a*)

Ad montem Marium.

332. ALCHEMILLA (*pentaphylla*) foliis quinatis, multifidis, glabris. *Linn. Spec. Plant.* 3. *p.* 179.

Alchemilla alpina quinquefolia. *Bauh. Pin.* 320. *Prodr.* 138

Alchemilla alpina pentaphylla, minima, lobis fimbriatis. *Bocc. Mus.* 1. *p.* 18. *t.* 1.

Ad Montem Marium et Gennarum.

Adstrigens.

TETRANDRIA DIGYNIA

CVSCVTA

333. CVSCVTA (*europaea, vulgo* Cassuta, et Capelli di Macchia) floribus sessilibus. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 180.

Cuscuta nuda, repens, filiformis. *Dalib. Paris.* 53.

Cuscuta major. *C. B. P.* 219.

Cuscuta Camer. *Epit* 984.

Cuscuta nuda repens, filiformis. *Sauv. Monsp.* 11.

Epithymum seu cuscuta minor. *C. B. P.* 219. (*in Officinis* Epitimo, Cuscuta, che nasce sopra il Timo etc.) (*a*)

Super urticas et alias Plantas multis in locis.

334. CVSCVTA (*americana*) floribus pedunculatis. *Loes. It.* 216.

Cuscuta caule aphyllo volubili, repente. *Gronov. Virg.* 18.

Cuscuta inter majorem, et minorem media, filamentis longis, et floribus late super arbores et campos se extendens. *Sloan. Iam.* 85. *Hist.* 1. *p.* 201. *t.* 128. *t.* 4.

Prope Privernum.

In obstructionibus hepatis et lienis etc.

HYPECOVM

335. HYPECOVM (*procumbens*) siliquis arcuatis compressis articulatis. *Lin. Hort. Vpsal.* 31.

Hypecoum. *C. B. P.* 172. *Dod. Pempt.* 449. *Linn. Hort. Cliff.* 38. *Roy. Lugbd.* 402.

Prope S. Sebastianum.

336. HYPECOVM (*pendulum*) siliquis cernuis, teretibus, cylindricis. *Sauv. Monsp.* 263.

Hypecoum siliquis pendentibus non articulatis, incurvis. *Moris Hist.* 2. *p.* 280.

Cuminum sylvestre, siliquatum pone. *Dalech. Hist.* 69.

Ad Primam Portam. Deobstruens.

TETRANDRIA TETRAGYNIA

ILEX

FLORES QVADRIFIDI

337. ILEX (*aquifolium* , *vulgo* agrifolio) foliis ovatis acutis, spinosis . *Roy. Lugbd.* 400. *Gron. Virg.* 12. *Linn. Hort. Cliff.* 40. *Dalib. Paris.* 54.

Ilex aculeata , baccifera . *C. B. P.* 425.

Ilex eadem foliis ex viridi , et luteo variegatis .

Ad aquam transversam . Adstringens .

POTAMOGETON

338. POTAMOGETON (*natans*) foliis oblongoovatis , petiolatis , natantibus . *Roy. Lugdb.* 212. *Hall. Helv.* 199. *Dalib. Par.* 54. *Hor. Cliff.* 40. *Flor. Svec.* 139. 145.

Potamogeton rotundifolium . *C. B. P.* 193.

Potamogeton foliis lanceolato-oblongis , petiolis longis . *Gronov. Virg.* 139. *(a)*

Ad Cafarellam . Externe refriferat .

339. POTAMOGETON (*perfoliatum*) foliis cordatis amplexicaulibus . *Roy. Lugbd.* 212. *Hall. Helv.* 199. *Dalib. Par.* 54. *Linn. Fl. Lapp.* 69.

Potamogeton rotundifolium , alterum . *Loes. Prus.* 205. *t.* 65.

In paludibus et aquis pigris .

340. Potamogeton (*densum*) foliis ovatis acuminatis, oppositis confertis, caulibus dichotomis, spica quadrifolia. *Guet. Stamp.* 1.*p.*102.

Potamogeton minus, foliis densis mucronatis, non serratis. *Magn. Monsp.* 303.

Fontinalis media lucens *Bauh. Hist.* 3. *p.* 769. *Rai. Hist.* 189.

Tribulus aquaticus, minor, alter. *Clus. Hist.* 2.*p.* 252.

Habitat in locis ut supra.

341. POTAMOGETON (*lucens*) foliis lanceolatis, planis, in petiolos desinentibus. *Linn. Hort. Cliff.* 40. *Roy. Lugbd.* 212. *Dalib. Paris.* 54.

Potamogeton foliis angustis splendentibus. *C. B. P.* 193.

Fontinalis lucens, major. *Bauh. Hist.* 3.*p.* 769.

Vivit in locis ut supra.

342. POTAMOGETON (*crispum*) foliis lanceolatis, alternis, undulatis, serratis. *Roy. Lugbd.* 212. *Calib. Paris.* 55.

Potamogeton foliis crispis, seu lactuca ranarum, sarmentis planis. *C. B. P.* 193.

Habitat in paludibus et etiam fontibns ipsa in nostra civitate.

343. POTAMOGETON (*serratum*) foliis lanceolatis oppositis subundulatis. *Linn. Spec. Pl.* 6. *p.* 183.

Potamogeton foliis lanceolatis, obscure undulatis, caulibus longe ramosis. *Guet. Stamp.* 1. *p.* 102. *Dalib. Par.* 55.

Potamogeton longo, serrato folio. *C. B. P.* 193.

344. POTAMOGETON (*compressum*) foliis linearibus obtusis, caule compresso. *Roy. Lugbd.* 213. *Dalib. Paris.* 55. *Hort. Ciff.* 40.

Potamogeton caule plano, foliis gramineis undulatis, spica exigua. *Hall. Hel.* 201.

Potamogeton caule compresso, foliis graminis canini. *Rai. Hist.* 189.

Ad rivulos et aquas paludosas.

345. POTAMOGETON (*pectinatum*) foliis setaceis parallelis, approximatis, distichis. *Dalib. Par.* 55. *Lin. Fl. Svec.* 145. 150.

Potamogeton foliis linearibus acutis, longissimis, alternis, confertis. *Roy. Lugbd.* 213.

Potamogetum gramineum, ramosum. *C. B. P.* 193. *Prodr.* 101.

Ad fossas paludosas.

346. POTAMOGETON (*setaceum*) foliis lanceolatis oppositis acuminatis. *Roy. Lugbd.* 213. *Dalib. Paris.* 55.

Potamogeton ramosum, angustifolium. *C. B. P.* 193. *Prodr.* 101.

In fossis et paludibus.

347. POTEMOGETON (*gramineum*) foliis

lineari - lanceolatis alternis , sessilibus , stipula latioribus . *Linn. Fl. Svec.* 144. 151.

Potamogeton gramineum latiusculum , foliis , et ramificationibus dense stipatis . *Rai. Angl.* 3. *p.* 149. *t.* 4. *f.* 3.

Ad paludes , et fossas .

348. POTAMOGETON (*marinum*) foliis linearibus alternis , distinctis , inferne vaginantibus . *Linn. Fl. Svec.* 146. 152.

Potamogeton pusillum fluitans. *Bocc. Sic.* 42. *t.* 20. *f.* 5.

Ad Meditarranei Litora.

349. POTAMOGETON (*pusillum*) foliis linearibus oppositis , alternisque distinctis , basi patentibus , caule tereti . *Dalib. Paris.* 56. *Lin. Flor. Svec.* 147. 153.

Potamogeton foliis linearibus alternis remotis. *Roy. Lugbd.* 213.

Potamogeton pusillum , gramineo folio tenuiore . *Vail. Paris. t.* 22. *f.* 4.

In paludibus.

RVPPIA

350. RVPPA (*maritima*) *Guet. Stamp.* 2. *p.* 416. *Lin. Hort. Cliff.* 436.

Buccaferrea maritima , foliis acutissimis. *Mich. gen.* 72. *t.* 35.

Potamogeton maritimum , gramineis longiori-

bus foliis, fructu fere umbellato. *Rai. Angl.* 3. *p.* 134. *t.* 6. *f.* 1.

Fucus folliculaceus foeniculi folio longiore. *C. B. P.* 365.

Apud Ostia tiberina ad salinas.

SAGINA

351. SAGINA (*procumbens*) ramis procumbentibus, petalis brevissimis. *Linn. Fl. Lapp.* 157. *Roy. Lugbd.* 452.

Sagina scapis, et ramis unifloris. *Guet. Stamp.* 2. *p.* 277.

Alsine pusilla graminea, flore tetrapetalo. *Segu. Veron.* 421. *t.* 1. *f.* 2.

Alsine Saxatilis graminifolia, flosculis tetrapetalis herbidis, et muscosis. *Pluk. Alm.* 22. *t.* 74. *f.* 2. (*a*)

Saxifraga graminea, pusilla, foliis brevioribus, crassioribus, et succulentis. *Rai. Angl.* 2. *p.* 245. (*b*)

Ad portam Latinam.

352. SAGINA (*erecta*) caule erecto unifloro, triflorove. *Lin. Spec. Plant.* 2. *p.* 185.

Sagina scapis unifloris. *Dialib. Paris.* 56.

Alsine foliis caryophyllaeis. *Rai Angl.* 3. *p.* 244. *t.* 15. *f.* 4.

Alsine verna glabra. *Vaill. Paris.* 6. *t.* 2. *Magnol. Monsp.* 14.

In glareosis et sterilibus. Antiscorbutica et aperiens.

TILLAEA

353. TILLAEA (*aquatica*, *vulgo* semprevivo minore) erecta dichotoma, foliis acutis. *Lin. Flor. Svec.* 2. *n.* 156.

Crassula caule dichotomo, foliis linearibus, floribus quadrifidis. *Dalib. Paris.* 98.

Sedum minimum annuum flore roseo tetrapetalo. *Vaill. Paris.* 181. *t.* 10. *f.* 2.

Ad Locum Cavi vocatum. Refrigerans.

354. TILLAEA (*erecta*) floribus lateralibus, foliis obtusis.

Tillaea erecta *Sauv. Monsp.* 129.

Sedum annuum minimum stellatum rubrum. *Magn. Monsp.* 238. *t.* 237.

Habitat cum supradescripta.

355. TILLAEA (*muscosa*) procumbens. *Sauv. Monsp.* 129.

Tillaea. *Dalib Paris.* 43.

Tillaea muscosa annua perfoliata. *Mich. gen.* 22. *t.* 20.

Crassula foliis sessilibus connatis, floribus agregatis in foliorum alis. *Guet. Stamp.* 1. *p.* 97.

Polygonum muscosum minimum. *Bocc. Sic.* 56. *t.* 29. (*Vulgo* Semprevivo minimo.)

Ad Viterbium et in locis muscosis.

CLASSIS V.

PENTANDRIA

PENTANDRIA MONOGYNIA

HELIOTROPIVM

356. HELIOTROPIVM (*europaeum*, *vulgo* erba per li porri) foliis ovatis integerrimis, tomentosis, rugosis, spicis conjugatis. *Sauv. Monsp.* 305. *Linn. Hort. Vpsal.* 33.

Heliotropium foliis ovatis integerrimis spicis conjunctis. *Roy. Lugbd.* 404. *Linn. Hort. Cliff.* 45.

Heliotropium majus Dioscoridis. *C.B.P.* 253.

Vivit fere ubique. In dysenteria.

MYOSOTIS

357. MYOSOTIS (*scorpioides*) seminibus nudis, foliorum apicibus callosis. *Roy. Lugbd.* 404. *Linn. Hort. Cliff.* 45. *Flor. Svec.* 149. 157.

Myosotis (*arvensis*, *vulgo* orecchio di sorcio con foglia *sic* liscia) foliis hirsutis. *Linn. Hort. Cliff.* 46. *(a)*

Myosotis hirsuta arvensis major. *Dill. Gis.* 55. *Flor. Lapp.* 74.

Echium scorpioides arvense. *C. B. P.* 254.

Myosotis (*palustris*) foliis glabris . *Dalib. Paris*. 58. *Lin. Hort. Cliff*. 46. (*b*)

Myosotis glabra pratensis . *Dill. Gis*. 67.

Echium scorpioides , palustre . *C. B. P*. 254.

Juxta rivulos multis in locis. In fistula lacrimali.

358. MYOSOTIS (*lappula*) seminibus aculeatis glochidibus , foliis lanceolatis pilosis . *Dalib. Par*. 57.

Lithospermum seminibus echinatis. *Roy. Lugbd*. 405. *Lin. Hort. Cliff*. 46.

Cynoglossum foliis lanceolatis, floribus in foliorum alis subsessilibus. *Guet. Stamp*. 1. *p*.92.

Cynoglossum minus . *C. B. P*. 257.

Ruderatis, argillosisque in locis.

359. MYOSOTIS (*apula*) seminibus nudis , foliis hispidis , racemis foliosis . *Lin. Spec. Pl*. 4. 189.

Lithospermum seminibus laevibus , corollis vix calycem superantibus , foliis lanceolatis . *Roy. Lugbd*. 405. *Sauv. Monsp*. 62.

Echium luteum , minimum . *C. B. P*. 254.

Echioides lutea , minima , apula , campestris . *Col. Echph*. 1. 184. *t*. 185.

Prope Utricolim.

LITHOSPERMVM

360. LITHOSPERMVM (*Officinale vulgo* Litospermo *et milium solis Officinarum*) semi-

nibus laevibus, corollis calycem vix superantibus, foliis lanceolatis. *Roy. Lugbd.* 505. *Dalib. Paris.* 58. *Lin. Hort. Cliff.* 46.

Lithospermum majus, erectum. *C. B. P.* 258.

Ad montem Marium.

361. LITHOSPERMVM (*Purpuereo caeruleum*) seminibus laevibus, corollis calycem multoties superantibus. *Roy. Lugbd.* 405. *Linn. Hort. Cliff.* 46.

Lithospermum flore magno, caule ex apice radices agente. *Hall. Hel.* 517.

Lithospermum minus, repens, latifolium. *C. B. P.* 258.

Lithospermum repens, majus. *Clus. Hist.* 2. *p.* 163.

Ad Villam vulgo Madama.

Semina Lithontriptica sunt.

ANCVSA

362. ANCHVSA (*Officinalis*, *vulgo* Buglossa con foglia stretta, maggiore) foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. *Roy. Lugbd.* 406. *Dalib. Paris.* 59. *Lin. Hort. Cliff.* 46.

Buglossum angustifolium majus. *C. B. P.* 256.

Buglossum sylvestre majus, nigrum. *C. B. P.* 256. *Segu. Ver.* 1. *p.* 214.

Ad Clivum Vetulae, et alibi.

363. ANCHVSA (*angustifolia*, *vulgo* Buglos-

sa minore con foglia stretta) racemis subnudis conjugatis .*Roy. Lugbd* 408.

Borago Sylvestris, perennis, flore rufokermesino. *Zan. Hist.* 49. *t.* 20.

Buglossum angustifolium, minus. *C. B P.* 256. *Moris. Hist.* 3. *p.* 438. *s.* 11. *t.* 26. *f.* 4.

Echii facie bulglossum minimum, flore rubente. *Lob. Icon.* 576.

Ad domunculam vulgo Matthaei. Radix valde aperiens.

364. ANCHVSA (*sempervirens*, *vulgo* Buglossa sempre verde con foglia grande) pedunculis diphyllis capitatis. *Linn. Spec. Plant.* 8. *p.* 193.

Anchusa scapis diphyllis. *Roy Lugbd.* 407. *Lin. Hort. Cliff.* 47.

Buglossum latifolium, semper virens. *C. B. P.* 256. *Moris. Hist.* 3. *p.* 437. *s.* 11. *t.* 26. *f.*2.

Habitat ut supra.

CYNOGLOSSVM

365. CYNOGLOSSVM (*officinale*, *vulgo* Lingua di Cane, *et* cinoglossa maggiore, e volgare) staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis, tomentosis, sessilibus. *Linn. Spec. Plant.* 8. *p.* 192.

Cynoglossum foliis lanceolato-ovatis, corollis calycem aequantibus. *Roy. Lugbd.* 406.

Cynoglossum majus, vulgare. *C. B. P.* 257.

Multis in locis, et praecipue ad Januam portuensem. Narcoticam, et Anodynam vim habet etc.

366. CYNOGLOSSVM (*cheirifolium*, *vulgo* Cinoglossa con folia stretta, e biancheggiante) corollis calyce duplo longioribus, foliis lanceolatis. *Roy. Lugbd.* 466. *Sauv. Monsp.* 64.

Cynoglossum Creticum, argenteo angusto folio. *C. B. P.* 257. *Linn. Hort. Cliff.* 47.

Cynoglossum Creticum. 1. *Clusii. Hist.* 2. *p.* 162.

Ad montem Circaeum.

367. CYNOGLOSSVM (*apenninum*) staminibus corollam aequantibus. *Sauv. Monsp.* 64. *Linn. Hort. Vpsal.* 33.

Cynoglossa montana maxima frigidarum regionum. *Col. Ecph.* 1. *p.* 168. *t.* 170.

Ad Praenestum.

PVLMONARIA

368. PVLMONARIA (*officinalis*, *vulgo* Pulmonaria con foglia macchiata) foliis radicalibus ovato-cordatis scabris. *Roy. Lugbd.* 403. *Haller. Helvet.* 516. *Dalib. Paris.* 60.

Symphytum maculosum seu Pulmonaria latifolia. *C. B. P.* 259.

Pulmonaria vulgaris latifolia flore albo. *T. I. R. H.* 136.

Pulmonaria non maculoso folio (Pulmonaria non macchiata.) *Clus. Hist.* 2. *p.* 168. *C. B. P.* 259. (*a*)

Ad montem vulgo Libretto et ad Inzuccherata.

PERIANTHIVM LONGITVDINE TVBI COROLLAE

369. PVLMONARIA (*maritima*) calycibus abbreviatis, foliis ovatis, caule ramoso procumbente. *Linn. Spec. Plant.* 5. *p.* 195.

Cerinthe foliis ovatis petiolatis. *Roy. Lugbd.* 408. *Linn. H. Cliff.* 48.

Cerinthe maritima, procumbens. *Dill. Elth.* 75. *t.* 65. *f.* 75.

Cynoglossum procumbens glaucophyllum maritimum. *Pluk. Alm.* 126. *t.* 172. *f.* 3.

Cynoglossum perenne, maritimum, procumbens. *Moris. Hist.* 3. *p.* 450. *s.* 11. *t.* 28. *f.* 12.

Echium marinum. *Rai Angl.* 3. *p.* 270.

Ad Flumicinum et non procul ab Ostiis Tiberinis. Emolliens et humectans.

SYMPHYTVM

370. SYMPHYTVM (*Officinale*, *vulgo* consolida maggiore con il fiore rossiccio) foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. *Roy. Lugbd.* 407. *Lin. Hort. Cliff.* 47.

Symphytum consolida major, flore albo. *C. B. P.* 259. (*a*)

Symphytum consolida major flore rubro. *C. B. P.* 259.

Extra januam D. Pauli et alibi. Planta glutinosa et consolidans.

371. SYMPHYTVM (*orientale*, *vulgo* consolida maggiore simile alla Boraggine) foliis ovatis subpetiolatis. *Linn. Spec. Plant.* 3. *p.* 195.

Symphytum Orientale, folio subrotundo aspero, flore caeruleo. *Tour. Coroll.* 7.

Symphytum Costantinopolitanum, borraginis folio et facie, flore albo. *Tour. Coroll.* 7. *Bux. Cent.* 5. *p.* 36. *t.* 68.

Prope Setiam et ad Pontinas.

372. SYMPHYTVM (*tuberosum*, *vulgo* consolida maggiore con tuberosa radica) foliis summis oppositis. *Linn. Spec. Plant.* 2. *p.* 195.

Symphytum majus tuberosa radice. *C. B. P.* 259.

Symphytum radice tuberosa. *Cam. Epit.* 701.

Symphytum tuberosa radice, flore exalbido (Consolida con fiori biancheggianti e radica tuberosa.) *(a)*

Symphytum tuberosa radice, flore flavo (con fiore gialletto, radica tuberosa.) *(b)*

Symphytum tuberosa radice, flore croceo (con fiore giallo cupo, radice tuberosa.) *(c)*

Symphytum tuberosa radice, flore egilvo luteo, limbo croceo (con fiore di colore cenerogniolo e la bocca gialla.) (*d*)

In umbrosis et humidis vivit.

Optime convenit in vulneribus et ulceribus.

CERINTHE

373. CERINTHE (*major*) foliis amplexicaulibus, fructibus geminis, corollis obtusiusculis patulis. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 195.

Cerinthe foliis cordatis sessilibus. *Roy. Lugbd.* 408. *Linn. Hort. Cliff.* 48.

Cerinthe flore rubro purpurascente. *C. B. P.* 258. (*Rizot.* Cerinte con li flori porporascenti.) (*a*)

Cerinthe flavo flore, asperior. *C. B. P.* 258. (con fiori gialli, e più spinose, e ispide le frondi.) (*b*)

Cerinthe foliis caulem amplexantibus, dentibus floris revolutis brevissimis. *Hall. Helv.* 515.

Ad domunculam Matthaci. Humectans et refrigerans.

374. CERINTHE (*mincr*) foliis amplexicaulibus emarginatis, fructibus geminis, corollis acutis, clausis. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 137.

Cerinthe seu Cynoglossum montanum majus, *C. B. P.* 258.

In loco vulgo Casa broda.

375. CERINTHE (*echioides Rizot.* Ancusa con fiori gialli minore , e maggiore) foliis lanceolato - linearibus quaternis distinctis . *Roy. Lugbd.* 408.

Anchusa lutea minor . *C. B. P.* 255.

Anchusa echioides , lutea , Cerinthae flore , montana . *Col. Ecph.* 1. *p.* 182. *t.* 183.

Anchusa lutea major . *C. B. P.* 255.

Anchusa tertia . *Cam. epit.* 736.

Anchusa lutea . *Dal. Hist.* 1102.

Ad locum Casa Broda, et prope rivulos non procul a Romae Civitate.

BORAGO

376. BORAGO (*officinalis, vulgo* Boragine comune) foliis omnibus alternis , calycibus patentibus . *Hort. Vpsal.* 34.

Borago calycibus patentibus . *Roy. Lugbd.* 403. *Dalib. Paris.* 61. *Linn. Hort. Cliff.* 44.

Buglossum latifolium , flore caeruleo . Borago *C. B. P.* 256.

Borago flore albo . Borago floribus albis . (Boraggine con li fiori bianchi) *T. B.* 3. 574.

In Agris multis in locis . Laudatissimum Cardiacum etc.

ASPERVGO

377. ASPERVGO (*procubens*) *Roy. Lugbd.* 404. *Hall. Helv.* 522. *Dalib. Par.* 61.

Buglossum silvestre(Buglosso salvatico), cau-

libus procumbentibus. *C. B. P.* 257. *Moris. Hist.* 3. *p.* 439. *f.* 11. *t.* 26. *f.* 13.

Prope Arcem dirutam Ortanam.

LYCOPSIS

378. LYCOPSIS (*vesicaria*) foliis integerrimis, caule prostrato, calycibus frutescentibus, inflatis, pendulis. *Roy. Lugbd.* 403. *Linn. Hort. Cliff.* 44.

Echioides flore pullo. *Riv. Mon.* 11.

Buglossum procumbens, annuum, pullo minimo flore (Buglosso con fiori piccoli, e oscuri). *Moris. Hist.* 3. *p.* 439. *f.* 11. *t.* 26. *f.* 11.

In via quae ad S. Joannem pergit.

379. LYCOPSIS (*variegata*) foliis repandis, dentatis, callosis, caule decumbente, corollis cernuis. *Linn. Hort. Vpsal.* 34.

Lycopsis foliis repando dentatis. *Roy. Lugbd.* 404. *Linn. Hort. Cliff.* 44.

Buglossum Creticum, verrucosum. *Stiss. Bot.* 57. *t.* 57.

Buglossum annuum, humile, bullatis foliis, flore caeruleo eleganter variegato (Buglosso con fiori turchini, e foglie bollate). *Moris. Hist.* 3. *p.* 439. *s.* 11. *t.* 26. *f.* 10.

Prope locum vulgo Cavi. Febrifuga et vulneraria.

380. LYCOPSIS (*arvensis*) foliis lanceolatis hispidis, calycibus florentibus erectis. *Roy.*

Lugbd. 404. *Gron. Virg.* 20. *Dalib. Paris* 61.
Buglossum minus, sylvestre (Buglosso salvatico piccolo) *C. B. P.* 257.

Habitat cum praecedenti.

ECHIVM

381. ECHIVM (*fruticosum*) caule fruticoso. *Roy Lugbd.* 407. *Linn. Hort. Cliff.* 43.
Echium Africanum, fructicans, foliis pilosis. *Comm. Hort.* 2. *p.* 107. *t.* 54.

Prope Castrum Veterem in Sabinis.

382. ECHIVM (*Italicum*, *vulgo* Echio, et Erba Viperina con fiori bianchi) corollis vix calycem excedentibus, margine villosis. *Linn. Hort. Vpsal.* 35.
Echium majus, et asperius, flore albo. *C. B. P.* 254. *Cam. Epit.* 738.
Lycopsis (*pilosus*) *C. B. P.* 255. (*a*)

Secus vias suburbanas, agrosque fere ubique.

383. ECHIVM (*vulgare*, *vulgo* Erba viperina et Echio volgare) caule tuberculato hispido, foliis caulinis lanceolatis, hispidis, floribus spicatis lateralibus. *Roy. Lugbd.* 407. *Dalib. Paris.* 61.
Echium vulgare. *C. B. P.* 254. *Clus. Hist.* 2. *p.* 143.

Ad vias et colles. Emollientem possidet facultatem et sanguinis acrimoniam purgat.

ANDROSACE

384. ANDROSACE (*carnea*) foliis rotundis glabris.

Androsace *Matthioli edit. Valgris*. 795.

Ad Rignanum.

Aretia foliis ciliatis linearibus, floribus umbellatis. *Hall. Helv.* 486. *t.* 7. *(a)*

Sedum alpinum, angustissimo folio, flore carneo. *P. C. B.* 234.

Ad Rignanum.

PRIMVLA

385. PRIMVLA (*veris*) foliis dentatis rugosis. *Roy. Lugbd.* 415. *Dall. Paris.* 62. *Linn. Flor. Svec.* 161. *Hort. Cliff.* 51.

Primula (*officinalis*, *vulgo* Erba Paralisis, et Primola vera, *cum sequentibus*) veris odorata, flore luteo simplici. *I. B. Hist.* 3. *p.* 495.

Verbasculum pratense odoratum. *C. B. P.* 241.

In pratis montanis Tiburtinis. In paralysi ad defectum spirituum.

386. PRIMULA (*rugosa*) foliis dentatis rugosis, limbo corollarum concavo.

Cum praecedenti.

387. PRIMVLA (*dentata*) foliis dentatis rugosis, limbo corollarum plano.

Vbi supra vivit.

388. PRIMVLA (*incana*) foliis integris rugo-

sis, incanis, scapo erecto, polyanthos.

Ad prata Tiburtina montana.

389. PRIMVLA (*elatior*) foliis integris, rugosis, incanis, scapo nullo.

Primula veris, pallido flore elatior. *Clus. Hist. p.* 302.

Verbasculum sylvestre, majus, singulari flore. *C. B. P.* 241.

Habitat in locis ut supra.

390. PRIMVLA (*farinosa*) foliis crenatis, glabris, florum limbo plano. *Hort. Cliff.* 50.

Primula foliis crenatis glabris. *Roy. Lugbd.* 415.

Primula veris rubro flore. *Clus. p.* 340.

Verbasculum umbellatum, alpinum minus. *C. B. P.* 242.

Prope locum vulgo Casa broda

391. PRIMVLA (*vitaliana*) foliis linearibus integerrimis, floribus sessilibus. *Linn. Spec. Pl.* 6. *p.* 206.

Primula flore subsessili, foliis linearibus. *Amoen. Acad.* 1. *p.* 160.

Vitaliana. *Sesl. Epist.* 69. *tab.* 10. *f.* 1.

Sedum alpinum exiguis foliis. *C. B. P.* 284.

Sedum alpinum F.Gregorii regiens. 1. *col. Ecph.* 2. *p.* 63. *f.* 1. *Rai. Hist.* 1044.

Calyces longitudine tubi corollae, ultra me-

dium quinquefidi, corolae limbus quinquefidus, lobis ovatooblongis.

Prope Podium Bastone.

CYCLAMEN

392. CYCLAMEN (*europaeum*, *vulgo* Ciclamino, *et Arthanita offic.*, *et* Pane Porcino *cum sequentibus varietatibus*) corolla retroflexa. *Linn. Spec. Plant. l. p.* 207.

Cyclamen foliis cordatis, corolla reflexa. *Linn. Vpsal.* 47. *Mat. Med.* 65.

Cyclamen. *Roy. Lugbd* 414. *Linn. Hort. Cliff.* 49.

Cyclamen. *Cam. Epit.* 35. *(a)*

Cyclamen orbiculato folio. *C. B. P.* 308. *(b)*

Cyclamen anguloso folio. *C. B. P.* 308. *(c)*

Cyclamen folio maculato. *(d)*

Cyclamen flore albo odorato. *(e)*

Cyclamen radice minima, folio amplissimo. *(f)*

In nemorosis, et umbrosis. (f) apud montem Sorat sed est rarum.

Cyclamen (*romanum*) aestivum. *Clus. Hist.* 265. *(g)*

Cyclamen autumno florens. *(h)*

Cyclamen vere et hyeme florens. *(i)*

Cyclamen vere tantum florens. *(l)*

Cyclamen hyeme tantum florens. *(m)*

In dumetis et umbrosis.

Succus abdomini hydropicorum applicatus aquas educit.

MENYANTHES

393. MENYANTHES (*nymphoides*, Trifolium aquaticum *Officinis*) foliis cordatis integerrimis, corollis ciliatis. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 207.

Menyanthes foliis orbiculatis, corollis margine laceris. *Roy. Lugbd.* 430. *Dalib. Par.* 62. *Linn. Hort. Cliff.* 53.

Nymphaea lutea minor, flore fimbriato. *C. B. P.* 194.

In fossis Sermonetae et Pontinis aquis.

Vires mirabiles in Scorbuto.

HOTTONIA

394. HOTTONIA (*palustris*) pedunculo verticillato multifloro. *Boerh. Lugbd.* 1. 207. *Roy. Lugbd.* 41. *Dalib. Par.* 93. *Linn. Hort. Cliff.* 51. *Hall. Helv.* 487.

Millefolium aquaticum, sive Viola aquatica, caule nudo. *C. B. P.* 141.

Millefolium aquaticum equisetifolium, caule nudo. *C. B. P.* 141.

Fere in omnibus fossis et paludibus.

LYSIMACHIA

395. LYSIMACHIA (*vulgaris Rizzot.* Lisimachia con li fiori gialli maggiore) paniculata, racemis terminalibus. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 209.

Lysimachia foliis lanceolatis, racemo composito terminali. *Roy. Lugbd.* 416. *Linn. Virid. Cliff.* 415.

Lysimachia foliis lanceolatis corymbo terminali. *Linn. Fl. Lapp.* 81. *Hort. Cliff.* 50.

Lysimachia lutea major. *C. B. P.* 245.

Fere in omnibus fossis habitat. Adstringens.

396. LYSIMACHIA (*thyrsifera*) racemis lateralibus, pedunculatis. *Linn. Spec. Pl.* 4. *p.* 209.

Lysimachia racemis simplicibus lateralibus. *Roy. Lugbd.* 416. *Linn. Virid. Cliff.* 13.

Lysimachia ex alis foliorum thyrsifera. *Linn. Fl. Lapp.* 82. *Hort. Cliff.* 52.

Lysimachia bifolia, flore globoso, luteo (lisimachia di due foglie con fiori gialli.) *C. B. P.* 245.

Lysimachia lutea. *II. Clus. Hist.* 2. *p.* 53. *f.* 12.

In paludibus multis in locis.

397. Lysimachia (*quadrifolia*. Lisimachia con quattro foglie e con fiori gialli) foliis quaternis subsessilibus, pedunculis quaternis unifloris. *Linn. Spec. Pl.* 5. *p.* 210.

Lysimachia foliis ovato-acutis quaternis. *Gron. Virg.* 20.

Anagallis Marina lutea foliis latis stellatis. *Pet. Gaz.* 5. *t.* 2. *f.* 5.

Anagallis lutea foliis et floribus ex eodem exortu quatuor, ex aequalibus surculorum intervallis cruciatim positis. *Pluk. Mant.* 12. *t.* 333. *f.* 1.

Vitam vivit ad Flumicinum.

398. LYSIMACHIA (*punctata*) foliis subquaternis, pedunculis verticillatis unifloris. *Linn. Spec. Plant.* 6. *p.* 210.

Lysimachia foliis lanceolatis, floribus solitariis. *Linn. Hort. Cliff.* 52. *Roy. Lugbd.* 416. *Gron. Virg.* 20.

Lysimachia lutea minor foliis nigris punctis notatis *C. B. P.* 245.

Blattariae affinis planta minor flore luteo foliis nigris punctis notatis. *Moris. Hist.* 2. *p.* 491. *Sec.* 5. *t.* 10. *f.* 15.

Juxta aquarum paludes inter Typhas et etiam inter Arundines.

399. LYSIMACHIA (*linum stellatum*) calycibus corollam superantibus, caule erecto ramosissimo. *Roy. Lugbd.* 416. *Sauv. Monsp.* 130.

Linum minimum stellatum (lino salvatico piccolo, e ramoso) *C. B. P.* 214. *Prodr.* 107. *Magn. Monsp.* 163. *t.* 162.

Ad Amphitheatrum Flavium et alibi.

400. LYSIMACHIA (*nemorum*) foliis ovatis,

acutis, floribus solitariis, caule procumbente. *Roy. Lugbd.* 416. *Linn. Hort. Cliff.* 52.

Anagallis lutea nemorum. *C. B. P.* 252. *Moris. Hist.* 2. *p.* 569. *Se.* 5. *t.* 26. *f.* 5.

Anagallis. *Clus. Hist.* 2. *p.* 182.

Iuxta dumeta della Cervelletta.

401. LYSIMACHIA (*nummularia*, *vulgo* Nummularia maggiore con li fiori gialli) foliis subcordatis, floribus solitariis, caule procumbente. *Roy. Lugbd.* 416. *Hall. Helv.* 481. *Linn. Hort. Cliff.* 52.

Nummularia major, lutea. *C. B. P.* 309.

Anagallis mas. *Cam. Epit.* 394.

Ad planum vulgo duarum Turrium; et alibi.

Adstringens, mundificans, et exiccans.

402. LYSIMACHIA (*tenella*) foliis ovatis acutiusculis, pedunculis folio longioribus, caule repente. *Linn. Spec. Plant.* 11. *p.* 211.

Lysimachia foliis subrotundis, floribus solitariis, longe pedunculatis. *Guet. Stamp* 2. *p.* 119.

Lysimachia foliis orbiculatis, planis, floribus solitariis, rubellis, caule repente. *Sauv. Monsp.* 135.

Nummularia minor, purpurascente flore (*Vulgo* Nummularia minore con li fiori rosseg-

gianti). *C. B. P.* 310. *Prodr.* 139. *Moris. Hist.* 2. *p.* 567. *Se.* 5. *t.* 26 *f.* 2.

Juxta rivulum della Giustiniana et alibi.

In Pulmonibus ulceratis succus mirabilis.

A N A G A L L I S

403. ANAGALLIS (*arvensis, vulgo* Anagallide con fiore rosso, o sia maschio) foliis indivisis, caule procumbente. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 211.

Anagallis foliis indivisis. *Roy. Lugbd.* 416.

Anagallis foliis ovatis. *Linn. H. Cliff.* 52.

Anagallis phoeniceo flore. *C. B. P.* 252. (*a*)

Anagallis caeruleo flore (Anagalli con fiore turchino o sia femina.) (*b*)

In arvis multis in locis. Ad cerebri morbos convulsivos.

404. ANAGALLIS (*monelli*) foliis indivisis, caule erecto. *Linn. Spec. Plant.* 2. *p.* 211.

Anagallis foliis lanceolatis. *Linn. Hort. Cliff.* 52.

Anagallis caerulea foliis binis, ternisve ex adverso nascentibus. *C. B. P.* 252.

Anagallis tenuifolia Monelli. *Clus. App. alt.*

Prope Montem Virginem, quarto ab urbe lapide.

In hypochondriacis morbis etc.

A Z A L E A

405. AZALEA (*procumbens*) ramis diffuso-procumbentibus. *Hall. Helv.* 416. *Linn. Fl. Lapp.* 90. *t.* 6. *f.* 2.

Chamaerhododendros supina, ferruginea, Thymi folio, alpina. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 64. *t.* 53.

Chamaecistus Serpyllifolia, floribus carneis. *C. B. P.* 466.

Supra montes Fellettinos.

406. AZALEA (*repens*) ramis repentibus, folis crenatis.

Vivit cum precedenti, a qua differt caule statim diviso, ramis repentibus et per intervalla radices sub terram condentibus, flore satis amplo, et intense caeruleo.

PLVMBAGO

407. PLVMBAGO (*europaea*, *vulgo* Dentellaria, *et* Caprinella, *et etiam* Plombagine) foliis amplexicaulibus. *Roy. Lugbd.* 417.

Lepidium dentillaria dictum. *C. B. P* 97.

Tripolium Dioscordis. *Col. Ecph.* 1. *p.* 160. *t.* 161.

Vivit juxta sepes, et vias ubique.

Plumbago humilior, flore albo. (*a*)

Vegetat non procul a monte Faliscio.

Est summe aperiens, sed nimis acris etc.

PHLOX

408. PHLOX (*tuberosa*) foliis lobatis sinuosis, et ventricosis, caule subdichotomo, floribus in umbellam dispertitis, frutescens.

Planta duas ulnas fere alta, vestita foliis lacu-

nosis, et heptapleuris, sessilibus, et lobatis; lobis in acutum desinentibus: radice tuberosa; caule ab imo statim per dichotomiam diviso, deinde subdiviso; iterumque subdiviso, tandem umbella constans 20. et ultra floribus ohroleucis satis amplis, et splendentibus.

Vivit prope Arcem S. Michaelis 13. ab urbe lapide.

C O N V O L V V L V S

CAVLE VOLVBILI

409. CONVOLVVLVS (*arvensis*, *vulgo* Convolvolo minore, *et* Campanella) foliis sagittatis, utrinque acutis, pedunculis unifloris. *Dalib. Paris.* 65.

Convolvulus foliis sagittatis utrinque acutis. *Roy. Lugbd.* 427. *Linn. H. Cliff.* 66.

Convolvulus minor, arvensis. *C. B. P.* 294.

Fore ubique juxta agrorum semites. Purgans, detergens etc.

410. CONVOLVVLVS (*sepium*, *vulgo* Convolvolo maggiore con fiore bianco) foliis sagittatis, postice truncatis, pedunculis tetragonis unifloris. *Roy. Lugbd.* 247. *Dalib. Paris.* 65.

Convolvulus major albus. *C. B. P.* 294.

Convolvulus foliis sagittatis postice truncatis. *Lin. Hort. Cliff.* 66.

Juxta sepes, et dumenta fere ubique. Purgans, et resolvens etc.

411. CONVOLVVLVS (*althaioides*) foliis palmatis, cordatis, sericeis, lobis repandis, pedunculis polyfloris.

Convolvulus foliis cordatodigitatis, sericeis, foliolis linearibus, intermediis duplo longioribus. *Roy. Lugbd.* 429. *Sauv. Monsp.* 202.

Convolvulus argenteus folio Althaee (Convolvolo argenteo con foglie d' Altea). *C. B. P.* 295. (*a*)

Convolvulus Betonicae, Althaeaeqne foliis repens, argenteus. *Barr. rar.* 5. *t.* 312.

Convolvulus argenteus elegantissimus, foliis tenuiter incisis (sottilmente tagliate). *Tou. I. R. H.* 85. (*b*)

Prope Pontem, vulgo Ponte Galera. (b) juxta Ausuram Junio floret.

CAVLE PROSTRATO

412. CONVOLVVLVS (*siculus*) foliis cordatoovatis, pedunculis unifloris, bracteis lanceolatis, flore sessili. *Lin. Spec. Plant.* 26. *p.* 223.

Convolvulus foliis ovatis acutis, floribus duplici bractea succinctis. *Roy. Lugbd.* 428.

Convolvulus Siculus, minor, flore parvo auriculato. *Bocc. Sic.* 89. *t.* 48.

Prope Centum Cellas, et alibi.

413. CONVOLVVLVS (*gneorum*) foliis lan-

ceolatis obtusis, sericeis, pedunculis multifloris.

Convolvulus major erectus, creticus, argenteus. *Moris. Hist.* 2. *p.* 11. *Se.* 1. *t.* 3. *f.* 1.

Convolvulus Saxatilis erectus, villosus, perennis. (*Rizzot.* Convolvolo perenne, e peloso) *Barr. rar.* 4. *t.* 170. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 79 *t.* 70.

Cneorum album, folio oleae argenteo molli *C. B. P.* 463.

Prope Ansuram. Eliminat superfluas serositates etc.

414. CONVOLVVLVS (*lineatus*) foliis ex adverso lanceolatis, sericeis, pedunculis multifloris.

Convolvulus serpens, maritimus, spicae foliis. *Triumf. Obs.* 91. *t.* 91. *f.* 2.

Convolvulus Saxatilis, erectus, villosus, perennis. *Barr. Rar.* 1. *t.* 470. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 79. *t.* 70.

Dorycnium. *Alp. exotic.* 74. *t.* 73.

Prope Ansuram, non procul a Templo Neptuni.

415. CONVOLVVLVS (*cantabrica* campanella piccola con frondi strette) foliis lineari-lanceolatis acutis, caule ramoso recto, pedunculis bifloris. *Linn. Hort. Cliff.* 68. *Sauv. Monsp.* 56.

Convolvulus minimus spicaefolius. *Moris. Hist.* 2. *p.* 17. *Se.* 1. *t.* 4. *f.* 3.

Convolvulus linariae folio. *C. B. P.* 295.

Cantabrica quorundam. *Clus. Hist.* 2. *p.* 49.

Prope Farnesium habitat.

416. CONVOLVVLVS (*tricolor*) foliis lanceolatoovatis glabris, caule declinato, floribus solitariis. *Roy. Lugbd.* 428.

Convolvulus foliis lanceolato-ovatis nudis, caule recto, floribus solitariis. *Linn. Hort. Cliff.* 68. *Vpsal.* 38.

Convolvulus peregrinus caeruleus, folio oblongo. *C. B. P.* 295.

Convolvulus peregrinus caeruleus, folio oblongo, flore triplici colore insignito. *Moris. Hist.* 2. *p.* 17. *Sc.* 1. *t.* 4. *f.* 4.

Campanella con fiori turchini, e frondi lunghe.

Prope montem Cori,

417. CONVOLVVLVS (*soldanella*, *vulgo* Soldanella) foliis reniformibus, pedunculis unifloris. *Roy. Lugbd.* 428.

Brassica marina. *Cord. Hist.* 205.

Soldanella maritima minor. *C. B. P.* 295.

Circa litus Maris Mediterranei, fere ubique. Purgat, et resolvit etc.

418. CONVOLVVLVS (*lobatus*) repens foliis hastatosagittatis et lobatis, lobis truncatis, pedunculis polyfloris.

Secus viam, quae ducit ad Malam cryptam et etiam quae ad Januam Divi Laurentii ducit intra Civitatem, ad laevam.

IPOMAEA

419. IPOMAEA (*digitata*, *vulgo* Convolvulo con le frondi tagliate in cinque parti) foliis digitatis, glabris, foliolis sessilibus, caule laevi.

Convolvulus foliis digitatis, glabris, caule laevi. *Roy. Lugbd.* 429.

Convolvulus quinquefolius, glaber, Americanus. *Pluk. Alm.* 116. *t.* 167. *f.* 6.

Vivit prope Baucinum juxta Arcem.

POLEMONIVM

420. POLEMONIVM (*Caeruleum*, *vulgo* Valeriana con fiore turchino) foliis pinnatis, floribus erectis, calycibus corollae tubo longioribus. *Linn. Spec. Plant.* 11. *p.* 230.

Polemonium calycibus lanatis. *Linn. Hort. Vpsal.* 40.

Polemonium. *Linn. Flor. Lapp.* 86. 183. *Flor. Svec.* 175. *Hort. Cliff.* 163. *Roy. Lugbd.* 432. *Hall. Helv.* 490.

Valeriana caerulea. *C. B. P.* 164.

Crescit in monte vulgo Bastone juxta Reatum. Vulneraria etc.

CAMPANVLA

FOLIIS LAEVIORIBVS ANGVSTIORIBVS

421. CAMPANVLA (*rotundifolia*, *vulgo* Campanella minore con le frondi tonde) foliis radicalibus reniformibus, caulinis lineari-

bus. *Roy. Lugbd.* 247. *Dalib. Par.* 66. *Linn. Hort. Cliff.* 65.

Campanula minor rotundifolia vulgaris. *C. B. P.* 93.

Campanula minor rotundifolia alpina. *C. B. P.* 93. *Prodr.* 34. *t.* 34. (*a*)

Campanula alpina linifolia caerulea. *C. B. P.* 93. *Magn. Mons.* 47. *t.* 46.

Habitat in pasquis Sessiae, et Priverni.

422. CAMPANVLA (*rapunculus*, *vulgo* raponzolo, la di cui radica si mangia) foliis undulatis, radicalibus, lanceolato-ovalibus, panicula coarctata. *Linn. Spec. Plant.* 5. *p.* 232.

Campanula foliis radicalibus lanceolato-ovalibus, caule ramosissimo patulo. *Dalib. Paris.* 68. *Linn. Cliff.* 65.

Rapunculus esculentus. *C. B. P.* 92.

Rapunculus. *Dod. Pempt.* 165.

Fere ubique juxta vias suburbanas, et agros. Datur flore albo, flore caeruleo, et ex caeruleo rubente. Refrigerat exiccat etc.

423. CAMPANVLA (*persicifoliis vulgo* Raponzolo con foglia di Persico) foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolato-linearibus subserratis, sessilibus, remotis. *Dalib. Paris.* 67. *Flor. Svec.* 179. 187.

Campanula foliis lineari-lanceolatis, crenatis,

caule longissimo, simplicissimo, floribus raris. *Roy. Lugbd.* 346. *Hort. Cliff.* 65.

Rapunculus persicifolius, magno flore. *C. B. P.* 93.

Rapunculus nemorosus, angustifolius, magno flore, major. *C. B. P.* 93. *(a)*

In Sabinis et signanter juxta Castrum novum.

424. CAMPANVLA (*pyramidalis, vulgo* Viola Piramidale) foliis ovatis, glabris, subserratis, caule erecto paniculato, ramulis brevibus. *Linn. Spec. Pl.* 7. *p.* 233.

Campanula foliis ovatis, glabris, obsolete serratis, ramis brevissimis cauli approximatis. *Roy. Lugbd.* 246. *Linn. Vir. Cliff.* 17.

Rapunculus hortensis, latiore folio, seu pyramidalis. *C. B. P.* 93.

Prope Arcem Pali vivit juxta Mediterranei rivum, vulgo di S. Biagio.

425. CAMPANVLA (*rhomboidalis*) foliis rhomboidibus, serratis, spica secunda. *Linn. Spec. Plant.* 10. *p.* 233.

Campanula foliis rhomboidibus serratis, spica unilateri subnuda. *Hall. Helv.* 491.

Campanula, Drabae minoris foliis. *C. B. P. Prodr.* 36.

Rapunculus Teucrii folio. *Barr. rar.* 78. *t.* 567.

Rapunculus alpinus (*teucrifolio*) rhomboidalis. *Boer. Mus.* 75. *t.* 61.

Crescit in Sabinis juxta Abatiam S. Salvatoris majoris.

FOLIIS SCABRIS LATIORIBVS

426. CAMPANVLA (*Bononiensis, vulgo* Campanula con fiore più tosto piccolo di colore azzurro, *et etiam vocatur* Cervicaria di Bologna) foliis ovatolanceolatis subtus scabris sessilibus, caule paniculato. *Linn. Spec. Plant.* 13. *p.* 234.

Campanula, sive Cervicaria Bononiensis, flore parvo. *Bauh. Hist.* 2. *p.* 804. *Moris. Hist.* 2. *p.* 461. *se.* 5. *t.* 4. *f.* 38.

Campanula foliis lanceolatis leviter serratis alternis, floris thyrso spicato, et ad basin ramoso. *Segu. Ver.* 1. *p.* 176.

Multis in locis montanis luxuriat et etiam prope sepulchrum Nasonum.

427. CAMPANVLA (*graminifolia vulgo* Campanula alpina con frondi di Gramiccia) foliis linearisubulatis, capitulo terminali. *Linn. Spec. Plant.* 14. *p.* 234.

Campanula alpina Tragopogonis folio. *C. B. P.* 94.

Trachelium Tragopogonis folio, montanum. *Col. Phyt.* 2. *p.* 25. *f. B. Hist.* 2. *p.* 602.

Trachelium minus, gramineum, caeruleoviolaceum. *Barr. Jcon.* 332.

In Sabinis propre Reatum.

428. CAMPANVLA (*trachelium vulgo* Campanula maggiore con foglie di Ortica) caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. *Roy. Lugbd.* 245. *Dalib. Par.* 66.

Campanula foliis radicalibus cordatis, calycibus ciliatis. *Lin. Hort. Cliff.* 64.

Campanula vulgatior, foliis Urticae, vel major, et asperior. *C. B. P.* 94.

Fere ubique juxta nemora et vias.

Exiccat et parum adstringit etc.

429. CAMPANVLA (*glomerata*) caule angulato simplici, floribus sessilibus, capitulo terminali. *Roy Lugbd.* 245. *Dalib. Par.* 67.

Campanula foliis lanceolatoovatis, crenatis, ramis capitulo florali terminatis. *Linn. Hort. Cliff.* 66.

Campanula pratensis, flore glomerato. *C. B. P.* 94.

Trachelium alpinum, floribus conglomeratis, foliis Asarinae rigidis, et hirsutis. *Herm. Par.* 235. *t.* 235.

Non procul a Vetruclano juxta ecclesiam S. Augustini.

430. CAMPANVLA (*medium vulgo* Viola Ma-

riana) capsulis quinquelocularibus, obtectis, caule simplici erecto, folioso, floribus erectis. *Linn. Virid. Cliff.* 16. *Roy. Lugbd.* 245.

Campanula calycibus a tergo lamellis quinque notatis. *Linn. Hort. Cliff.* 64.

Campanula hortensis, folio, et flore oblongo. *C. B. P.* 94.

Viola Mariana. *Dod. Pent.* 163.

Crescit juxta Castrum novum Portus.

431. CAMPANVLA (*saxatilis*) foliis obvatis, crenatis, floribus alternis nutantibus, capsulis quinque carinatis. *Linn. Spec. Plan.* 26. *p.* 237.

Campanula Cretica saxatilis Bellidis folio, magno flore. *Tour. I. R. H.* 111. *Barr. rar.* 79. *t.* 813.

Trachelium saxatile Bellidis flore, caeruleum, creticum. *Bocc. Mus.* 3. *p.* 76. *t.* 64.

Vivit prope Castrum S. Joannis in Sabinis ad rupes.

CAVLE SVBDIVISO

432. CAMPANVLA (*speculum veneris, et* campanula, con frondi ovate longhe, e capsule a cantoni) caule ramosissimo diffuso, foliis oblongis subcrenatis, calycibus solitariis, corolla longioribus, capsulis prismaticis. *Linn. Hort. Vps.* 41.

Campanula caule ramoso, foliis ovatooblongocrenatis. *Linn. Hort. Cliff.* 65.

Campanula calycibus corollam superantibus, capsulis columnaribus. *Roy. Lugbd.* 247. *Dalib. Par.* 68. *Linn. Virid. Cliff.* 17.

Onobrychis arvensis, seu Campanula arvensis erecta. *C. B. P.* 215.

Inter segetes fere ubique: Datur etiam cum flore albo.

433. CAMPANVLA (*hybrida*, *vulgo* Specchio di venere minore) caule basi subramoso, stricto, foliis oblongis crenatis, calycibus aggregatis corolla longioribus, capsulis prismaticis. *Linn. Spec. Plant.* 32. *p.* 239.

Campanula arvensis minima erecta. *Moris. Hist.* 2. *p.* 457. *Se.* 5. *t.* 2. *f.* 22.

Speculum Veneris, minus. *Rai. Hist.* 743.

Differt a speculo 434. quia tantum in primo exortu in ramos dispertitur et corolla constat minima et habitat ad praedium *vulgo la Cosimata*.

434. CAMPANVLA (*perfoliata*, *Rizot.* Pentagonia, *et* Campanola a cinque cantoni) caule simplici, foliis cordatis dentatis amplexicaulibus, floribus sessilibus aggregatis. *Linn. Hort. Vps.* 40.

Campanula caule simplicissimo, foliis amplexicaulibus. *Linn. Hort. Cliff.* 65. *Roy. Lugbd.* 247. *Gron. Virg.* 22.

Campanula pentagonia perfoliata. *Moris. Hist. p.* 457. *Se.* 5. *t.* 2. *f.* 23. *Barr. rar.* 83. *t.* 1133.

Habitat ad Castrum Guidi.

435. CAMPANVLA (*erinus*) caule dichotomo, foliis sessilibus utrinque dentatis, floralibus oppositis. *Linn. Hort. Cliff.* 65. *Roy. Lugbd.* 247. *Guett. Stamp.* 429.

Rapunculus minor, foliis incisis. *C. B. P.* 92.

Erini, seu Rapunculi minimum genus. *Col. Phytob.* 122. *t.* 28.

Alsine oblongo folio serrato, flore caeruleo. *I. B. Hist.* 3. *p.* 367.

Juxta Pinetum Sacchetti.

436. CAMPANVLA (*hederacea*, *vulgo* Campanula con le frondi di cimbalaria) foliis cordatis, quinque lobis petiolatis glabris, caule laxo. *Dalib. Paris.* 68.

Campanula Cymbalariae, vel Hederae folio. *C. B. P.* 93. *Prodr.* 84. *Moris. Hist.* 2. *p.* 456. *Se.* 5. *t.* 4. *f.* 18. *Pluk. Phyt.* 23. *f.* 1.

Vivit juxta fontes Reate et ad fluvium Velinum.

PHYTEVMA

437. PHYTEVMA (*hemisphaericum*) capitulo subrotundo, foliis linearibus integerrimis. *Linn. Spec. Pl.* 2. *p.* 241.

Phyteuma foliis linearibus, floribus capitatis. *Roy. Lugbd.* 248.

Rapunculus umbellatus, folio gramineo. *C. B. P.* 92.

Rapunculus sylvestris caeruleus umbellatus. *Tall. Herc.* 94. *t.* 3.

Rapuntium alterum angustifolium alpinum. *Col. Ecph.* 2. *p.* 23. *t.* 26.

Prope Palumbariam vitam ducit.

438. PHYTEVMA (*orbiculare*, *vulgo* Rapuncolo con la spiga tonda) capitulo subrotundo, foliis serratis, radicalibus cordatis. *Linn. Spec. Plant.* 3. *p.* 242.

Phytema foliis oblongis, spica orbiculari. *Dalib. Par.* 69. *Guett. Stamp.* 1. *p.* 34.

Rapunculus folio oblongo, spica orbiculari. *C. B. P. Moris. Hist.* 2. *p.* 463. *sc.* 5. *t.* 5. *f.* 47.

Rapuntium montanum rarius corniculatum. *Col. Ecph.* 1. *p.* 222. *t.* 224.

Crescit prope montem Sorat.

TRACHELIVM

439. TRACHELIVM (*caerulaeum vulgo* Trachelio). *Linn. Hort. Vpsal.* 41.

Trachelium foliis ovatis, serratis, corymbis compositis. *Roy. Lugbd.* 248. *Linn. Virid. Cliff.* 17.

Trachelium foliis ovatis, serratis, caule umbella terminato. *Linn. Hort. Cliff.* 66.

Cervaria valerianoides caerulea. *C. B. P.* 93.

Ad scaturigines aquarum non procul a Tiburc, et aliis in locis vivit. Adstringens, et detergens etc.

S A M O L V S

440. SAMOLVS (*valerandi vulgo* Anagallide acquatica). *Roy. Lugbd.* 249. *Gron. Virg.* 23. *Linn. Hort. Cliff.* 51. *Dalib. Par.* 69.

Anagallis aquatica, rotundo folio non crenato. *C. B. P.* 252.

Alsine aquatica, foliis rotundis Beccabungae. *Moris. Hist.* 2 *Pag.* 323. *se.* 3. *t.* 24. *f.* 28.

Frequens invenitur ad scaturigines aquarum.

Antiscorbuticus, aperiens, et detergens etc,

L O N I C E R A

PERICLYMENA, CAVLE VOLVBILI

441. LONICERA (*caprifolium vulgo* Madre selva) floribus verticillatis terminalibus sessilibus, foliis summis connatoperfoliatis. *Roy. Lugbd.* 237. *Linn. Hort. Cliff.* 45. *Sauv. Monsp.* 139.

Periclymenum perfoliatum. *C. B. P.* 302.

Caprifolium Italicum. *Dod. Pempt.* 441.

Vivit ad Theatrum Flavium et ad sepes multis in locis.

Diuretica, et in hydrophobia etc.

442. LONICERA (*periclymenum vulgo* Madre selva con li fiori rosseggianti) capitulis ovatis, imbricatis, terminalibus, foliis omni-

bus distinctis. *Roy. Lugbd.* 337. *Dalib. Paris* 69.

Periclymenum non perfoliatum, Germanicum. *C. B. P.* 302.

Caprifolium non perfoliatum. *Hort. Angl. t.* 6. *et* 18. *f.* 42.

Caprifolium Germanicum flore rubello, serotinum. *Tour. I. R. H.* 226.

Habitat juxta sepes, et dumeta.

Detergens et vulneraria planta etc.

443. LONICERA (*connata*) foliis omnibus connatis, floribus semiverticillatis, caule dichotomo.

Crescit juxta montem D. Pauli duodecimo ab urbe lapide.

CHAMAECERASA PEDVNCVLIS BIFLORIS

444. LONICERA (*xylosteum*) pedunculis bifloris, baccis distinctis, foliis integerrimis, pubescentibus. *Roy. Lugbd.* 238. *Dalib. Par.* 69. *Sauv. Mons.* 140.

Lonicera pedunculis bifloris, foliis ovatis obtusis integris. *Linn. Hort. Cliff.* 58.

Chamaecerasus dumetorum, fructu gemino rubro. *C. B. P.* 451.

Habitat in dumetis montis Januarii et Nursiae.

Deobstruens.

CORIS

445. CORIS (*monspeliensis*) *Roy. Lugbd.* 304. *Linn. Hort. Cliff.* 68. *Saur. Monsp.* 46.
Coris caerulea, maritima. *C. B. P.* 280.
Symphytum petraeum. *Cam. Epit.* 699.
Ad litus Centum Cellarum in arenosis.

VERBASCVM

446. VERBASCVM (*thapsus vulgo* Verbasco maggiore) foliis decurrentibus, utrinque tomentosis. *Cliff. Lugbd.* 421. *Dalib. Paris.* 71.
Verbascum caule simplici, superne floribus sessilibus clavato, foliis utrinque lanigeris. *Linn. H. Cliff.* 55.
Verbascum mas latifolium luteum. *C. B. P.* 239.
Verbascum latius. *Dod. Pempt.* 153.
Vivit juxta vias et in agris glareosis.
Emolliens et smegmaticum etc.

447. VERBASCVM (*lychnitis, vulgo* Verbasco polveroso) foliis cuneiformi-oblongis. *Linn. Hort. Vpsal.* 45.
Verbascum foliis ovatoacutis, subtus villosis, crenatis, spicis laxis lateralibus, et terminalibus. *Roy. Lugbd.* 421. *Linn. Hort. Cliff.* 54. *Dalib. Par.* 71.
Verbascum pulverulentum, flore luteo parvo. *I. B. Hist.* 3. *p.* 812. *Rai. Hist.* 1094.

Verbascum mas angustioribus foliis, floribus pallidis. *C. B. P.* 239.

Verbascum lychnitis flore albo parvo. *C. B. P.* 240. *vulgo* Verbasco con li fiori piccoli bianchi.) (*a*)

Verbascum candidum femina. *Fuch. Hist.* 847.

Phlomis mas, alter. *Lob. Icon.* 562. (*b*)

Habitat ad ripas Tiberis, etiam intra Vrbem.

Decoctum ad hemorrhagias etc.

448. Verbascum (*nigrum vulgo* verbasco di colore verde oscuro, con li fiori gialli porporascenti) foliis oblongo-cordatis, petiolatis. *Linn. Mat. Med.* 91.

Verbascum foliis ovatis crenatis subtus tomentosis, caule angulato. *Roy. Lugbd.* 421. *Dalib. Par.* 91. *Linn. Virid. Cliff.* 13.

Verbascum foliis ovatis, subtus incanis crenatis, spica laxa rarius ramosa. *Linn. Hort. Cliff.* 51.

Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascente. *C. B. P.* 240.

Ad vias et campos vivit.

In colica et diarrhoea.

449. VERBASCVM. (*blattaria vulgo* Blattaria con le foglie lunghe, liscie, e dentate, e fiori gialli) foliis amplexicaulibus oblongis, glabris, pedunculis solitariis. *Linn. Hort. Vpsal.* 46.

Verbascum annuum foliis oblongis, sinuatis, obtusis. *Linn. Hort. Cliff.* 15. *Guet. Stamp.* 2. *p.* 309.

Verbascum foliis glabris serrato-dentatis, radicalibus sinuatis. *Roy. Lugbd.* 424. *Dalib. Par.* 72. *Sauv. Monsp.* 276.

Blattaria lutea folio longo laciniato. *C. B. P.* 240.

Blattaria alba (con li fiori bianchi) *C. B. P.* 241.

Habitat in Amphitheatro Flavio, et alibi.

In clysmate emollit etc.

450. VERBASCVM (*sinuatum*) graecum, fruticosum, folio sinuato candidissimo. *Tour. Coroll.* 8. *Itin.* 1. *p.* 335. *t.* 335.

Ad Rusticam, et ad montes Lanthi et alibi.

DATVRA

451. DATVRA (*stramonium*, *vulgo* Stramonio con frutto lungo, e spinoso) pericarpiis spinosis, erectis, ovatis, foliis ovatis glabris. *Lin. Hort. Cliff.* 55. *Roy. Lugbd.* 422. *Dalib. Paris.* 70. *Gron. Virg.* 23.

Solanum foetidum, pomo spinoso oblongo, flore albo. *C. B. P.* 168.

Tatula. *Cam. Epit.* 176.

Vegetat ad ripam Tiberis, et multis aliis in locis.

Datura flore, et caule atroviolaceo (*vulgo* Stramonio con fiore violaceo oscuro, e frutto spinoso.) (*a*)

Cum praecedenti ut plurimum vivit.

452. DATVRA (*metel*) pericarpiis spinosis nutantibus, globosis , foliis cordatis , subintegris , pubescentibus . *Linn. Hort. Cliff.* 55. *Roy. Lugbd.* 422.

Solanum pomo spinoso rotundo , longo flore . *C. B. P.* 168.

Hummatu. *Reed. Mal.* 2. *p.* 47. *t.* 28.

Crescit ad Tabernam , quae est in via publica non procul a Valle Montonis , et nonnullis aliis in locis. Vide Op. Stork.

HYOSCYAMVS

453. HYOSCYAMVS (*niger* , *vulgo* Iusquiamo nero) foliis amplexicaulibus sinuatis , floribus sessilibus . *Roy. Lugbd.* 422. *Dalib. Par.* 70. *Hall. Helv.* 512.

Hyoscyamus vulgaris , et niger . *C. B. P.* 169.

Juxta Civitatem Castelli, et alibi. Vid. Op. Storck.

454. HYOSCYAMVS (*albus* , *vulgo* Iusquiamo bianco) foliis petiolatis sinuatis , obtusis, floribus subsessilibus . *Linn. Hort. Cliff.* 56. *Roy. Lugbd.* 422. *Sauv. Mons.* 275.

Hyoscyamus albus minor . *C. B. P.* 169.

Hyoscyamus albus major . *C. B. P.* 169.

Hyoscyamus albus vulgaris . *Clus. Hist.* 2. *p.* 118.

Ad Maenzam, Julianum, et aliis in locis.

Externe est anodynus . Vid. Opus Storck.

ATROPA

455. ATROPA (*arborescens* *vulgo* Bella don-

na, et Solatro maniaco) caule frutescente, pedunculis confertis, corollis revolutis, foliis oblongis. *Amoen. Acad.* 4. *p.* 307.

Belladonna frutescens, flore albo, nicotianae foliis. *Plum. Spec. I. Ic.* 46. *f.* 1.

Ad Montem Januarium, et Supinum.

456. ATROPA (*belladonna*) caule herbaceo, foliis ovatis integris.

Atropa. *Roy Lugbd.* 423. *Linn. Hort. Cliff.* 57.

Solanum melanocerasus. *C. B. P.* 166.

Solanum lethale. *Clus Hist.* 2. *p.* 86.

Crescit in montibus Vulscorum et Samnitarum.

Interne est venefica.

PHYSALIS

PERENNES

457. PHYSALIS (*alkekengi vulgo* Alkekengi delle spezierie, et volgare) foliis geminis integris, acutis, caule herbaceo, inferne subramoso. *Linn. Spec. Plant.* 6. *p.* 262.

Physalis caule simplici, annuo, foliis integerrimis, geminatis, floribus solitariis. *Dalib. Par.* 73. *Linn. Hort. Cliff.* 62.

Physalis radice perenni, foliis lanceolatocordatis. *Roy. Lugbd.* 426.

Solanum vesicarium. *C. B. P.* 166. *Dod. Pempt.* 454.

Virit in arundinetis.

Baccae in vino renes mirabiliter purgant.

ANNVAE

458. PHYSALIS (*angulata vulgo* Alkekengi con frondi di Peperone) annua, ramosissima ramis angulosis glabris, foliis dentatoserratis. *Linn. Hort. Cliff.* 62. *Roy. Lugbd.* 427.

Halicacabum, sive solanum Indicum. *Cam. Hort.* 70. *t.* 17.

Solanum vesicarium Indicum. *C. B. P.* 166.

Alkekengi Indicum glabrum, chenopodii folio. *Dill. Elth.* 13. *t.* 12. *f.* 12.

Alkekengi Indicum glabrum, Capsici folio. *Dill. Elth.* 12. *t.* 11. *f.* 11.

Habitat in arundinetis fere ubique.

SOLANVM

459. SOLANVM (*dulcamara vulgo* Dulcamara con li fiori bianchi, et volgare) caule inermi frutescente, flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. *Roy. Lugbd.* 424. *Dalib. Paris.* 73. *Linn. Hort. Cliff.* 60.

Solanum scandens, seu Dulcamara. *C.B.P.* 167.

Dulcamara flore albo. *(a)*

Crescit juxta Tiberim intra urbem, et extra, multis in locis aquosis. (a) Vero infra Paludes Pontinas.

Attenuans, et detergens etc.

460. SOLANVM (*nigrum*) caule inermi herbaceo, foliis ovatis, dentatoangulatis, umbellis nutantibus. *Linn. Spec. Plant.* 15. *p.* 266.

Solanum (*vulgatum*) caule inermi herbaceo foliis ovatis angulatis. *Roy. Lugbd.* 433. *Dalib. Paris.* 72. *Linn. Hort. Cliff.* 60. *Gron. Virg.* 24.

Solanum (*officinarum*, *vulgo* Solatro ortense *et etiam* Solano). *C. B. P.* 166.

Solanum ramis teretibus, glabris, foliis integerrimis, glabris.

Solanum (*patulum*) procerius, patulum, vulgaris fructu. *Dill. Elth.* 367. *t.* 275. *f.* 355. (*a*)

Solanum (*villosum*) ramis teretibus, villosis, foliis angulatis subvillosis. (*b*)

Solanum (*hirsutum*) annuum hirsutius, baccis luteis. *Dill. Elth.* 366. *t.* 274. *f.* 353. (*c*)

Solanum ramis angulatis, dentatis, foliis repandis, glabris. (*d*)

Solanum Guineense fructu magno instar Cerasi. *Dill. Elth.* 366. *t.* 274. *f.* 354.

Solanum (*virginicum*) nigrum vulgari simile, caulibus exasperatis. *Dill. Elth.* 368. *t.* 275. *f.* 256.

Solanum (*spinosum sive judaicum*) ramis aculeis incurvis, foliis repandis, nudis. (*e*)

(a) (b) (c) (d) habitant in incultis et humentibus fere ubique. (e) vero juxta Abatiam Fossae novae.

Externe refrigerans, et anodynum.

LYCIVM

461. LYCIVM (*afrum* , *vulgo* Spina della Corona di G. C.) foliis linearibus. *Linn. Hort. Cliff.* 57. *Hort. Vpsal.* 47. *Mill. Dict. t.* 177. *f.* 1.

Iasminoides africanum, Iasmini aculeati foliis, et facie. *Niss. Act.* 1711. *p.* 420. *t.* 12.

Rhamnus alter foliis salsis, flore purpureo. *C. B. P.* 477.

Iasminoides aculeatum, humile, Helimi minoris folio, flore minore, per maturitatem flavescente. *Mich. gen.* 224. *t.* 105. *f.* 2.

Crescit juxta litus maris mediterranei, non procul ab arce Pali.

462. LYCIVM (*odoratum*) foliis acinaciformibus, geminis. Fructex spinis horridus, sub singulis spinis duo foliola acinaciformia, tres, aut quatuor uncias lata erumpunt, singula vaginata: et ex eodem principio flores sunt candidissimi et gratissimum spirant odorem, racematim dispositi.

Habitat juxta sepes ad quinque Camminos, tertio ab urbe lapide, et toto anno viget.

463. LYCIVM foliis cuneiformibus.

Iasminoides aculeatum, Salicis folio, flore parvo, ex albo purpurascente. *Mich. gen.* 224. *t.* 105. *f.* 1.

Rhamnus (*vulgo* Ramno con spine lunghe) spinis oblongis , flore candicante . *C. B. P.* 477.

Crescit prope Ecclesiam S. Pancratii et alibi ad sepes.

RHAMNVS

SPINOSI

464. RHAMNVS (*catharticus* , *vulgo* Spinomerlo) spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis , foliis ovatis. *Roy. Lugbd.* 224. *Linn. Hort. Cliff.* 70.

Rhamnus catharticus. *C. B. P.* 478.

Cersvispina. *Cord. Hist.* 175.

Crescit in sepibus, et dumetis extra januam portuensem , et multis aliis in locis.

Syrupus exbaccis est optimum purgans cum vino.

INERMES

465. RHAMNVS (*alpinus*) inermis , floribus dioicis , foliis duplicatocrenatis . *Linn. Spec. Plant.* 4. *p.* 280.

Frangula ora folii serrata . *Hall. Helv.*164.

Frangula rugosiore , et ampliore folio . *Tour. I. R. H.* 612.

Alnus nigra baccifera , rugosiore folio (*vulgo* Alno con il frutto nero) seu major. *I. B. Hist.* 1.*p.* 262

Alnus nigra polycarpos . *C. B. P.* 428.

Ad Montes Tiburtinos habitat. Purgat etc.

466. RHAMNVS (*alaternus, vulgo* Phylica altera , et Alaterno) inermis, floribus dioecis, stigmate triplici , foliis serratis. *Sauv. Monsp.* 95. *Linn. Virid. Cliff.* 19.

Rhamnus inermis , floribus polygamis , stigmate triplici , foliis serratis . *Roy. Lugbd.* 225. *Linn. Hort. Cliff.* 70.

Phylica elatior . *C. B. P.* 477.

Phylica humilior. *C. B. P.* 467.

Alaternus . 1. *et* 2. *Clus. hist.* 2. *p.* 50.

Ad montes Ansurae habitant.

ACVLEATI

467. RHAMNVS (*paliurus* , *vulgo* Paliuro) aculeis geminatis , inferiore reflexo , floribus trigynis. *Roy. Lugbd.* 224. *Linn. Hort. Cliff.* 69. *Sauv. Monsp.* 306.

Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso . *C. B. P.* 477.

Paliurus . *Dod. Pempt.* 576.

Rhamnus aculeis geminatis , inferiore reflexo , floribus trigynis , margine foliorum crispo , et profunde serrato . *(a)*

Juxta sepes ad maris Tyrrheni litora vivunt .

468. RHAMNVS (*lotus* , *vulgo* Genzola Salvatica) aculeis geminatis , altero recurvo , foliis ovatooblongis . *Linn. Spec. Plant.* 12. *p.* 281.

Zizyphus Sylvestris. *Tour. I.R. H.*627. *Schaw. Afr.* 631. *f.* 631.

Frutex ramulis teretibus, aculei duo ad exortum foliorum, altero horizontali, recurvo altero, ut in Paliuro, sed folia omnia Zizyphi, figura, nervis, glabritie, magnitudine, at margine obsolete, et rarius crenata.

Crescit prope Trajani Portum.

469. RHAMNVS (*juiuba*, *vulgo* Genzola con il frutto tondo) aculeis solitariis, recurvis, pedunculis aggregatis, floribus semidigynis, foliis retusis, subtus lanatis.

Jujuba Indica, spinosa, folio, et fructu rotundo. *Pluk. Alm.* 199. *Rai. Dend.* 44.

Ad montem Circellum habitat, et fructus raro ad maturitatem perveniunt.

470. RHAMNVS (*Zizyphus*, *vulgo* Genzola domestica) aculeis geminatis rectis, floribus digynis, foliis ovatooblongis glabris. *Roy. Lugbd.* 224.

Juiuba Silvestris. *C. B. P.* 446.

Zyziphus. *Dod. Pempt.*807.

Juiubae maiores oblongae. *C. B. P.* 446. (*a*)

Crescit prope Templum S. Sebastiani extra Moenia, sed sata in hortis mansuescit etc.

Fructus est Pectoralis etc.

EVONYMVS

471. EVONYMVS (*europaeus vulgo* Beretta di Prete et Fusania) floribus plerisque quadrifidis. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 286.

Euonymus foliis oblongo ovatis. *Roy. Lugbd.* 436. *Hall. Helv.* 523. *Linn. Hort. Cliff.* 38.

Euonymus (*tenuifolius*) vulgaris, granis rubentibus. *C. B. P.* 428.

Juxta sepes et dumeta vivit. Emeticus etc.

RIBES

RIBESIA INERMIA

472. RIBES (*rubrum*, *vulgo* Ribes rosso) inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 290.

Ribes inerme, floribus planiusculis, racemis pendulis. *Roy. Lugbd.* 270. *Linn. Hort. Cliff.* 82. *Dalib. Par.* 75.

Ribes vulgare acidum. *Hist.* 2. *p.* 97. *Linn. Flor Lapp.* 68.

Grossularia multiplici acino, seu non spinosa, hortensis, rubra. *C. B. P.* 455.

Grossularia hortensis (*vulgo* Uva spina) fructu margaritis simili. *C. B. P.* 455. *(a)*

Vivit in Tiburtinis montibus.

Refrigerans, et aperiens etc.

GROSSVLARIAE ACVLEATAE

473. RIBES (*grossularia*, *vulgo* Uva spina)

ramis aculeatis, petiolorum ciliis pilosis, baccis hirsutis. *Linn. Spec. Plant.5. p.*291.

Ribes ramis aculeatis, racemis erectis, baccis hirsutis. *Linn. H. Cliff.* 83.

Ribes ramis aculeatis, erectis, fructu hispido, margaritarum fere colore. *Rai. Hist.* 1484.

Ad montem Januarium, et ad Sabinos montes habitat.

HEDERA

474. HEDERA (*Helix vulgo* Ellera) foliis ovatis lobatisque. *Roy. Lugbd.* 223. *Hall. Helv.*164.

Hedera arborea. *C. B. P.* 305.

Hedera Poetica. *C. B. P.* 305. (*a*)

Hedera major, sterilis. *C. B. P.*305. (*b*)

Vegetant fere ubique, et (a) alla Cervelletta.

Baccae sudoriferae, antipestilentiales.

VITIS

475. VITIS (*vinifera,vulgo* vite) foliis lobatis, sinuatis, nudis. *Linn. Spec. Plant.*1. *p.* 293.

Vitis foliis palmato-angulatis. *Roy. Lugbd.*222.

Vitis vinifera. *C. B. P.* 229.

Vitis (*apyrena, vulgo* Ciambrusca) Corinthiaca, seu Apyrena. *I. B. Hist.* 2. *p.* 72.

Crescit fere ubique in dumetis, fossis, et nemoribus.

476. VITIS (*indica*) foliis cordatis, dentatis, subtus villosis,cyrrhis racemiferis. *Linn. Flor. Zeyl.* 99.

Vitis acinis rotundis . *Rai. Dendr.* 67.

Seritur in vineis.

477. VITIS (*laciniosa vulgo* Malvasia) foliis quinatis, foliolis multifidis. *Roy. Lugbd.* 223. *Linn. Hort. Cliff.* 74.

Vitis laciniatis foliis. *Corn. Canad.* 182. *t.* 183.

Vitis apii folio. *I. B. Hist.* 2. *p.* 73.

In vineis habitat.

478. VITIS (*vinifera*) foliis lobatis, serratis, subtus lanugine quadam pubescentibus.

Vitis acinis albis rotundis.
acinis albis oblongis.
acinis albis ovalibus.
acinis albis pyramidatis.
acinis nigris rotundis.
acinis nigris oblongis.
acinis nigris pyramidatis.
acinis odoratis.
acinis dense confertis.
acinis laxe dispertitis.
acinis viridibus.
acinis flavescentibus.
acinis subluteis.

Seruntur in nostris vineis fere ubique.

Aqua e summitatibus elicitur detergens et aperiens.

479. VITIS (*labrusca*) foliis cordatis subtrilo-

bis dentatis, subtus tomentosis. *Linn. Spec. Plant. I.* 293.

Vitis fructu minore rubro acerbo, folio subrotundo minus laciniato, subtus alba lanugine tecto. *Sloan. Hist.* 2. *p.* 104. *t.* 210. *f.* 4. (*a*)

In Sylvis, et fossis fere ubique. Datur etiam fructu ocroleuco, Exprimitur vinum generosissimum ab acinis satis maturis etc.

ACHYRANTHES

480. ACHYRANTHES (*aspera*) caule erecto, calycibus reflexis, spicae adpressis. *Linn. Flor. Zeyl.* 105.

Achyrantes caule erecto. *Roy. Lugbd.* 418. *Linn. Hort. Cliff.* 42.

Amaranthus Siculus, spicatus. *Bocc. Sic.* 16. *t.* 9. *Pluk. Phytho.* 260. *f.* 2. (*a*)

Crescit juxta ora maritima S. Marinellae.

CELOSIA

481. CELOSIA (*argentea*, *vulgo* Fior velluto, *et* Amaranto *cum sequentibus*) foliis lanceolatis, stipulis subfalcatis, pedunculis angulatis, spicis scariosis. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 296.

Celosia foliis linearilanceolatis. *Roy. Lugbd.* 419. *Linn. Hort. Cliff.* 43.

Amaranthus spica albescente habitiore. *Mart. Cent.* 7. *t.* 7.

Vivit prope Ansuram juxta mare thyrrhenum.

482. CELOSIA (*cristata*) foliis oblongoovatis, pedunculis teretibus substriatis, spicis oblongis. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 205.
Celosia foliis lanceolatoovatis. *Linn. Hort. Cliff.* 43. *Hort. Upsal.* 52. *Roy. Lugbd.* 419.
Amaranthus panicula conglomerata. *C.B.P.* 121.

Seritur in hortis, et sponte ex se propagatur.

483. CELOSIA (*castrensis*) foliis lanceolatoovatis lineatis, acuminatissimis, stipulis falcatis, spicis cristatis. *Linn. Spec. Plant.* 4. *p.* 297.
Amaranthus cristatus. *Cam. Epit.* 792.
Amaranthus minor, spica singulari, lunatis circum caulem foliis. *Barr. Rar.* 471. *t.* 1195. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 77. *t.* 66.
Amaranthus vulgaris. *Rumph. Amb.* 3. *p.* 236. *t.* 84.

Propagatur et seritur ut antecedens.

ILLECEBRVM

484. ILLECEBRVM (*verticillatum vulgo* Paronichia) floribus verticillatis, nudis caulibus. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 298.
Illecebrum caulibus procumbentibus. *Roy. Lugbd.* 214. *Dalib. Par.* 76. 126.
Illecebrum. *Linn. Hort. Cliff.* 492.
Paronychia Serpillifolia, palustris. *Vaill. Paris.* 157. *t.* 15. *f.* 1.

Polygala repens nivea. *C. B. P.* 215.

Ad ripas fossorum, ad planitiem duarum Turrium.

485. ILLECEBRVM (*paronychia*, *vulgo* Ernicaria, et Erba Turca) floribus bracteis nitidis obvallatis, caulibus procumbentibus. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 299.

Herniaria squamis nitidis flores superantibus. *Roy. Lugbd.* 215. *Sauv. Monsp.* 129. *Linn. Hort. Cliff.* 41.

Paronychia Hispanica. *Clus. Hist.* 2. *p* 183.

Polygonum minus, candicans. *C. B. P.* 281.

Lithontripticum et Hernias curat etc. Ad Theatrum Flavium.

G L A V X

486. GLAVX (*maritima*) *Linn. Hort. Cliff.* 43. *Roy. Lugbd.* 417.

Glaux foliis elliptico - oblongis. *Linn. Flor. Lapp.* 72.

Glaux maritima. *C. B. P.* 215.

Alsine bifolia, fructu Coriandri, radice geniculata. *Loesel. Pruss.* 13. *t.* 3.

Vivit juxta stagnum Maccarese. Est planta saponacea aperiens.

T H E S I V M

487. THESIVM (*linophyllon*) panicula foliata, foliis lineari-lanceolatis. *Linn. Spec. Pl.* 1. 301.

Thesium. *Linn. Hort. Cliff.* 41. *Hall. Helv.* 183. *Dalib. Paris.* 75.

Thesium floribus sparsis . *Sauv. Monsp.* 48.
Linaria montana flosculis albicantibus . *C. B. P.* 213.
Sesamoides procumbens , montanum , Linariae folio , floribus albicantibus . *Moris. Hist.* 3. *p.* 601. *se.* 15. *t.* 1. f. 3.
Anonymos lini folio . *Clus. Hist.* 1. *p.* 324.
Onobrychis IV. lutea . *C. B. P.* 215. *Dalech. Hist.* 491. (*a*)

Inter Volscos, prope Castrum Proxedis.

V I N C A

488. VINCA (*minor, vulgo* Vinca per Vinca) caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis , floribus pedunculatis . *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 304.
Vinca foliis ovatis . *Linn. Hort. Cliff.* 77. *Roy. Lugbd.* 412. *Dalib. Paris.* 75.
Clematis Daphnoides minor . *C. B. P.* 301.
Clematis Daphnoides . *Dod. Pempt.* 405.

Crescit , et luxuriat in umbrosis , et juxta sepes .

489. VINCA (*major*) caulibus erectis , foliis ovatis , floribus pedunculatis . *Linn. Spec. Plant.* 2. *p.* 304.
Clematis Daphnoides , major . *C. B. P.* 302. *Dod. Pempt.* 406.

Vivit cum praecedenti . Aperiens et detergens .

NERIVM

490. NERIVM (*oleander vulgo* Nerio, et Mazza di S. Giuseppe) foliis lineari-lanceolatis, ternis. *Roy. Lugbd.* 412. *Linn. H. Cliff.* 76.
Rhododendron. *Dod. Pempt.* 851.
Nerium floribus rubescentibus. *C. B. P.* 464.
floribus albis. *(a)*
flore pleno. *(b)*
Areli. *Rheed. Mal.* 9. *p.* 1. *t.* 2.

Vivit (a) (b) in hortis cicuratum. Externe tantum in scabie.

PENTANDRIA DIGYNIA

ASCLEPIAS

FOLIIS OPPOSITIS PLANIS

491. ASCLEPIAS (*vincetoxicum*, *vulgo* Vincitossico) foliis ovatis, basi barbatis, caule erecto, umbellis proliferis. *Linn. Spec. Plant.* 12. *p.* 314.
Asclepias caule erecto simplicissimo herbaceo, foliis cordato-lanceolatis, racemis conglomeratis alternis. *Linn. Fl. Svec.* 200. *Dalib. Paris.* 76.
Asclepias albo flore. *C. B. P.* 303.
Vincetoxicum. *Dod. Pempt.* 407.

Habitat in montibus Sabinorum et Gennari.

492. ASCLEPIAS (*nigra*, *vulgo* Vincitossico con li fiori oscuri) foliis ovatis, basi barba-

tis, caule superne subvolubili. *Linn. Spec. Plant.* 13. *p.* 315.

Asclepias caule subvolubili, herbaceo, foliis ovato-lanceolatis, floribus confertis patentissimis. *Roy. Lugbd.* 410. *Sauv. Monsp.* 133. *Linn. Hor. Vpsal.* 53.

Asclepias nigro flore. *C. B. P.* 303.

Vincetoxicum flore nigro. *Cam. Epit.* 560.

Ad Ostia Tiberina habitat.

493. ASCLEPIAS (*prolifera*) caule repente et scadente, foliis ovato-acuminatis, umbellis proliferis, ex luteo rubentibus.

In fovea Hostiensi juxta Pinetum Sacchetti habet domicilium. Alexipharmaca. etc.

HERNIARIA

481. HERNIARIA (*glabra vulgo* Ernaria, *et* Erba Turca *sed confundunt cum Illecebrum N.* 488. *nam haec est vera Herniaria, in calculis, et hernia potentissima*) glabra, herbacea. *I. B. Hist.* 3. *p.* 378.

Herniaria calycibus bractea nudis. *Linn. Hort. Cliff.* 41. *Roy. Lugbd.* 215. *Hall. Helv.* 182. *Dalib. Paris.* 76.

Polygonum minus, (*vulgo* Erba Turca maggiore) sive Millegrana major. *C. B. P.* 281.

Non procul a Ponte Milvio et multis aliis in locis arenosis, et sterilibus. In Herniis et lapillos frangit.

495. HERNIARIA hirsuta herbacea. *I. B. Hist.* 3. *p.* 329.

Crescit juxta agrorum limites, et signanter prope Farnesium.

496. HERNIARIA (*lenticulata*) quae Polygonum Lenticulatum . *Linn. Spec. Pl.* 4. *p.* 317.

Polygonum minus, tenuifolium . *C. B. P.* 281.

Polygonum majus lentifolium . *C. B. Prodrom.* 131.

Habitat non procul a Tusculo , et etiam in ingressu Civitatis.

Polygonum maritimum longius radicatum , nostras, serpilli folio , crasso , nitente . *Pluk. Almag.* 302. *t.* 53. *f.* 3. *Pet. herb.* 10. *f.* 6. *Rai Angl.* 3. *p.* 161.

Ad siccos , et glareosos campos et vias campestres , ad mare Tyrrenum .

CHENOPODIVM

FOLIIS ANGVLOSIS

497. CHENOPODIVM (*vulgo* Lapato , *et* Romice con le frondi a frezza) foliis triangulari-sagittatis integerrimis , spicis compositis aphyllis . *Roy. Lugbd.* 278. *Hall. Helv.* 174. *Dalibard. Paris.* 79. *Linn. Hort. Cliff.* 84.

Lopathum unctuosum . *C. B. P.* 115.

Bonus Henricus. *I. B. Hist.* 2. *p.* 965.

In montibus Sabinorum , ad stabula ovium .

498. CHENOPODIVM (*urbicum*, *vulgo* Can-

nopodio con frondi grandi) foliis triangularibus, subdentatis, racemis confertis strictissimis cauli approximatis longissimis. *Linn. Flor. Svec.* 209.

Chenopodium latifolium, minus ramosum, petiolis longissimis ex foliorum alis confertim nascentibus. *Bux. hall.* 69. *t.* 1.

Juxta Moenia Vrbis, et alibi vivit. Emolliens. etc.

499. CHENOPODIVM (*rubrum*) foliis cordato-triangularibus obtusiusculis, dentatis, racemis erectis, compositis, foliosis, caule brevioribus. *Linn. Hort. Svec.* 210. *Dalib. Par.* 78.

Prope Moenia urbis Portus perennat.

Chenopodium erectum (*vulgo* Piede anserino, *et* Atriplice di foglia grande) foliis subtriangularibus antice sinuato-dentatis, racemis erectis, foliosis lateralibus. *Roy. Lugbd.* 219. *Linn. H. Cliff.* 85.

Atriplex sylvestris, latifolia. *C. B. P.* 119.

Pes anserinus. *Dalech. Hist.* 542. *t.* 542. *I. B. Hist.* 2. *p.* 975. *Fuchs. Hist.* 653.

Ad cultos, et ruderatos vivit. Emolliens. etc.

500. CHENOPODIVM (*murale*, *vulgo* Piede Anserino triangolare) foliis ovatis nitidis acutis dentatis, racemis ramosis nudis. *Linn. Flor. Svec.* 211. *et* 216. *Dalib. Paris.* 211.

Chenopodium erectum, ramosissimum, foliis triangularibus dentatis, racemis ramosis caulem superantibus. *Linn. Hort. Cliff.* 85. *Lech. Scan* 16.

Vivit juxta muros civitatis Portus, et folia sunt candidissima.

501. CHENOPODIVM (*album*, *vulgo* Piede Anserino con le foglie biancheggianti) foliis rhomboideo-triangularibus, erosis, postice integris, summis oblongis, racemis erectis. *Linn. Flor. Svec.* 212. *Dalib. Paris.* 80.

Chenopodium foliis inferioribus ovatis acutis, antrorsum dentatis, summis lanceolatis. *Linn. Hort. Cliff.* 85. *Gronov. Virg.* 145. *Roy. Lugbd.* 219. *Hall. Helv* 175.

Habitat in cultis, et pinguibus, et signanter extra Januam S. Jo. in Laterano. Emolliens. etc.

502. CHENOPODIVM (*viride*, *vulgo* Piede Anserino Ortense) foliis rhomboidis dentato-sinuatis, racemis ramosis subfoliatis. *Linn. Flor. Svec.* 213. *Dalibard. Par.* 78.

Chenopodium Sylvestre Opuli folio. *Vaill. Paris.* 36. *t.* 7. *f.* 1.

Chenopodium folio oblongo integro. *Dill. app.* 62.

Vivit inter olera, et culta.

503. CHENOPODIVM (*hybridum*, *vulgo* Atriplice con foglie di Stramonio) foliis cordatis, angulato-acuminatis, racemis ramosis nu-

dis. *Linn. Flor. Svec.* 241. *Dalib. Paris.* 79.

Chenopodium foliis triangulari-sagittatis, infra medium sinuato-dentatis, racemis longissimis. *Linn. Hort. Cliff.* 84. *Roy. Lugbd.* 219.

Chenopodium Stramonii folio. *Vaill. Par.* 36. *t.* 7. *f.* 2. *Rav. Angl.* 4. *p.* 123.

Atriplex Sylvestris, latifolia, acutiore folio. *C. B. P.* 119.

Emolliens et laxans. Inter Rignani olera luxuriat.

504. CHENOPODIVM (*botrys, vulgo* Chenopodio con li semi a rampazzo, *et etiam* Erba Thee) foliis oblongis, sinuatis, racemis nudis multifidis. *Roy. Lugbd.* 219. *Linn. Hort. Cliff.* 84.

Botrys ambrosioides, vulgaris. *C. B. P.* 138.

Botrys. *Dod. Pempt.* 34.

Juxta Tiberim, et signanter ad Renellam, et ad transitum Naviculae ante Marmoratam luxuriose vivit. Ad vertigines etc.

505. CHENOPODIVM (*ambrosioides, vulgo* Chenopodio odoroso *et etiam* Erba Thee) foliis lanceolatis, dentatis, racemis foliatis simplicibus. *Roy. Lugbd.* 219. *Linn. Hort. Cliff.* 84.

Botrys ambrosioides Mexicana. *C. B. P.* 138.

Botrys odorata, suave olens, Americana, Mexicanave. *Moris. Hist.* 2. *p.* 605. *se.* 5. *t.* 35. *f.* 8.

Vivit copiose in utraque parte alvei Tiberis, et est inter nos vulgatissima sub nomine Thee communis. Ad convulsiones etc.

506. CHENOPODIVM (*glaucum* , *vulgo* Atriplice con la foglia stretta , e tagliata) foliis ovato-oblongis , repandis , racemis nudis , simplicibus , glomeratis . *Linn. Fl. Svec.* 215. 221. *Dalib. Paris.* 77.

Chenopodium foliis ovato- oblongis , repande sinuatis , florum racemis glomeratis , ex ala solitariis. *Roy. Lugbd.* 219. *Linn. Hort.Cliff.* 85.

Chenopodium angustifolium , laciniatum, minus . *Tour. I. R. H.* 506.

Atriplex angustifolia laciniata . *I. B. Hist.* 2. *p.* 472. *t.* 473.

Habitat in fimetis ubique extra Vrbem .

FOLIIS INTEGRIS

507. CHENOPODIVM (*vulvaria*, *vulgo* Chenopodio fetente *et* Vulvaria) foliis integerrimis rhombeo-ovatis , floribus conglomeratis , axillaribus . *Linn. Fl. Svec.* 216. 222. *Dalib. Par.* 77.

Chenopodium foliis triangulari-ovatis . *Linn. Hort. Cliff.* 84. *Roy Lugbd.* 218.

Atriplex foetida . *C. B. P.* 119.

Vulvaria. *Dalech. Hist.* 543.

Secus vias, et signanter in agro Boario. Anthysterica . etc.

508. CHENOPODIVM (*polyspermum*, *vulgo* Blito con le foglie ovate , strette per terra) foliis integerrimis ovatis, caule decumbente,

cymis dichotomis, aphyllis, axillaribus. *Linn. Spec. Plant.* 15. *p.* 321.

Chenopodium foliis ovatis integerrimis, caule decumbente. *Roy. Lugbd.* 218. *Linn. Flor. Svec.* 217. *Dalib. Par.* 77.

Blitum foliis ovatis. *Linn. Hort. Cliff.* 128.

Blitum polyspermum. *C. B. P.* 118.

Polysporon Cassiani, Bassi, Anguillarae. *Lob. Hist.* 128.

Inter olera hortorum habitat.

509. CHENOPODIVM (*maritimum vulgo* Kali biancheggiante, con li semi lustri) foliis subulatis, semicylindricis, convexis. *Linn. Hort. Cliff.* 86. *Fl. Svec.* 218. 224. *Roy. Lugbd.* 220.

Kali minus, album, semine splendente. *C. B. P.* 289. *Moris. Hist.* 2. *p.* 610. *se.* 5. *t.* 13. *f.* 3.

Vivit ad centum Cellas. Emolliens, et humectans.

510. CHENOPODIVM (*fruticosum*, *vulgo* Semprevivo arborescente con foglie sottili, e grosse) foliis linearibus teretibus carnosis, caule fruticoso. *Roy. Lugbd.* 220.

Chenopodium sedifolio minimo, frutescens, perenne. *Boeh. Lugbd.* 2. *p.* 91.

Sedum minus, arborescens. *Muntin. Hist. t.* 469.

Propc centum Cellas. Refrigerans;

511. CHENOPODIVM (*altissimum* , *vulgo* Kali con foglie di Gramiccia) foliis filiformibus, acutiusculis, caule erecto.

Chenopodium altissimum, foliis succulentis. *Bux. Cent.* 1. *p.* 21. *t.* 31 *f.* 2.

Kali gramineo folio. *C. B. P.* 289. *Prodr.* 133. *Brus. XVI.* 20.

Chenopodium foliis filiformibus, inermibus, mucronatis, caule ramosissimo. *Linn. Hort. Vpsal.* 56.

Ad centum Cellas non procul a D. Augustino.

512. CHENOPODIVM (*sedifoliis*, *vulgo* Chenopodio con foglie di semprevivo e rami ripiegati) foliis linearibus obtusis, subtus convexis, caule ramoso, ramis deflexis.

Chenopodium maritimum, foliis sedi teretibus. *Bux. Cent.* 1. *p.* 21. *t.* 31. *f.* 1.

Ad Portum juxta mare.

513. CHENOPODIVM (*villosum* , *vulgo* Kali piccolo, e irsuto) foliis teretibus, obtusis, tomentosis, alternis, caule herbaceo. *Sauv. Monsp.* 7.

Kali minus villosum. *C. B. P.* 289. *Prodr.* 133.

Kali parvum, hirsutum. *I. B. Hist.* 702.

Ad Trajani Portum vivit. Violenter detergit etc.

514. CHENOPODIVM (*scoparia* , *vulgo* Belvedere) foliis lineari-lanceolatis, planis, in-

tegerrimis. *Linn. Hort. Cliff.* 86. *Roy. Lugbd.* 220.

Linaria Scoparia. *C. B. P.* 212.

Osyris. *Dod. Pempt.*

In hortis cicurata vivit, et etiam sponte habitat aliquibus in locis.

BETA

515. BETA (*vulgo* Bietola, *et* Bieta etc.) *Roy. Lugbd.* 220.

Beta Sylvestris maritima. *C. B. P.* 118. (*a*)

Beta rubra vulgaris. *C. B. P.* 118. (*b*)

Beta rubra major. *C. B. P.* 118.

Beta lutea major. *C. B. P.* 118.

Beta pallide virens major. *C. B. P.* 118.

Beta alba, vel pallescens, quae cicla Offic. *C. B. P.* 118. (*c*)

Beta communis viridis. *C. B. P.* 118.

Habitant omnes juxta sepes, et ad litus Maris, et cicuratae vegetiosores evadunt: Emolliens laxans et nutriens.

SALSOLA

516. SALSOLA (*Kali vulgo* Kali spinoso, *et comburitur indiscriminatim cum aliis subsequentibus speciebus ad eliciendam cinerem, quae in usu venit ad vitrum conficiendum et etiam ingreditur in compositionem saponis etc. vocantur etiam* Riscoli *ab hortulanis*) herbacea, foliis subulatis,

mucronatis,calycibus ovatis axillaribus. *Roy. Lugbd.* 220. *Gron. Virg.* 28.

Salsola foliis pungentibus. *Hort. Cliff.* 86.

Kali spinosum cochleatum. *C. B. P.* 289.

Kali spinoso affinis. *C.B.P.* 289. *Moris. Hist.* 2. *se.* 5. *t.* 33. *f.* 11.

Salsola caule, et foliis rubris.

Salsola caule, et foliis subluteis.

Ad Ostia Tiberina vivit.

517. SALSOLA (*rosea*) herbacea, foliis mucronatis, subulatis, calycibus explanatis.

Salsola foliis conico-tubulatis, mucronatis, calycibus corolliformibus obtusis, coloratis, crenatis. *Linn. Hort. Vpsal.* 56.

Kali humile, alis purpureis florem rosaceum mentientibus. *Bux. Cent.* 1. *p.* 9. *t.* 14. *f.* 2.

Ad Ostia Tiberina habitat.

418. SALSOLA (*vermiculata vulgo* Kali fruticoso con foglie di Tamarisco) frutescens, foliis ovatis, acutis, carnosis.

Kali fruticosum, Ericae folio. *Bux. Cent.* 1. *p.* 8. *t.* 14. *f.* 1.

Kali fruticosum Hispanicum, Tamarisci folio. *Tour. I. R. H.* 247.

Crescit prope Draconem.

519. SALSOLA (*soda vulgo* Erba soda, *et* Kali con li semi fatti a Lumachelle) her-

bacea patula foliis inermibus. *Sauv. Monsp.* 7.
Kali majus cochleato semine. *C. B. P.* 287.
Kali. *Dod. Pempt.* 81.

Ad agrum Salinum habitat. Salalkali elicitur etc.

ANABASIS

520. ANABASIS (*foliosa*) foliis subclavatis, et aculeatis.
Kali bacciferum, foliis clavatis. *Bux. Cent.* 1. *p.* 19. *t.* 19. *f.* 1.
Anabasis foliis subclavatis, undique aculeatis, rubris.

Ad litus S. Marinellae vivit.

VLMVS

521. VLMVS (*campestris vulgo* Olmo) foliis duplicatoserratis, basi inaequalibus. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 327.
Vlmus fructu membranaceo. *Linn. Flor. Svec.* 219. *Roy. Lugbd. Dalib. Paris.* 82. *Linn. Hort. Cliff.* 83.
Vlmus campestris, et Theophrasti. *C. B. P.* 246.
Vlmus. *Dod. Pempt.* 837.

Fere ubique vivit, et habitat.

522. VLMVS (*americana*, *vulgo* Olmo) foliis aequaliter serratis, basi inaequalibus. *Linn. Spec. Pl.* 2. *p.* 327.
Vlmus fructu membranaceo, foliis simplicissime serratis. *Gron. Virg.* 145.

Juxta viam Mantianae vivit. Adstringens etc.

GENTIANA

COROLLIS QVINQVEFIDIS SVBCAMPANIFORMIBVS.

523. GENTIANA (*lutea, vulgo* Genziana maggiore con fiori gialli) corollis quinquefidis, rotatis, verticillatis, calycibus spathaceis. *Hall. Helv.* 479.

Gentiana floribus lateralibus confertis pedunculatis, corollis rotatis. *Linn. Hort. Cliff.* 80. *Roy. Lugbd.* 432. *Sauv. Monsp.* 136.

Gentiana major lutea. *C. B. P.* 187.

Gentiana. *Cam. Epit.* 415.

Asterias. *Reneal. Spec.* 64. *t.* 63.

In monte Januario, et Nursiae. Aperiens, attenuans, et alexipharmaca.

524. GENTIANA (*centaurium, vulgo* Centaurea minore) corollis quinquefidis, infundibuliformibus, caule dichotomo. *Linn. Spec. Pl.* 17. *p.* 332.

Gentiana foliis linearilanceolatis, caule dichotomo, corollis infundibuliformibus quinquefidis. *Linn. Flor. Svec.* 205. 232.

Gentiana stylis simplicibus. *Roy. Lugbd.* 7. *Dalib. Paris.* 81.

Centaurium minus. *C. B. P.* 278.

Erithraea. *Renealm. Spec.* 77. *t.* 76.

Centaurium (*vulgo* Centaurea minore palustre, e ramosa con fiore rosso) minus, pumilum,

ramosissimum. *It. oel.* 157. *Rosen. Scan.* 10. *(a)*

Centaurium minus palustre ramosissimum, flore purpureo. *Vaill. Paris.* 32. *t.* 6. *f.* 1. *(b)*

Centaurium (*vulgo* Centaurea minima con fiore mezzo aperto) palustre, minimum, flore inaperto. *Vaill. Paris.* 32. *t.* 6. *f.* 1. *(c)*

Gentiana pumilla, flore luteo. *(d)*

Habitat fere ubique, et (d) vix spithamam altum vivit ad montes arenarum decimo ab urbe lapide. Antipyreticum, et deobstruens etc.

525. GENTIANA (*spicata*, *vulgo* Centaurea minore spigata) corollis quinquefidis infundibuliformibus, floribus alternis sessilibus. *Linn. Spec. P.* 18. *p.* 333.

Gentiana corollis infundi-buliformibus, quinque fidis laxespicatis, foliis lanceolatis. *Sauv. Monsp.* 132.

Centaurium minus, spicatum, album. *C. B. P.* 278. *Prodr.* 130. *t.* 130. *I. B. Hist.* 3. *p.* 353.

Centaurium minus, album. *Taber. Jcon.* 780.

Gentiana corollis quinquefidis infundibuliformibus, floribus alternis sessilibus rubris.

Habitat ad Colles Marii, et Farnesiorum.

526. GENTIANA (*filiformis*, *vulgo* piccola Genziana palustre con il fiore giallo) corollis quadrifidis, imberbibus, caule dichoto-

mo filiformi. *Linn. Spec. Pl.* 27. *p.* 335.
Gentiana corollis infundibuli-formibus, quadrifidis, pedunculis ternis, foliis linearibus. *Sauv. Monsp.* 132.
Gentiana caule dichotomo, foliis lineari-lanceolatis, floribus infundibuliformibus, quadrifidis, longissime pedunculatis. *Dalib. Par.* 82. *Guet. Stamp.* 1. *p.* 305.
Centaurium palustre, luteum, minimum. *Rai. Hist.* 1092. *Vail. Paris.* 32. *t.* 6. *f.* 3.

Prope Maccarese vivit.

527. GENTIANA (*perfoliata vulgo* Centaurea Minore perfogliata con fiore giallo) corollis octofidis, foliis perfoliatis. *Loesl. Hisp.* 33.
Gentiana caule dichotomo, foliis connatis, corollis octofidis. *Linn. Hort. Cliff.* 81. *et* 496. *Roy. Lugbd.* 433. *Dalib. Paris.* 82. *Sauv. Monsp.* 136.
Centaurium luteum, perfoliatum. *C. B. P.* 278. *Moris. Hist.* 2. *p.* 565. *Se.* 5. *t.* 26. *f.* 1. 2.
Centaurium parvum, flore luteo. *Clus. Hist.* 2. *p.* 180.
Chlora. *Rheneal. Spec.* 80. *t.* 76.

Fere ubique habitat.

ERYNGIVM

528. ERYNGIVM (*planum vulgo* Eringio piano con foglia grande) foliis radicalibus ova-

libus, planis, crenatis, capitulis pedunculatis. *Roy. Lugbd.* 92. *Dalib. Par.* 83.

Eryngium latifolium planum. *C. B. P.* 87.

Eryngium pannonicum latifolium. *Clus. Hist.* 2. *p.* 158.

Prope Primam Portam octavo ab Vrbe lapide vivit.

529. ERYNGIVM (*pusillum*, *vulgo* Eringio liscio minore) foliis radicalibus oblongis, incisis, caule dichotomo, capitulis sessilibus. *Linn. Hort. Cliff.* 87. *Roy. Lugbd.* 93.

Eryngium planum minus. *C. B. P.* 386.

Eryngium pusillum planum. *Clu.. Hist.* 2. *p.* 158.

Habitat prope Cappuccinos Civitatis Castellanae, et alibi.

530. ERYNGIVM (*proliferum*) foliis radicalibus oblongis serratis, et incisis, caule dichotomo et subdichotomo prostratis, umbellis proliferis.

Ad litus Maris, non procul a Maccarese.

531. ERYNGIVM (*maritimum vulgo* Eringio marittimo) foliis radicalibus subrotundis, plicatis, spinosis, capitulis pedunculatis. *Linn. Hort. Cliff.* 87. *Flor. Svec.* 220. *et* 233. *Roy. Lugbd.* 93.

Eryngium marinum. *Clus. Hist.* 2. *p.* 169. *Cam. Epit.* 448.

Eryngium maritimum. *C. B. P.* 386.

Ad litus Ostiae, et alibi. Radix ex quinque aperientibus etc.

532. ERYNGIVM (*alpinum vulgo* Eringio alpino turchino) foliis radicalibus cordatis oblongis, caulinis pinnatifidis, capitulis subcylindricis. *Linn. Spec. Pl.* 6. *p.* 337.

Eryngium alpinum caeruleum, capitulis Dipsaci. *C. B. P.* 386.

Eryngium caeruleum genevense. *Lob. Icon.* 2. *p.* 23.

Prope Tibur et alibi.

533. ERYNGIVM (*campestre vulgo* Eringio campestre volgare) foliis amplexicaulibus, pinnatolaciniatis. *Linn. Hort. Cliff.* 87. *Roy. Lugbd.* 93.

Eryngium vulgare. *C. B. P.* 386.

Eryngium campestre vulgare. *Clus. Hist.* 2. *p.* 157.

Vbique habitat in incultis: Aperiens et antiscorbuticum etc.

534. ERYNGIVM (*amethystinum vulgo* Eringio colore turchino) foliis trifidis basi subpinnatis. *Linn. Spec. Plant.* 9. *p.* 337.

Eryngium montanum amethystinum. *C. B. P.* 386. *Moris. Hist.* 3. *p.* 165. *Se.* 7. *t.* 25. *f.* 2.

Eryngium totum caeruleum. *Besl. Eyst. o.* 11. *t.* 8. *f.* 4.

Eryngium minus, trifidum, hispanicum. *Barr. Ic.* 36. *Bocc. Mus. t.* 71.

In Sabinorum montibus, et alibi habitat. Radix amica est renibus etc.

HYDROCOTYLE

535. HYDROCOTYLE (*vulgaris vulgo* Umbilico acquatico) foliis peltatis, umbellis quinquefloris. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 338.

Hydrocotyle foliis peltatis orbiculatis, undique emarginatis. *Linn. Hort. Cliff.* 88. *Roy. Lugbd.* 93. *Dalib. Paris.* 83. *Hall. Helv.* 425.

Ranunculus aquaticus, cotyledonis folio. *C. B. P.* 180.

Cotyledon aquatica. *Lob. Icon.* 387.

In via prope Sermonetam, et Pontinis.

Aperiens et detergens.

536. HYDROCOTYLE (*prolifera*) foliis peltatis, umbellis multifloribus, umbellatis, et proliferis.

Prope Abatiam Fossae novae juxta ripam Fluvii Amaseni.

Vmbella primaria est pedunculata, pedunculis viginti, et ultra; Singulus pedunculus duodecim, et quindecim habet pedunculos, quorum singulus floribus niveis lineola nigrigante signatis est instructus.

SANICVLA

537. SANICVLA (*europaea vulgo* Sanicula delle Spezierie) foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus. *Linn. Flor. Svec.* 222. 235.

Sanicula flosculis omnibus sessilibus. *Gron. Virg.* 147.
Sanicula. *Roy. Lugbd.* 93. *Linn. Hort. Cliff.* 88.
Sanicula officinarum. *C. B. P.* 319.
Diapensia. *Cam. Epit.* 763.

Vivit ad Madamae nemus, aliisque in sylvis montanis.

Vires sunt balsamicae, penetrantes etc.

ASTRANTIA

538. ASTRANTIA (*major vulgo* Elleboro con foglia di Sanicola) foliis quinquelobis, lobis trifidis. *Hall. Helv.* 439.
Astrantia. *Linn. Hort. Cliff.* 88.
Helleborus niger, Saniculae folio *C. B. P.* 186.
Veratrum nigrum. *Dod. Pempt.* 387.

In Sabinorum montibus et Viterbii habitat. Antiscorbutica etc.

BVPLEVRVM

HERBACEA

539. BVPLEVRVM (*rotundifolium vulgo* Perfogliata volgare) involucris universalibus nullis, foliis perfoliatis. *Linn. Hort. Vpsal.* 64.
Bupleurum foliis ovatis, perfoliatis. *Linn. Hort. Cliff.* 104. *Roy. Lugbd.* 109. *Hall. Helv.* 137.
Perfoliata vulgatissima arvensis. *C. B. P.* 277.
Perfoliata. *Dod. Pempt.* 104.
Perfoliata (*vulgo* Perfogliata minore) minor ramis inflexis. *C. B. P.* 277. *Prodr.* 130. *(a)*

Perfoliata flore multiplici. *C. B. P.* 277.
Perfoliata crispa, seu muscosa. *Cam. Hort. t.* 37.

Indiscriminatim inter segetes vagantur. Adstringens etc.

540. BVPLEVRVM (*rigidum, vulgo* Perfogliata ispida) caule dichotomo, subnudo, involucris minimis, acutis. *Linn. Spec. Plant.* 10. *p.* 242.
Bupleurum foliis lanceolatis, rigidis, radicalibus obtusis, caulinis acutis. *Roy. Lugbd.* 110. *Sauv. Monsp.* 76.
Bupleurum folio rigido. *C. B. P.* 378.
Bupleurum alterum latifolium. *Dod. Pempt.* 633.

Extra Januam Portuensem habitat in loco vulgo la Cava.

FRVTESCENTIA

541. BVPLEVRVM (*fruticosum*) frutescens, foliis ovatis integerrimis. *Linn. Spec. Plant.* 14. *p.* 343.
Bupleurum foliis obverse ovatis in petiolum attenuatis. *Linn. Hort. Cliff.* 104. *Roy. Lugbd.* 109. *Sauv. Monsp.* 60. *Gron. Orient.* 77.
Seseli Æthiopicum, Salicis folio. *C. B. P.* 161.
Seseli Æthiopicum, frutex. *Dod. Pempt.* 312.

Est litorea Planta ad Ostiam.

ECHINOPHORA

542. ECHINOPHORA (*spinosa, vulgo* Crittimo, et Finocchio marino) foliolis subulato-

spinosis, integerrimis. *Linn. Spec. Plant.* 1.334.

Echinophora foliis decompositis. *Wach. ultr.* 200.

Caucalis caule lignoso, foliolis subulatospinosis integerrimis: *Roy. Lugbd.*96. *Sauv.Monsp.* 258.

Crithmum maritimum spinosum. *C.B.P.*288.

Critmum spinosum. *Dod. Pempt.*705.

Ad litus maris Centum Cellarum.

543. ECHINOPHORA (*tenuifolia, vulgo* Caucalide con frutto echinato, o spinoso) foliolis incisis, inermibus. *Linn. Spec. Plant.*2. *p.* 344.

Echinophora foliis supradecompositis. *Wach. ult.* 200.

Caucalis caule lignoso, foliis incisis. *Roy. Lugbd.* 96.

Pastinaca sylvestris, angustifolia, fructu echinato. *C. B. P.* 151.

Pastinaca Echinophora Apula. *Col. Ecph.* 1.*p.* 98.*t.*101.

Ad litora maris Mediterranei multis in locis.

Diuresim movet etc.

TORDYLIVM

544. TORDYLIVM (*officinale vulgo* Erba oliosa *et* Seseli cretico) involucris partialibus

longitudine florum, foliolis ovatis, laciniatis. *Linn. Hort. Cliff.* 90. *Roy. Lugbd.* 94. *Sauv. Monsp.* 230.

Seseli creticum minus. *C. B. P.* 161.

Seseli creticum. *Dod. Pempt.* 314.

Juxta vias multis in locis. Ad portum Antii etc.

545. TORDYLIVM (*apulum vulgo* Seseli Cretico piccolo) umbellulis remotis, foliis pinnatis subrotundis laciniatis. *Linn. Hort. Cliff.* 90. *Roy. Lugbd.* 94.

Tordylium Apulum, minimum. *Col. Ecph.* 1. *p.* 122. *t.* 124.

Seseli creticum, minimum. *C. B. P.* 171.

Ad oras Ostienses habitat.

546. TORDYLIVM (*maximum*, *vulgo* Seseli Cretico maggiore) umbellis confertis, radiatis, foliolis lanceolatis incisoserratis. *Linn. Hort. Cliff.* 50. *Roy. Lugbd.* 94.

Tordylium. *Riv. pent.* 1.

Caucalis maxima Sphondylii aculeato semine. *C. B. P.* 152.

Seseli Creticum majus. *C. B. P.* 161.

Ad Vineas incultas, et ad dumeta vivit.

Menses, et urinam movet etc.

547. TORDYLIVM (*latifolium*, *vulgo* Caucalide con foglia grande) umbellis confertis,

nudiusculis, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis, incisoserratis. *Mill Dict. t.* 8.

Caucalis umbella universali trifida, partialibus pentaspermis, foliis pinnatis serratis. *Linn. Hort. Cliff.* 91. *Roy. Lugbd.* 95. *Dalib. Paris.* 84. *Sauv. Mons.* 236. *Gron. Orient.* 80.

Caucalis arvensis echinata, latifolia. *C.B.P.* 152.

Lappula Canaria latifolia. *I. B.* 3. *p.* 81.

Juxta semitas, et campos,

548. TORDYLIVM (*nodosum*, *vulgo* Caucalide nodosa) umbellis simplicibus, sessilibus, seminibus exterioribus hispidis. *Linn. Spec. Plant.* 7. *p.* 346.

Caucalis umbellis sessilibus simplicibus. *Linn. Hort. Cliff.* 91. *Roy. Lugbd.* 95. *Dalib. Paris.* 85.

Caucalis nodosa, echinato semine. *C.B.P.* 153. *Prodr.* 80. *I. B.* 3. *p.* 82.

Multis in locis habitat, et signanter etiam in Campo Bovario.

CAVCALIS

549. CAVCALIS (*grandiflora*, *vulgo* caucalide con fiore grande) involucris pentaphyllis, foliolo unico duplo majore. *Linn. Hort. Cliff.* 91. *Roy. Lugbd.* 95. *Sauv. Monsp.* 258.

Caucalis involucro universali pinnatifido, partialibus indivisis, umbella multifida. *Linn. Flor. Svec.* 225. *Dalib. Paris.* 84.

Caucalis arvensis, echinata, magno flore. *C. B. P.* 152.

Echinophora flore magno. *Riv. Pent.* 25.

Echinophora pycnocarpos. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 91. *t.* 94.

Inter segetes non procul a mediterraneo, et signanter ad Centum cellas. Aperiens etc.

550. CAVCALIS umbellis trifidis, umbellulis trispermis, involucris triphyllis. *Linn. Hort. Cliff.* 61. *Roy. Lugbd.* 95. *Sauv. Monsp.* 258.

Caucalis Monspeliaca, echinata, magno fructu. *C. B. P.* 153.

Echinophora altera asperior, platycarpos. *Col. Ecphr.* 1. 95. *t.* 94.

Secus litus Ostiense. Antinephritica etc.

551. CAVCALIS (*leptophilla, vulgo* Caucalide con fiore piccolo) seminum aculeis triglochidibus uncinatis, pilis verticillatis hispidis. *Guett. Stamp.* 80. *Dalib. Paris.* 85.

Caucalis involucro universali monophyllo, laciniis foliorum perangustis. *Hall. Helv.* 448.

Caucalis arvensis echinata, parvo flore, et fructu. *C. B. P.* 152.

Echinophora tertia leptophylla purpurea. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 96. *t.* 97.

Ad litus Tyrrheni.

DAVCVS

552. DAVCVS (*carota vulgo* Carota con radica gialla, e radica rossa) seminibus hispidis, petiolis subtus nervosis. *Linn. Hort. Cliff.* 89. *Roy. Lugbd.* 97. *Gron. Virg.* 31. *Dalib. Par.* 185.

Daucus vulgaris. *Clus. Hist.* 2. *p.* 198.

Pastinaca tenuifolia sylvestris Dioscoridis. *C. B. P.* 151.

Pastinaca tenuifolia sativa radice lutea. *C. B. P.* 151. *(a)*

Daucus sativus, radice atrorubente. *Tour. I. R. H.* 307. *(b)*

In campis, et vineis, et prope forum Sinonii. (a) (b) vero sata in hortis.

553. DAVCVS (*visnaga vulgo* Gingidio, *et* Visnaga) seminibus nudis. *Roy. Lugbd.* 97. *Sauv. Monsp.* 257.

Gingidium umbella oblonga. *C. B. P.* 151.

Gingidium alterum. *Dod. Pempt.* 792.

Habitat prope Ferentinum in Campania, et alibi.

554. DAVCVS (*gingidium*) radiis involucri planis, laciniis recurvis. *Roy. Lugbd.* 97.

Gingidum folio chaerophylli. *C. B. P.* 151.

Gingidium. *Matth. Com.* 372. *t.* 373.

Daucus montanus lucidus. *Tour. I. R. H.* 307.

Pastinaca tenuifolia marina, foliis obscure vi-

rentibus, et quasi lucidis. *Magn. Monsp.* 199.
Pastinaca folio Oenanthes. *Boc. Sic.* 74.

Prope Centum Cellas ad scopulos vivit.

In colica, et stranguria etc.

555. DAVCVS (*muricatus*) seminibus aculeatis. *Linn. Spec. Plant.* 349.
Artedia muricata seminibus aculeatis. *Hort. Cliff.* 89.
Caucalis major daucoides Tingitana. *Moris. Hist.* 3. *p.* 308. *s.* 9. *t.* 4. *Rai. Hist.* 469.
Echinophora Tingitana. *Riv. Pent.* 27.
Caucalis (*maritimus*) pumila maritima. *Io. B. Hist.* 3. *p.* 91. (*a*)

In litoribus Mediterranei.

AMMI

556. AMMI (*majus vulgo* Ameos volgare) foliis inferioribus pinnatis, lanceolatis, serratis, superioribus multifidis linearibus. *Linn. Hort. Vpsal.* 59.
Ammi laciniis foliorum caulis lanceolatis. *Linn. Hort. Cliff.* 89. *Roy Lugbd.* 96. *Sauv. Monsp.* 232.
Ammi majus. *C. B. P.* 159.
Ammi vulgare. *Dod. Pempt.* 415.

Habitat prope Draconem, Ostia Tiberina versus.

557. AMMI (*trifidus*) foliis inferioribus trifi-

dis, leviter crenatis, superioribus cuneiformibus.

In dumetis et praecipue montis Sorat habitat.

Carminativa et anthysterica etc.

558. AMMI foliorum omnium lacinulis lanceolatis. *Guett. Stamp.* 2. *p.* 433.

Ammi petraeum, glaucifolium, perenne. *Moris. Hist.* 3. *p.* 295.

Daucus petraeus glaucifolius. *I. B. Hist.* 3. *p.* 58.

Ad Pisternum, et Supinum.

BVNIVM

559. BVNIVM (*bulbocastanum vulgo* Bulbo castano) *Linn. Hort. Cliff.* 91. *Roy. Lugbd.* 107.

Bunium bulbo globoso. *Sauv. Monsp.* 256.

Bulbocastanum, majus, folio apii. *C.B.P.* 162.

Nucula terrestris. *Lob. Hist.* 429.

Habitat in Sabinis juxta Arcem dirutam Collis veteris.

In Phthysi et pectoris asperitate.

CONIVM

560. CONIVM(*maculatum vulgo* Cicuta maggiore, *et* volgare) seminibus striatis. *Roy. Lugbd.* 107. *Linn. Hort. Cliff.* 92.

Cicuta major. *C. B. P.* 160.

Cicutaria major, vulgaris. *Clus. Hist.* 2. *p.* 200.

Juxta fossorum margines, et pagorum ruinas, et alibi.

561. CONIVM (*africanum*) seminibus acu-

leatis. *Linn. Hort. Cliff.* 92. *Roy. Lugbd.* 107.

Vivit prope Turrim, vulgo Paterna in dumetis. Vid. Op. Stork.

SELINVM

562. SELINVM (*palustre vulgo* Selino) sublactescens, radice unica. *Hall. Helv.* 443.

Sélinum foliolis, et lacinulis oblongolinearibus. *Guett. Stamp.* 2. *p.* 70.

Selinum palustre lactescens. *Linn. Hort. Cliff.* 92. *Roy. Lugbd.* 116.

Seseli palustre lactescens. *C. B. P.* 162. *Prodr.* 85.

Ad Pontinas Paludes signanter habitat.

Vehementissime purgat per superiora et inferiora.

ATHAMANTA

563. ATHAMANTA (*oreoselinum*) foliolis divaricatis. *Linn. Flor. Svec.* 2. *n.* 241.

Selinum foliolis ovato-acutis, acute serratis, et incisis. *Roy. Lugbd.* 106. *Linn. Hort. Cliff.* 92.

Selinum foliolis, lacinulisque oblongolinearibus. *Guett. Stamp.* 1. *p.* 70.

Selinum pinnis ad angulos obtusos pinnatis, pinnulis incisis non serratis. *Hall. Helv.* 444.

Apium montanum, folio ampliore (*vulgo* Apio Montano con foglia grande.) *C. B. P.* 153.

Apium montanum nigrum. *C. B. P.* 153. *Segu. Ver.* 2. *p.* 31.

Oreoselinum. *Clus. Hist.* 2. *p.* 195. *Riv. pent.* 8.

Prope Palumbariam, in cujus ditione extrahitur Manna perfectissima ab Ornis, et Fraxinis.

564. ATHAMANTA (*sicula vulgo* Dauco secondo di Sicilia) foliis inferioribus nitidis, umbellis primordialibus subsessilibus, seminibus pilosis. *Linn. Hort. Vpsal.* 60.

Athamanta foliolis multifidis planis, seminibus villosis. *Linn. Hort. Cliff.* 93. *Roy. Lugbd.* 97.

Daucus secundus siculus, sophiae folio. *Zan. Hist.* 80.

In Campania habitat juxta pagum S. Laurentii. Carminativa etc.

565. ATHAMANTA (*annua vulgo* Mirride con seme villoso) foliis multipartitis, laciniis linearibus teretiusculis acuminatis. *Roy. Lugbd.* 98.

Myrrhis annua, semine striato villoso, incana. *Moris. Vmb.* 67.

Myrrhis tenuifolia annua cretica, semine lanugine alba pubescente. *Moris. Hist.* 3. *p.* 302.

Juxta montes Gemmarum vivit. Aperiens et demulcens etc.

PEVCEDANVM

566. PEVCEDANVM (*officinale vulgo* Peucedano) foliis quinquies tripartitis filiformibus, linearibus. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 353.

Peucedanum foliis quinquies tripartitis, linearisubulatis, integerrimis. *Linn. Hort. Cliff.* 93. *Roy. Lugbd.* 98. *Sauv. Monsp.*182. 257.

Peucedanum. *I. B. Hist.* 3. *p.*36. *Rai. Hist.* 416.

Peucedanum Germanicum. *C. B. P.* 149.

Peucedanum majus Italicum. *C. B. P.* 149.

Supra montes Tiburtinos. Discutit, et resolvit etc.

567. PEVCEDANVM (*alpestre*) foliolis linearibus ramosis. *Linn. Hort. Cliff.* 94. *Roy. Lugbd.* 98.

Ferula foliis libanotidis brevioribus, alpestris, umbellis amplissimis. *Boerh. Lugbd.* 1. *p.*65.

In monte Circello vivit.

568. PEVCEDANVM (*silaus vulgo* Seseli pratense) foliolis pinnatofidis, laciniis oppositis, involucro universali diphyllo. *Linn. Hort. Cliff.* 94. *Roy. Lugbd.*98. *Sauv. Monsp.* 257. *Leis. Hall.* 232.

Seseli pratense. *C.B.P.* 162.*Rai Angl.*3. *p.*216.

Siler alterum pratense. *Dod. Pempt.* 310.

Juxta montes Tolphae, et Nursiae.

C R I T H M V M

569. CRITHMVM (*maritimum vulgo* Critmo, *et* Finocchio marino) foliolis lanceolatis carnosis. *Linn. Hort. Cliff. Hort. Vpsal.* 61. *Roy. Lugbd.* 98. *Sauv. Monsp.* 258.

Grithmum, seu Foeniculum maritimum minus. *C. B. P.* 288.

Foeniculum marinum, seu Empetrum, sive Calcifraga. *Lob. Icon.* 392.

Ad Ostiam, et fere ubique juxta Mediterranei litora. Impacta solvit etc.

570. CRITHMVM (*pyrenaicum*, *vulgo* Apio montano a similitudine di Tapsia) foliolis lateralibus bis trifidis. *Linn. Hort. Cliff.* 98. *Roy. Lugbd.* 58.

Apium pyrenaicum Thapsiae facie. *Tour. I.R. H.* 305.

In cacumine montium Sabiniae et non procul a Sublaco.

571. CRITHMVM (*Bisserratum*) foliolis lateralibus subrotundo-bis serratis, imis inaequalibus.

In via qua itur Portum versus.

CACHRYS

572. CACHRYS (*libanotis vulgo* Libanote con foglia di Ferula) foliis bipinnatis, foliolis acutis, multifidis, seminibus sulcatis, laevibus. *Linn. Hort. Cliff.* 94. *Roy. Lugbd.* 99. *Sauv. Monsp.* 105.

Cachrys semine fungoso, sulcato, plano, minore, foliis Peucedani angustis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 267. *Se.* 9. *t.* 1. *f.* 3. 6.

Libanotis Ferulae folio, semine anguloso. *C. B. P.* 158.

Ad Sublaci montem.

FERVLA

573. FERVLA (*communis vulgo* Ferola volgare) foliolis linearibus longissimis, simplicibus. *Linn. Hort. Cliff.* 95. *Roy. Lugbd.* 99. *Sauv. Monsp.* 257.

Ferula femina Plinii. *C. B. P.* 148.

Ferula. *Dod. Pempt.* 321.

Ad Theatrum Flavium habitat, et alibi.

Obstructiones solvit, et discutit, et est anthysterica.

574. FERVLA (*glauca*) foliis supradecompositis, foliolis lanceolato-linearibus planis. *Linn. Hort. Cliff.* 95. *Roy. Lugbd.* 99.

Ferula folio glauco, semine lato oblongo. *I. B. Hist.* 3. *p.* 45.

Prope Portum Trajani.

575. FERVLA (*nodiflora vulgo* Panace Asclepio) foliis appendiculatis, umbellis sessilibus. *Linn. Spec. Plant.* 7. *p.* 356.

Ferula foliorum alis utrinque acutis, foliolis linearibus integerrimis, umbellis terminatricibus subsessilibus. *Roy. Lugbd.* 100. *Linn. Hort. Vpsal.* 61.

Libanotis Ferulae folio, et semine. *C. B. P.* 158.

Panax Ascelepium, Ferulae facie. *Lob. Icon.* 783.

Prope Arcem veterem in Volscis, non longe a Pontinis.

LASERPITIVM

576. LASERPITIVM (*latifolium*, *vulgo* Libanotide con foglia larga) foliis cordatis, incisoserratis. *Linn. Hort. Cliff* 96. *Roy. Lugbd.* 101. *Hall. Helv.* 440.

Libanotis latifolia altera, seu vulgatior. *C. B. P.* 157.

Libanotis latifolia major. *C. B. P.* 159.

Seseli Aethiopicum herba. *Dod. Pempt.* 312.

In montibus Viterbiensibus vivit.

577. LASERPITIVM (*trilobum*, *vulgo* Libanototide con foglia di Aquilegia) foliolis trilobis incisis. *Linn. Spec. Plant.* 2. p. 357.

Libanotis latifolia Aquilegiae folio. *C.B.P.* 157.

Ad externa ulcera sananda.

Angelica foliolis tripartitis, lobis superne incisis, obtusis. *Roy. Lugbd.* 104.

Ad radices montis Praenestini, et ad Januarium montem.

578. LASERPITIVM (*gallicum*, *vulgo* Laserpizio di Marsilia) foliolis cuneiformibus furcatis. *Linn. Spec. Plant.* 3. *p.* 357.

Laserpitium foliolis ramulosis sessilibus. *Roy. Lugbd.* 101.

Laserpitium foliolis quinquelobis. *Linn. Hort. Cliff.* 96.

Laserpitium Gallicum. *C.B.P.* 156. *Rai. Hist.* 426.

Laserpitium foliis angustioribus, dilute virentibus, conjugatim dispositis. *Rai. Hist.* 426.

Laserpitium a regione Massiliae allatum. *I.B. Hist.* 3. *p.* 137.

Prope Civitatem Centum Cellarum habitat.

579. LASERPITIVM (*angustifolium*, *vulgo* Laserpizio con foglie a due a due) foliolis lanceolatis integerrimis sessilibus. *Roy. Lugbd.* 102. *Linn. Hort. Cliff.* 96.

Laserpitium angustifolium majus, segmentis longioribus, et indivisis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 321. *se.* 9. *t.* 19 *f.* 9.

Laserpitium foliis longioribus dilute virentibus, conjugatim positis. *Pluk. Alm.* 207. *t.* 198. *f.* 4.

In monte Radicinio, et ad Ansurae rupes.

580. LASERPITIVM (*Siler vulgo* Siler montano) foliolis ovalilanceolatis, integerrimis, petiolatis. *Linn Hort. Cliff.* 96.

Ligusticum, quod Seseli Officinarum. *C. B. P.* 162.

Siler montanum. *Moris. Hist.* 3. *p.* 276. *se.* 9. *t.* 3. *f.* 1.

Ad montes Samnitarum habitat.

Attenuat et laudatur in morbis pectoris. etc.

HERACLEVM

581. HERACLEVM (*sphondylium vulgo* Sfondilio irsuto) foliolis pinnatifidis. *Roy. Lugbd.* 113. *Linn. Hort. Cliff.* 103.

Sphondylium vulgare, hirsutum *C. B. P.* 157.

Sphondylium hirsutum, foliis angustioribus. *C. B. P.* 157. *Prodr.* 83. *Riv. pent.* 5.

Non procul ab Vrbe, et signanter in via Appia, et alibi.

582. HERACLEVM (*alpinum vulgo* Sfondilio di foglia liscia) foliis simplicibus, floribus radiatis. *Linn. Spec. Pl.* 5. *p.* 359.

Sphondylium alpinum glabrum. *C. B. P.* 157. *Prodr.* 83. *t.*83.

Sphondylium montanum glabrum, albo flore. *Barr. Icon.* 55.

Juxta Praenestem, Carpinetum, et Supinum.

In clysmatibus valet, et ad hystericos morbos.

LIGVSTICVM

583. LIGVSTICVM (*levisticus vulgo* Levistico volgare) foliis multiplicibus, foliolis superne incisis. *Roy. Lugbd.* 104. *Sauv. Monsp.* 261. *Linn. Hort. Cliff.* 97.

Ligusticum vulgare. *C. B. P.* 157.

Levisticum vulgare. *Moris. Hist.* 3. *p.* 275. *se.* 6. *t.* 3. *f.* 1.

Ad Januarium montem et ad montes Nursiae. Emolliens et resolvens.

ANGELICA

584. ANGELICA (*Sylvestris*, *vulgo* Angelica Salvatica) foliis aequalibus ovatolanceolatis, serratis. *Roy. Lugbd.* 103. *Hall. Helv.* 444. *Linn. Hort. Cliff.* 97. *Gron. Virg.* 31.

Angelica Sylvestris, major. *C. B. P.* 155.

Angelica Sylvestris. *Dod. Pent.* 318.

Vivit ad rivulos multis in locis, sicuti etiam ad rivulum prope viam Appiam vulgo Acquataccio. Sudorifera et Carminativa etc.

585. ANGELICA (*ovata vulgo* Angelica acquatica) foliolis ovatopetiolatis, subaequalibus, extremo impari cuneiformi.

Juxta scaturigines aquarum in valle vulgo dell' Inferno et ad aquas di Bocca di Leone. Emmenagoga, et aristolochica etc.

SIVM

586. SIVM (*latifolium vulgo* Canneo maggiore) foliis pinnatis, umbellis terminalibus. *Roy. Lugbd.* 104. *Linn. Hort. Cliff.* 98. *Hall. Helv.* 435.

Sium latifolium. *C. B. P.* 154.

Sium. *Riv. pent.* 78.

Sium sive Apium palustre foliis oblongis. *C. B. P.* 154. (*a*)

Ad rivulos, et ad aquarum scaturigines fere ubique.

Aperit, et detergit urinam, et menses movet.

587. SIVM (*nodiflorum vulgo* Canneo acquatico che fiorisce alle ale del suo gambo) foliis

pinnatis, umbellis axillaribus sessilibus. *Roy. Lugbd.* 105. *Sauv. Monsp.* 231. *Linn. Hort. Cliff.* 98.

Sium aquaticum procumbens, ad alas floridum. *Moris. Hist.* 3. *p.* 283. *se.* 9. *t.* 5. *f.* 3.

Habitat ad rivulorum ripas, et signanter alla Crescentia.

Diuretica, et antiscorbutica.

588. SIVM (*falcaria*) foliolis linearibus decurrentibus, connatis. *Roy. Lugbd.* 105. *Linn. Hort. Cliff.* 98. *Sauv. Monsp.* 232.

Erynghium arvense, foliis serratis. *C.B.P* 386.

Ammi perenne repens. *Moris. Hi.t.* 3. *p.* 294. *se.* 9. *t.* 8. *f.* 1.

Juxta Anticum vivit.

589. SIVM (*siculum vulgo* Dauco con foglia di Pastinaca) foliis radicalibus ternatis, caulinis bipinnatis. *Roy. Lugbd.* 105.

Myrrhis foliis Pastinacae laete virentibus. *Tour. Corol.* 22.

Daucus Pastinacae folio, siculus. *Zann. Hist.* 78. *t.* 30.

Ligusticum Graecum folio Apii. *Tour. Cor.* 23.

Ad Vallem Corsam. Aperiens etc.

S I S O N

590. SISON (*ammi vulgo* Ammi piccolo con foglia di Finocchio) foliolis caulinis subcapillaribus. *Linn. Hort. Vpsal.* 63.

Foeniculum Lusitanicum minimum acre. *T. Shaw. Afr.* 232. *t.* 232.

Ammi parvum foliis Foeniculi. *C. B. P.* 159.

Ammi. *Cam Epit.* 522.

Ammi lacinulis foliorum caulis capillaribus. *Roy. Lugbd.* 96. *Linn. Hort. Cliff.* 81.

Prope Castrum Cori, juxta nemora Olearum.

Ad stranguriam, et tenesmum.

591. SISON (*Inundatum*) repens, umbellis bifidis. *Linn. Flor. Svec.* 2. *n.* 249.

Sium foliis submersis capillaribus, emersis pinnatis. *Roy. Lugbd.* 105. *Sauv. Meth.* 232.

Sium minimum, foliis imis ferulaceis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 223. *Se.* 9. *t.* 9. *f.* 5.

Sium minimum, umbellatum, folio varians. *Pluk. Phyt.* 61. *f.* 3.

Juxta scaturigines aquarum Sermonetae habitat.

Ad dysenteriam, et alvi fluxum etc.

B V B O N

592. BVBON (*macedonicum vulgo* Apio Macedonico) foliolis rhombeoovatis, crenatis, umbellis numerosissimis. *Roy. Lugbd.* 100. *Linn. Hort. Cliff.* 95.

Apium Macedonicum. *C. B. P.* 154.

Petrosellinum Macedonicum. *Lob. Icon.* 708.

In Reatinis montibus, et Palumbariae. Vis aperiendi, et urinam ducendi.

OENANTHE

593. OENANTHE (*fistulosa*, *vulgo* Oenanthe acquatica) stolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fistulosis. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.*865.

Oenanthe foliis caulinis fistulosis, teretibus. *Roy. Lugbd.* 108. *Hall. Helv.*432. *Linn. Hort. Cliff.*99.

Oenanthe aquatica. *C. B. P.* 162.

Oenanthe. *Riv. Pent.* 66.

Ad rivulos prati duarum Turrium. Venefica.

594. OENANTHE (*crocata*, *vulgo* Oenanthe con foglie di Cerfoglio) foliis omnibus multifidis, obtusis, subaequalibus. *Roy. Lugbd.* 107. *Linn. Hort. Cliff.* 99.

Oenanthe chaerophylli foliis. *C. B. P.* 162.

Oenanthe Cicutae facie, succo viroso crocante. *Lob. Advers.* 326. *Acta Angl.* 1747. *n.* 480. *p.* 235. *t.*3.

In paludosis, et etiam aridis ad Collem Marii.

595. OENANTHE (*prolifera vulgo* Oenanthe prolifera) umbellularum pedunculis marginalibus longioribus, ramosis, masculis. *Linn. Hort. Vps.* 63.

Oenanthe flosculis disci sessilibus, radii pedunculo ramoso, elevatis. *Linn. Vird. Cliff.* 24. *Roy. Lugbd.* 108.

Oenanthe flosculis radiantibus umbellarum proliferis. *Linn. Hort. Cliff.* 99.

Oenanthe prolifera Apula. *C. B. P.* 163. *Moris. Hist.* 3. *p.* 289. *Se.* 9. *t.*7. *f.*5.

Juxta Sessiam habitat.

596. OENANTHE (*pimpinelloides, vulgo* Oenanthe con foglia d' Apio) foliolis radicalibus cuneatis fissis, caulinis integris linearibus longissimis canaliculatis. *Roy. Lugbd.* 103. *Sauv. Monsp.* 259. *Linn. Hort. Cliff.* 99.

Oenanthe Apii folio. *C. B. P.* 162.

Oenanthe Pastinacae Sylvestris folio, semine Atriplicis. *C. B. P.* 162.

Oenanthe foliis radicalibus Apii, caulinis linearibus flagelliformibus. *Catal. Hort. Med. Rom.*

Oenanthe aquatica, Pimpinellae saxifragae divisura. *Pluk. Alm.* 268. *t.* 49. *f.* 4.

Prope lacum Vici, et alibi. Venefica.

PHELLANDRIVM

597. PHELLANDRIVM (*aquaticum, vulgo* Millefoglio acquatico) foliorum ramificationibus divariatis. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 366.

Phellandrium. *Linn. Hort. Cliff.* 100. *Roy. Lugbd.* 108. *Dod. Pempt.* 591.

Cicutaria palustris, tenuifolia. *C. B. P.* 161.

Millefolium aquaticum, umbellatum, Coriandri folio. *C. B. P.* 216. *(a)*

Millefolium aquaticum. *Matth. Dios.* 2. *p.* 484.

In valle Inferni juxta arundineta. In scirrhosis, et cancrosis.

598. PHELLANDRIVM (*mutellina*, *vulgo* Meo alpino con fiore rosseggiante) caule subnudo, foliis bipinnatis. *Linn. Spec. Pl.* 2. *p.* 366.

Seseli caule vix ramoso, umbella purpurea, pinnulis acute multifidis. *Hall. Helv.* 431.

Meum Alpinum, umbella purpurascente. *C.B. P.* 148. *Hall. Opusc.* 288.

Mutellina. *I. B. Hist.* 3. *p.* 66. *Cam. Epit. t.* 8.

Supra monasterium Sublaci. In tumoribus inflammatoriis, etc.

CICVTA

599. CICVTA (*virosa, vulgo* Cicuta acquatica) umbellis oppositifoliis, petiolis marginatis obtusis. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 366.

Cicuta. *Linn. Hort. Cliff.* 100. *Roy. Lugbd.* 109.

Cicuta aquatica. *Linn. Flor. Lapp.* 103.

Sium Erucae folio. *C.B.P.* 154.

Juxta Paludes Sermonetae habitat

600. CICVTA (*bulbifera*) ramis bulbiferis. *Linn. Spec. Plant.* 2. *p.* 367.

Ammi foliorum lacinulis capillaribus, caule angulato. *Gron. Virg.* 31.

Vmbellifera aquatica, foliis in minutissima, et plane capillaria segmenta divisis. *Rai. Suppl.* 260.

Prope Baulinum vivit. Est venenata.

AETHVSA

601. AETHVSA (*cynapium vulgo* Cicuta minore). *Linn. Hort. Cliff.* 100. *Roy. Lugbd.* 109. *Hall. Helv.* 433.

Cicuta minor, Petroselino similis. *C.B.P.* 160.

Cicutaria fatua. *Lob. Icon.* 280.

In circo maximo, et alibi intra, et extra Vrbem habitat. Est venefica.

CORIANDRVM

602. CORIANDRVM (*sativum vulgo* Pitartima maggiore) fructibus globosis. *Linn. Hort. Cliff.* 100. *Roy. Lugbd.* 109. *Sauv. Monsp.* 260.

Coriandrum majus. *C. B. P.* 158.

Coriandrum. *Cam. Epit.* 523.

Vivit, et seritur in Sabinis, et alibi. Est planta aromatica, oleosa, et inertem pituitam debellat etc.

603. CORIANDRVM (*testiculatum vulgo* Pitartima minore) fructibus didymis. *Linn. Hort. Cliff.* 100. *Roy. Lugbd.* 109. *Sauv. Monsp.* 260.

Coriandrum minus testiculatum. *C. B. P.* 158. *Pluk. Alm.* 120. *t.* 169. *f.* 2.

Coriandrum minus odorum. *I. B. Hist.* 3. *p.*91.
Coriandrum Sylvestre foetidissimum. *C. B. P.* 158. *Segu. Veron.* 2. *p.* 28.

Non procul a Ceccano inter segetes vegetat. Semina moderate sumpta prosunt, et e contra.

SCANDIX

604. SCANDIX (*odorata vulgo* Mirride maggiore odorata) seminibus sulcatis, angulatis. *Linn. Hort. Cliff.* 101. *Roy. Lugbd.* 111.
Myrris major. Cicutaria odorata. *C. B. P.* 160.
Myrrhis. *Dod. Pempt.* 701.

In arundinetis fere ubique habitat. Aperiens et resolvens etc.

605. SCANDIX (*pecten vulgo* Pettine di Venere) seminibus laevibus, rostro longissimo. *Linn. Hort. Cliff.* 101. *Roy. Lugbd.* 111.
Scandix semine rostrato, vulgaris. *C.B.P.* 152.
Pecten Veneris. *Cam. Epit.* 302.

In summitate montis Viridis extra Januam Portuensem et alibi. Aperiens, et demulcens.

606. SCANDIX (*cerefolium, vulgo* Cerfoglio) seminibus nitidis, ovatosubulatis, umbellis sessilibus, lateralibus. *Linn. Hort. Cliff.* 110. *Roy. Lugbd.* 11. *Gron. Virg.* 32.
Chaerophyllum seminibus laevibus, umbellis ad nodos sessilibus. *Boehm. Lips.* 492.
Chaerophyllum sativum. *C. B. P.* 152.

Chaerophyllum. *Dod. Pempt.* 700.

Crescit inter olera, forsan ex semine sato, fere ubique. Detergens et deobstruens.

607. SCANDIX (*anthriscus vulgo* Mirride con semi aspri) seminibus ovatis hispidis, corollis uniformibus, caule laevi. *Linn. Spec. Plant.* 4. *p.* 368.

Scandix seminibus ovatis hispidis. *Linn. Hort. Cliff.* 101. *Roy. Lugbd.* 111. 242. 256.

Myrrhis sylvestris, seminibus asperis. *C. B. P.* 160.

Myrrhis sylvestris aequicolora. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 110. *t.* 112.

Ad montem arenarum in via Portuensi habitat. In herniis et tumoribus inflammatis.

608. SCANDIX (*australis vulgo* Scandice con semi rostrati, e corti) seminibus subulatis hispidis, floribus radiatis, caulibus laevibus. *Linn. Spec. Plant.* 5. *p.* 369.

Scandix seminibus rostratis, patulis, pedunculo brevioribus. *Sauv. Monsp.* 260.

Scandrix Cretica minor. *C. B. P.* 152.

Scandix semine rostrato, Italica. *C.B.Prodr.* 78.

Anisomarathrum. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 89. *t.* 90.

Ad Aquam frigidam quarto ab Vrbe lapide. Carminativa.

609. SCANDIX (*nodosa*, *vulgo* cerfoglio annuo nodoso) seminibus subcylindricis his-

pidis, caule hispido, geniculis tumidis. *Linn. Spec. Plant.* 6. *p.* 369.

Chaerophyllum articulis tumidis, umbella universali trifida. *Linn. Hort. Cliff.* 102. *Roy. Lugbd.* 112.

Cerefolium annuum, nodosum, semine aspero majore. *Moris. Hist.* 3. *p.* 303. *Se.* 9. *t.* 10. *f.* 4.

Myrrhis nodosa, annua, semine aspero. *Moris. Bles.* 288.

In rure Excell. Domus Corsini etc.

CHAEROPHYLLVM

610. CHAEROPHYLLVM (*sylvestre*, *vulgo* Cerfoglio perenne con foglia di Cicuta) flosculis omnibus fertilibus, caule aequali. *Linn. Sp. Pl.* 1. *p.* 258.

Chaerophyllum seminibus laevibus, nitidis, petiolis rameis, aequalibus. *Linn. Hort. Cliff.* 101. *Roy. Lugbd.* 112.

Chaerophyllum sylvestre perenne, cicutae folio. *Tour. I. R. H.* 114.

Myrrhis sylvestris seminibus laevibus. *C. B. P.* 160.

Cicutaria vulgaris. *Dod. Pemp.* 701.

Non procul a Civitate Castellana. Diureticum etc.

611. CHAEROPHYLLVM (*temulum vulgo* cerfoglio con il gambo macchiato) caule

scabro, geniculis tumidis. *Linn. Spec. Pl.* 3. *p.* 370.

Chaerophyllum caule maculato, geniculis tumidis. *Linn. Hort. Cliff.* 102. *Roy. Lugbd.* 112.

Chaerophyllum sylvestre. *C. B. P.* 152.

Myrrhis (*vulgo* mirride volgare) annua, vulgaris, caule fusco. *Moris. Hist.* 3. *p.* 302. *Se.* 9. *t.* 10. *f.* 7.

Juxta sepes, arva, et vias. Aperiens etc.

IMPERATORIA

612. IMPERATORIA (*ostruthium vulgo* Imperatoria) *Linn. Hort. Cliff.* 103.

Imperatoria. *C. B. P.* 156.

Magistrantia. *Cam. Epit.* 592.

In jugis montium Samnitarum. Alexipharmaca, et sudorifera.

SESELI

613. SESELI (*montanum*, *vulgo* sassifragia montana) petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, foliis caulinis angustissimis. *Linn. Hort. Cliff.* 102. *Roy. Lugbd.* 112. *Dalib. Par.* 92. *Sauv. Monsp.* 256.

Meum latifolium adulterinum. *C. B. P.* 148.

Saxifraga montana, minor, Italica, foliis in breviores partes divisis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 272. *Se.* 9. *t.* 2. *f.* 1.

In alpibus Setinis. Lithontriptica.

614. SESELI (*tortuosum vulgo* Seseli di Marsiglia con foglie di finocchio , *et etiam* Sassifragia) caule alto rigido , foliolis linearibus fasciculatis. *Linn. Spec. Plant.*7. *p.*373.

Oenanthe striata rigida. *Linn. Hort. Cliff.* 99. *Sauv. Monsp.* 257.

Seseli Massiliense, foeniculi folio. *C.B.P.*101.

Foeniculum tortuosum. *I. B. Hist.* 3. *p.* 16.

In Viterbiensibus montibus, et Falisci etc. Ad calculos etc.

THAPSIA

615. THAPSIA (*foetida* , *vulgo* Tapsia con foglie di Carota) foliis multifidis , basi angustatis. *Roy. Lugbd.* 113. *Linn. Hort. Cliff.* 105.

Thapsia Carotae folio. *C. B. P.* 148.

Thapsia Carotae effigie . *I. B. Hist.* 3. *p.* 187. *Moris. Hist.* 3. *p.* 319. *Se.* 9. *t.* 18. *f.* 7.

Ad Carpinetum , et Supinum . Interne est virulenta .

616. THAPSIA (*trifoliata*) foliis ternatis ovatis . *Lin. Spec. P.* 4. *p.* 376.

Sium folio infimo cordato , caulinis ternatis , omnibus crenatis . *Gron. Virg.* 31.

Prope Pontem Galerae. Radix virulenta.

PASTINACA

617. PASTINACA (*panax*, *sativa vulgo* Pastinaca domestica)foliis simpliciter pinnatis.*Lin.*

Hort. Cliff. 105. *Roy. Lugbd.* 114. *Gort. Gelr.* 60.

Pastinaca sylvestris latifolia. *C. B. P.* 155.

Pastinaca sativa latifolia. *C. B. P.* 155. *(a)*

In pascuis, et ruderatis. (a) in hortis sata. Calculum solvit.

618. PASTINACA (*foetida vulgo* pastinaca puzzolente) Ficus folio, odore foetido, succo lacteo gummoso. *Cat. Hort. Rom.* 1770.

Ad montem Januarium, etc.

Nostra Planta aequat in altitudine, ut plurimum, pedes sex Geometricos antiquos Romanos.

Caulis in summitate est ramosus, umbellae planae, flores rosacei lutescentes.

Folia in forma, substantia, asperitate, crassitie, et magnitudine non discrepant a foliis Ficus arboris, odorem dant foetidum, et nauseosum.

Semina sunt duo, elliptica, tenuia, marginata, involucrum ut plurimum deponentia.

Filamenta quinque capillaria, antherae subrotundae, styli duo reflexi, stigmata obtusa.

SMYRNIVM

619. SMYRNIVM (*perfoliatum*) foliis caulinis simplicibus amplexicaulibus. *Linn. Hort. Cliff.* 104. *Roy. Lugbd.* 114.

Smyrnium peregrinum rotundo seu oblongo folio. *C. B. P.* 154. *Prodr.* 82.

Smyrnium Amani montis. *Dod. Pempt.* 698.

In montibus Setinis, et in Sylva supra lacum Dianae ad Orientem etc. Emmenagogum, anticolicum, etc.

620. SMYRNIVM (*olusatrum* , *vulgo* Smirnio , Macerone, et Olusatro delle Spezierie) foliis caulinis ternatis petiolatis serratis. *Linn. Hort. Cliff.* 105. *Roy. Lugbd.* 114. *Sauv. Monsp.* 262.

Hipposelinum Theophrasti , sive Smyrnium Dioscoridis . *C. B. P.* 154.

Hipposelinum . *Dod. Pempt.* 698.

Ad Theatrum Flavium , vulgo Colosseo , multisque aliis in locis abundanter . Diureticum , et asthmati optime conducens etc.

ANETHVM

621. ANETHVM (*graveolens* , *vulgo* Aneto) fructibus compressis . *Linn. Hort. Cliff.* 106. *Roy. Lugbd.* 116.

Anethum hortense . *C. B. P.* 147.

Inter segetes . In colicis, et flatulentis .

622. ANETHVM (*foeniculum vulgo* Finocchio dolce) fructibus ovatis . *Linn. Hort. Cliff.* 106. *Roy. Lugbd.* 116.

Foeniculum dulce . *C. B. P.* 147.

Foeniculum vulgare Germanicum . *C. B. P.* 147. (*a*)

Foeniculum (*vulgo* Finocchio volgare) vulgare Italicum , semine oblongo , gustu acuto . *C. B. P.* 147. (*b*)

Foeniculum (*vulgo* Finocchio salvatico) sylvestre. *C. B. P.* 147. *(c)*

In campis, vineis, et pascuis. Carminativum, uterinum, et galactophorum.

CARVM

623. CARVM (*Carvi vulgo* Carvi delle Spezierie) *Dod. Pempt.* 299. *Linn. Hort. Cliff.* 106. *Roy. Lugbd.* 116. *Hall. Hel.* 428.

Carum pratense, Carvi officinarum. *C. B. P.* 158.

In collibus aridis supra Tusculum. Ophthalmicum, et anticolicum.

PIMPINELLA

624. PIMPINELLA (*saxifraga vulgo* Pimpinella sassifragia maggiore, e minore) foliis pinnatis, foliolis radicalibus. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 378.

Pimpinella foliolis subrotundis. *Linn. Flor. Svec.* 246.

Pimpinella. *Linn. Hort. Cliff.* 106. *Roy. Lugbd.* 115.

Pimpinella saxifraga minor. *C. B. P.* 160.

Pimpinella saxifraga major altera. *C. B. P.* 159. *(a)*

Pimpinella saxifraga major, umbella candida. *C. B. P.* 159. *(b)*

Pimpinella saxifraga major, umbella rubente. *C.B. P.* 159 (*c*)

Habitat fere ubique in aridis ad Alpes. Incisiva, et lithontriptica.

625. PIMPINELLA (*peregrina vulgo* Dauco terzo di Dioscoride) foliis radicalibus pinnatis crenatis, summis cuneiformibus incisis. *Linn. Spec. Pl.* 3. *p.* 378.

Anisum foliis radicalibus pinnatis. *Linn. Hort. Cliff.* 107. *Roy. Lugbd.* 115. *Sauv. Meth.* 231.

Apium peregrinum, foliis subrotundis. *C. B. P.* 153.

Daucus tertius, Dioscordis. *Columnn. Ecphr.* 1. *p.* 108. *t.* 109.

In pascuis sterilibus juxta montem Faliscium. Aperiens, et diuretica.

626. PIMPINELLA (*Anisum vulgo* Anisi volgare) foliis radicalibus trifidis incisis. *Linn. Spec. Pl.* 4. *p.* 379.

Anisum foliis radicalibus simplicibus. *Linn. Hort. Cliff.* 107. *Roy. Lugbd.* 116.

Anisum herbariis. *C. B. P.* 159.

Anisum vulgare. *Clus. Hist.* 2. *p.* 202.

Cuminum (*vulgo* Cimino) semine rotundiore, et minore. *C. B. P.* 146. *Rai. Extr.* 63. (*a*)

In campis sterilibus non procul a Viterbio, et in Sabinensibus ubi (a) seritur. Flatus discutit. etc.

APIVM

627. APIVM (*Petroselinum vulgo* Erbetta Ortense) foliolis caulinis linearibus, involucellis minutis. *Linn. Hort. Cliff.* 108. *Roy. Lugbd.* 116.

Apium hortense. Petroselinum vulgo. *C. B. P.* 158.

Apium hortense. *Dod. Pempt.* 694.

Apium (*vulgo* Erbetta riccia) vel Petroselinum crispum. *C. B. P.* 153. *(a)*

In hortis, et in fictilibus (a) vivit. Radix inter quinque aperientes connumeratur.

628. APIVM (*graveolens vulgo* Apio delle Spezierie) foliolis caulinis cuneiformibus, umbellis sessilibus. *Linn. Hort. Cliff.* 107. *Roy. Lugbd.* 115.

Apium palustre, sive apium Officinarum. *C. B. P.* 154.

Apium (*vulgo* Sellero) dulce, Celleri Italorum *Tour. I. R. H.* 305. *(a)*

In humectis, et ad scaturigines aquarum. (a) satum in hortis vocatur Sellero. Solvit, et stimulat. etc.

AEGOPODIVM

629. AEGOPODIVM (*Podagraria vulgo* Angelica silvestre, e Podagraria) foliis caulinis summis ternatis. *Linn. Hort. Cliff.* 107. *Roy. Lugbd.* 115.

Angelica sylvestris, minor, sive erratica. *C. B. P.* 155.

Herba Gerardi. *Dod. Pempt.* 320.

Ad sepes, et inculta multis in locis. Emmenagoga, et aristolochica,

PENTANDRIA TRIGYNIA

RHVS

630. RHVS (*coriaria*, *vulgo* Scotano) foliis pinnatis obtusiuscule serratis ovalibus, subtus villosis. *Mat. med.* 150.

Rhus foliis pinnatis serratis. *Linn. Hort. Cliff.* 110. *Roy. Lugbd.* 243. *Sauv. Monsp.* 227. *Gron. Orient.* 91.

Rhus folio Vlmi. *C. B. P.* 414.

Rhus Coriaria. *Dod. Pempt.* 779.

Extra Januam Portuensem et alibi.

631. RHVS (*Cotinus vulgo* Scotano) foliis simplicibus obovatis. *Linn. Spec. Plant.* 15. *p.* 383.

Cotinus foliis obverse ovatis. *Linn. Hort. Cliff.* 111. *Roy. Lugbd.* 243. *Gron. Orient.* 92.

Cotinus coriaria. *Dod. Pempt.* 780.

Cocconilea, sive Coccygra. *C. B. P.* 415.

Ad appendices montium Sabinorum. Pro coriariis etc. Adstringens. In diarrhaea, et dysenteria etc.

VIBVRNVM

632. VIBVRNVM (*Tinus vulgo* Tino, e Lau-

ro Tino) foliis integerrimis ovatis, ramificationibus venarum subtus villoso-glandulosis. *Linn. Spec. Plant* 1. *p.* 383.

Viburnum foliis ovatis integerrimis. *Sauv. Monsp.* 136. *Linn. Hort. Vpsal.* 89.

Tinus. *Linn. Hort. Cliff.* 109.

Tinus. 1. 2. 3. *Clus. Hist.* 1. *p.* 49.

Laurus Tinus, sive Sylvestris, trium generum. *I. B. Hist.* 3 *p.* 418.

Laurus Sylvestris (*vulgo* Lauro Salvatico e Sanguinella), Corni feminae foliis subhirsutis. *C. B. P.* 461. (*a*)

Laurus sylvestris foliis venosis. *C. B. P.* 461. (*b*)

Laurus Sylvestris, folio minore. *C. B. P.* 461. (*c*)

Ad collem Marii, et fere ubique invicem omnes. Fortiter purgant baccae etc.

633. VIBVRNVM (*Lantana vulgo* Viburno) foliis cordatis serratis venosis, subtus tomentosis. *Linn. Virid. Cliff.* 25. *Roy. Lugbd.* 242. *Sauv. Monsp.* 136.

Viburnum. *Linn. Hort. Cliff.* 107.

Viburnum vulgo. *C. B. P.* 249.

Lantana. *Dod. Pempt.* 701.

Ad Sabinos prope Castrum novum. Adstringens.

S A M B V C V S

634. SAMBVCVS (*Ebulus vulgo* Ebio, e Nibio)

cymis trifidis, stipulis foliaceis, caule herbaceo. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 385.

Sambucus caule herbaceo simplici. *Linn. Hort. Cliff.* 110. *Roy. Lugbd.* 245.

Sambucus humilis, seu Ebulus. *C.B.P.* 456.

Ebulus. *Fuchs. Hist.* 65.

Sambucus (*vulgo* Ebio, e Jevolo con frondi tagliate) humilis, seu Ebulus folio laciniato. *C. B. P.* 456. *(a)*

Juxta sepes et alibi.

635. SAMBVCVS (*nigra vulgo* Sambuco) cymis quinque partitis, caule arboreo. *Linn. Spec. Pl.* 3. *p.* 385.

Sambucus caule arboreo ramoso, floribus umbellatis. *Roy. Lugbd.* 243. *Linn. Flor. Svec.* 250. 265.

Sambucus caule perenni, ramoso. *Linn. Hort. Cliff.* 109.

Sambucus fructu in umbella nigro. *C.B.P.* 456.

Sambucus. *Dod. Pempt.* 845.

Sambucus fructu in umbella viridi. *C. B. P.* 456. *(a)*

Sambucus (*laciniata vulgo* Sambuco con foglia laciniata) laciniato folio. *C. B. P.* 456. *Dod. Pempt.* 845. *(b)*

Juxta sepes multis in locis. Est hydragogum omnium optimum. Flores in omnibus morbis pallidis etc.

STAPHYLEA

636. STAPHYLEA (*pinnata vulgo* Sambuco valico) foliis pinnatis. *Linn. Hort. Cliff.* 112. *Roy. Lugbd.* 436.

Staphylodendron. *Dalech. Hist.* 102.

Pistacia sylvestris. *C. B. P.* 401.

Habitat in nemoribus Tusculi, Ariciae, Cinthiani, et alibi. Ex baccis oleum resolvens elicitur.

TAMARIX

637. TAMARIX (*Gallica vulgo* Tamarisco) floribus pentandris. *Linn. Hort. Cliff.* 111. *Roy. Lugbd.* 436. *Sauv. Monsp.* 45.

Tamarix pedunculis nudis, floribus pentandris. *Linn. Hort. Vpsal.* 69.

Tamarix altera, folio tenuiore, sive Gallica. *C. B. P.* 485.

Tamariscus Narbonensis. *Lob. Icon.* 218.

Juxta Tiberim, et in nonnullis aliis locis inundatis.

638. TAMARIX (*Germanica vulgo* Tamarisco) floribus decandris. *Linn. Hort. Cliff.* 111. *Roy. Lugbd.* 436.

Tamarix fruticosa, folio crassiore, sive Germanica. *C. B. P.* 485.

Tamariscus Germanica. *Lob. Icon.* 218.

Ad Fluvium, vulgo Teverone. Contra vitia lienis, et in chlorosi valet etc.

CORRIGIOLA

639. CORRIGIOLA (*litoralis vulgo* Corregiola) *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 388.

Corrigiola, caule fasciculis florum terminato. *Linn. Hort. Cliff.* 112. *Roy. Lugbd.* 420. *Hall. Helv.* 391.

Polygonum litoreum minus, flosculis spadiceo-albicantibus. *C. B. P.* 281. *Prodr.* 131. *Moris. Hist.* 2. *p.* 593. *Se.* 5. *t.* 29. *f.* 1.

Ad litus Neptunni, et alibi. Adstringens.

ALSINE

640. ALSINE (*media vulgo* Alsine mezzana, e minore) petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Linn. Hort. Cliff.* 173. *Roy. Lugbd.* 449. *Gron. Virg.* 161.

Alsine media. *C. B. P.* 250.

Alsine minor. *Dod. Pempt.* 29.

Inter olera fere ubique. Refrigerans, et demulcens etc.

641. ALSINE (*segetalis vulgo* Alsine con foglia di Gramiccia) petalis integris, foliis filiformibus. *Linn. Spec. Plant.* 3. *p.* 390.

Spergula foliis filiformibus unum latus spectantibus, stipulis membranaceis vaginantibus, pedunculis umbellatis. *Guett. Stamp.* 299. *Dalib. Paris.* 133.

Alsine segetalis, gramineis foliis unum latus spectantibus. *Vaill. Paris.* 8. *t.* 3. *f.* 3.

Ad praedium, vulgo le Cosimelle.

PENTANDRIA PENTAGYNIA

STATICE

642. STATICE (*Armeria vulgo* Garofolo globoso) scapo simplici capitato , foliis linearibus. *Linn. Hort. Cliff.* 115. *Roy. Lugbd.* 194. *Gron. Virg.* 150.

Limonium aphyllocaulon , gramineum , globosum . *Moris. Hist.* 3. *p.* 601. *Se.* 5. *t.* 1. *f.* 29.

Caryophyllus montanus major , flore globoso . *C. B. P.* 211.

Caryophyllus montanus minor . *C.B.P.* 211. *(a)*

Statice flore albo , et carneo . (*b*)

In colle Marii, et monte Januario habitant . Adstringens etc.

643. STATICE (*Limonium* , *vulgo* Limonio maggiore) scapo paniculato , tereti , foliis laevibus. *Linn. Spec. Plant.* 2. *p.* 394.

Statice caule nudo ramoso . *Linn. Hort. Cliff.* 115. *Roy. Lugbd.* 192. *Gron. Virg.* 150.

Limonium maritimum majus . *C. B. P.* 192.

Limonium maritimum minus Oleae folio . *C. B. P.* 192. *(a)*

Limonium maritimum minimum . *C.B.P.* 192. *Prodr.* 99. *Bocc. Sic.* 25. *t.* 19. *(b)*

Inter Ansuram , et Centum Cellas omnes istae varietates inveniuntur . Detergens , et aperiens etc.

644. STATICE (*cordata vulgo* Limonio minore) scapo paniculato, foliis spathulatis, retusis. *Sauv. Monsp.* 15.

Limonium maritimum minus, foliis cordatis. *C. B. P.* 192. *Prodr.* 99.

Limonium minimum, cordatum sive folio retuso. *Bar. Icon.* 805.

Ad Alveum fluvii S. Augustini prope Centum Cellas.

LINVM

FOLIIS ALTERNIS

645. LINVM (*usitatissimum vulgo* Lino marzolo) calycibus, capsulisque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule subsolitario. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 397.

Linum ramis, foliisque alternis, linearilanceolatis, radice annua. *Linn. Hort. Cliff.* 114. *Roy. Lugbd.* 433. *Philoso. Bot.* 261.

Linum foliis alternis lanceolatis integerrimis, calycibus acuminatis angulatis, capsulis mucronatis. *Linn. Hort. Vpsal.* 71.

Linum arvense. *C. B. P.* 214. *Rai. Hist.* 1073.

Linum sativum. *C. B. P.* 214. (*a*)

Linum sativum humilius, flore majore. *Boerh. Lugbd.* 1. *p.* 284. (*b*)

Linum sativum latifolium Africanum, fructu majore. *Tour. I. R. H.* 339. (*c*)

Vivit fere ubique, et seritur.

646. LINVM (*hirsutum vulgo* Lino) calycibus hirsutis acuminatis, sessilibus, alternis, caule corymboso. *Linn. Spec. Plant.* 4. *p.* 398.

Linum sylvestre latifolium hirsutum, caeruleum. *C. B. P.* 339. *Moris. Hist.* 2. *p.* 573. *Se.* 5. *t.* 26. *f.* 5. *Rai. Hist.* 1073.

Linum sylvestre latifolium. *Clus. Hist.* 1. *p.* 319.

Prope Castrum del Piglio, non procul a Monasterio B. Andreae de Comitibus. Inter emollientia princeps. Oleum seminum anodynum, demulcens, et laxans. etc.

647. LINVM (*tenuifolium vulgo* Lino perenne con foglie strette) calycibus acuminatis, foliis sparsis lineari-setaceis, retrorsum scabris. *Linn. Spec. Pl.* 6. *p.* 398.

Linum perenne foliis angustioribus, calyce aristato. *Hall. Helv.* 371.

Linum sylvestre, angustifolium, flore magno. *C. B. P.* 214.

Linum sylvestre V. angustifolium. *Clus. Hist.* 1. *p.* 318.

Linum sylvestre angustifolium, flore magno intense caeruleo. *Tour. I. R. H.* 340. *(a)*

Linum sylvestre, angustifolium, flore magno violaceo. *Tour. I. R. H.* 340. *(b)*

Linum sylvestre angustifolium, flore magno lineis purpureis distincto. *Tour. I. R. H.* 340. *(c)*

Linum sylvestre, angustifolium, flore magno caeruleo, et velut cinereo. *Tour. I.R.H.* 340. *(d)*

Lini sylvestris V. angustifolii aliud genus. *Clus. Hist.* 1. *p.* 318.

Linum sylvestre angustifolium, floribus dilute purpurascentibus, vel carneis. *C.B.P.* 214. *(e)*

Linum sylvestre VI. angustifolium. *Clus. Hist.* 1. *p.* 318.

Linum oxyphyllum, multicaule. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 169. *t.* 125.

Linaria capillaceo folio, altera. *C.B.P.* 213. *(f)*

Linum angustifolium album (*vulgo* Lino con fiori bianchi), ramusculis per terram sparsis. *Tour. Inst.* 340. *(g)*

Linum sylvestre, angustis, et densioribus foliis, flore minore. *C. B. P.* 214.

Variis in locis et etiam invicem confusa habitant, non procul a templo Neptuni Ansurae. Vires ut supra etc.

648. LINUM (*strictum*, *vulgo* Lino con fiori gialli) calycibus subulatis, foliis lanceolatis strictis mucronatis margine scabris. *Linn. Spec. Pl.* 10. *p.* 400.

Linum foliis asperis, umbellatum luteum. *Magnol. Monsp.* 164. *Rai Hist.* 1076. *Sauv. Monsp.* 53.

Lithospermum Linariae folio, Monspeliensium. *C. B. P.* 259.

Passerina Lobelli. *I. B. Hist.* 3. *p.*454.

In sterilibus.

649. LINVM (*Gallicum vulgo* Lino salvatico, con fiore giallo, e foglia stretta) calycibus acutis, foliis lineari-lanceolatis alternis, paniculae pedunculis bifloris. *Linn. Spec. Pl.* 15. *p.* 401.

Linum foliis lineari-lanceolatis, pedunculis bifidis, floribus luteis. *Sauv. Monsp.* 53.

Linum sylvestre minus, flore luteo *C. B. P.* 214.

In aridis, et herbosis, sign. ad Theatrum Flavii, vulgo Colosseo, et ad Ostia Tiberina.

650. LINVM (*flavum, vulgo* Lino salvatico con foglia larga, fiore giallo) calycibus subserrato-scabris lanceolatis subsessilibus, panicula ramis dicotomis. *Linn. Spec. Pl.* 9. *p.* 399.

Linum sylvestre, latifolium, luteum. *C. B. P.* 214.

Linum latifolium luteum. *I. B. Hist.* 3. *p.* 454.

Linum sylvestre III. latifolium. *Clus. Hist.* 1. *p.* 317.

Prope Civitatem Portuensem.

FOLIIS OPPOSITIS

651. LINVM (*Africanum*) foliis oppositis, lineari-lanceolatis, floribus terminalibus pedunculatis. *Roy. Lugbd.* 434.

Linum Africanum luteum, foliis conjugatis. *Boerh. Lugbd.* 1. *p.* 284.

Ad turrim S. Laurentii juxta mare mediterraneum. Ad tumores emolliendos etc.

652. LINVM (*nodiflorum vulgo* Lino con foglia larga che fiorisce ad ogni nodo) foliis floriferis oppositis lanceolatis, floribus alternis sessilibus, calycibus longitudine foliorum. *Linn. Hort. Cliff.* 114.

Linum luteum ad singula genicula floridum. *C. B. P.* 214. *Moris. Hist.* 2. *p.* 574. *Se.* 5. *t.* 26. *f.* 11. *Rai. Hist.* 1026.

Linum luteum, sylvestre, latifolium. *Col. Ecphr.* 2. *p.* 79. *t.* 80.

Juxta Aricinum Nemus, et ad Caput Antii.

653. LINVM (*verticillatum vulgo* Lino salvatico, con foglie all' intorno) foliis verticillatis. *Linn. Spec. Plant.* 21. *p.* 402.

Linum sylvestre, folio caesio, foliis verticillalis. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 49. *t.* 42. *Rai. Suppl.* 524. *Barr. Rar.* 685. *t.* 1226.

Juxta viam ad Pinetum Marchionis Sacchetti. Semina demulcent, laxantque.

654. LINVM (*autumnale vulgo* Lino con fiori grandi bianchi, e cerulei) foliis oppositis, cuneiformibus.

Producit florem amplissimum et dantur duae varietates, nempe una fert florem album, altera caeruleum. Planta autumnalis est, et in Novembri mense floret, et vivit in locis humentibus, et signanter a Maccarese.

ALDROVANDA

655. ALDROVANDA (*vesiculosa vulgo* Lenticchia palustre.) *Mont. Act. Bonon.* 2. *p.* 3. *p.* 404. *t.* 12.

Lenticula palustris Indica, foliis subrotundis binis, capillamentis ad imum barbatis. *Pluk. Alm.* 211. *t.* 41. *f.* 6.

Ad paludes Pontinas. Humectans, et refrigerans.

DROSERA

656. DROSERA (*rotundifolia vulgo* Ros solis con foglia tonda) scapis radicatis, foliis orbiculatis. *Roy. Lugbd.* 120. *Gron. Virg.* 35. *Linn. Flor. Lapp.* 109.

Ros solis folio rotundo. *C. B. P.* 357.

Salsirora, seu Ros solis. *Thal. Herc.* *t.* 9. *f.* 1.

Ad Pontinas paludes. Pectoralis, et cordialis.

657. DROSERA (*longifolia vulgo* Ros solis con foglia lunga) scapis radicatis, foliis oblongis. *Roy. Lugbd.* 417. *Flor. Lapp.* 110. *Flor. Svec.* 258. 274.

Ros solis folio oblongo. *C. B. P.* 357.

Salsirora, sive Sponsa solis, sive Ros solis, sive Rorella. *Thal. Herc.* 116. *t.* 9. *f.* 2.

Habitat cum praecedenti. In tussi inveterata, et pulmonum ulceribus.

PENTANDRIA POLYGYNIA

MYOSVRVS

658. MYOSVRVS (*minimus vulgo* Coda di Sorcio) *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 407.
Myosurus foliis integerrimis. *Linn. Hort. Cliff.* 117. *Roy. Lugbd.* 492.
Holosteo affinis Cauda muris. *C. B. P.* 190.
Cauda Muris. *Dod. Pempt.* 112.
Ad montem Gemmarum extra januam Salariam.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA

HEXANDRIA MONOGYNIA

GALANTHVS

659. GALANTHVS (*nivalis vulgo* Leucojo bulboso di tre foglie) *Roy. Lugbd.* 35. *Linn. Hort. Cliff.* 134.
Leucojum bulbosum, trifolium minus. *C. B. P.* 56.
Erangelia. *Reneal. Spec.* 97. *t.* 96.
Ad montem Viterbii etc.

LEVCOIVM

660. LEVCOIVM (*vernum*, *Rizot.* Leucoio volgare, narcissino,bulboso) spatha uniflora, stylo clavato. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 414.

Leucoium. *Linn. Hort. Cliff.* 135. *Roy. Lugbd.* 35.

Leucoium bulbosum, vulgare. *C. B. P.* 55. *Rudb. Elys.* 2. *p.* 95. *f.* 1.

Leucoium bulbosum. *Clus. Hist.* 1. *p.* 169.

Ad Viterbii et Januarii Montes.

661. LEVCOIVM (*aestivum Rizot.* Leucoio tardivo, e Narcisso di tre foglie grandi, e tre piccole, e più fiori) spatha multiflora, stylo clavato. *Linn. Spec. Plant.* 2. *p.* 414.

Leucoium bulbosum majus multiflorum. *C. B. P.* 55.

Leucoium bulbosum serotinum majus. *I. Clus. Hist.* 1. *p.* 170.

Polyanthemum. *Renealm. Spec.* 99. *t.* 100.

Ad montem Viterbii, et Januarium, ad Vetruclanum, et ad Nemus Suriani.

NARCISSVS

662. NARCISSVS (*poeticus vulgo* Tazzetta, e Narcisso bianco) spatha uniflora, nectario rotato brevissimo. *Linn. Hort. Vpsal.* 74.

Narcissus foliis ensiformibus, floris nectario rotato, brevissimo, scarioso, crenulato. *Roy. Lugbd.* 85. *Sauv. Monsp.* 17. *Linn. Hort. Cliff.* 134.

Narcissus albus, circulo purpureo. *C.B.P.* 48.

Narcissus medio-purpureus. *Dod. Pempt.* 223.

Narcissus medio purpureus multiplex. *C. B. P.* 54. (*a*)

Omnes habitant juxta D. Marinellam etc.

663. NARCISSVS (*pseudo-narcissus* , *vulgo* Tazzetta, e Narcisso giallo) spatha uniflora , nectario campanulato , erecto , crispo , aequante petala ovata . *Linn. Spec. Pl.* 2. *p.*414.

Narcissus foliis ensiformibus , florum nectario longitudine petalorum. *Linn.Hort. Cliff.* 134. *Sauv. Monsp.* 17.

Narcissus sylvestris pallidus , calyce luteo. *C. B. P.* 52.

Narcissus luteus sylvestris. *Dod. Pempt.* 227. *f.* 12.

Narcissus Sylvestris multiplex , calyce carens . *C. B. P.* 54. (*a*)

Narcissus (*vulgo* Narcisso con fiore doppio) luteus sylvestris , duplici , sive triplici tubo aureo . *C. B. P.* 54. (*b*)

Non procul a templo Divi Pauli extra moenia Vrbis, et aliis in locis.

664. NARCISSVS (*Bulbocodium vulgo* Narcisso con foglia di Giunco , et etiam Giunchiglia) spatha uniflora , nectario maximo patulo , turbinato , genitalibus declinatis.

Narcissus foliis subulatis , nectario maximo

patulo, genitalibus declinatis. *Linn. Hort. Cliff.* 134. *Roy. Lugbd.* 35.

Narcissus montanus alter, flore fimbriato. *C. B. P.* 53.

Narcissus montanus juncifolius, calyce aureo. *C. B. P.* 53. *Rubd. Elys.* 2. *p.* 75. *f.* 5. 7.

Pseudo-Narcissus juncifolius 2. flavo flore. *Clus. Hist.* 1. *p.* 166.

Ad Insulam Sacram, et ad Portum.

665. NARCISSVS (*Moscatus*, *vulgo* Collo di Camelo) spatha uniflora, nectario cylindridrico, subrepando, aequante petala oblonga. *Linn. Sp. Pl.* 5. 415.

Narcissus totus albus, nutante flore, longa tuba. *Barr. Icon.* 945. 922. 921. 946. 953. 954.

Narcisus albus, calyce flavo, moscari odore. *C. B. P.* 52. *Rudb. Elys.* 2. *p.* 69 *f.* 6. *et* 73. *f.* 15. 16.

Narcissus flavus, tubo rotundo. *C. B. P.* 52. *Rudb. Elys.* 2. *p* 68. *f.* 3. 4.

Ad Sylvam supra lacum Dianae.

666. NARCISSVS (*calatinus*, *vulgo* Narcisso, Tazzetta di foglia stretta) spatha multiflora, nectario campanulato subcrenato, aequante petala, foliis planis. *Lin. Sp Pl.* 6. 415.

Narcissus angustifolius flavus magno calyce. *C. B. P.* 51. *Rudb. Elys.* 2 *p.* 60. *f.* 5.

Narcissus IX. angustifolius. *I. Clus. Hist. p.* 158.

667. NARCISSVS (*Serotinus vulgo* Narcisso Autunnale con fiore bianco) spatha uniflora nectario brevissimo sexpartito. *Loesl. it.* 19.

Narcissus albus autumnalis minimus. *C.B.P.*51. *Rudb. Elys.* 2. *p.* 64. *f.* 8.

Narcissus serotinus. *Clus. Hist.* 1. *p.* 162.

Narcissus autumnalis minor. *Clus. Lisp.* 251. *t.* 252.

Ad Ostia Tiberina, et Octobri, atque Novembri floret.

668. NARCISSVS (*Ionquilla ; vulgo* Gionchiglia gialla) spatha multiflora, nectario campanulato brevi, foliis subulatis.

Narcissus foliis subulatis, florum nectario brevissimo. *Linn. Hort. Clif.* 134.

Narcissus Juncifolius luteus, minor. *C.B.P.*51.

Narcissus Juncifolius oblongo calyce, luteus major. *C. B. P.* 51.

Narcissus Juncifolius minor et 2. *Clus. Hist.* 1. *p.* 159.

Habitat in pratis fere ubique.

669. NARCISSVS(*Tazzetta vulgo* Narcisso con fiore pieno)spatha multiflora, nectario campanulato, truncato, breviore petalis, foliis planis. *Linn. Sp.Pl.* 7. 416.

Narcissus foliis ensiformibus, florum nectario

campanulato, erecto, petalis longe breviore. *Hort. Cliff.* 134.

Narcissus medio luteus, copioso flore, odore gravi. *C. B. P.* 50.

Narcissus luteus polyanthes, Lusitanicus. *C. B. P.* 50.

Narcissus latifolius, flore prorsus albo. 1. 2. *Clus. Hist.* 1 *p.* 155.

Ad Portum, ad turrim S. Laurentii. Bulbi Narcissorum crudi sunt emetici, in chirurgicis sunt detergentes, et maxime conglutinantes etc.

PANCRATIVM

670. PANCRATIVM (*maritimum vulgo* Pancratio) spatha multiflora, petalis planis, foliis lingulatis. *Mill. Dict.* 197.

Narcissus Maritimus. *C. B. P.* 54.

Lilio-Narcissus albus, maritimus, minor, *Moris. Hist.* 2. *p.* 365. *Se.* 4. *t.* 10. *f.* 28.

Hemerocallis Valentina. *Clus.* 1. *p.* 167.

Ad Litus Portuense.

AMARYLLIS

671. AMARYLLIS (*lutea vulgo* Narcisso, e Cholchico di fiore giallo) spatha uniflora, corolla aequali, staminibus declinatis. *Roy. Lugbd.* 36. *Linn. Hort. Cliff.* 135.

Narcissus autumnalis major. *Clus. Hist.* 1. *p.* 164.

Colchicum luteum I. majus. *C. B. P.* 69.

Extra Januam D. Pancratii, et S. Joannis.

B V L B O C O D I V M

672. BVLBOCODIVM (*vernum vulgo* Colchico vernale, e Zafrano bastardo) foliis lanceolatis. *Roy. Lugbd.* 41.

Bulbocodium. *Linn. Hort. Cliff.* 133.

Colchicum vernum Hispanicum. *C. B. P.* 69. *Rubd. Elis.* 2. *p.* 128. *f.* 2.

Colchicum vernum. *Clus. Hist.* 2. *app.* 203.

Prope Arcem Civitatis Castellanae in Sabinis. Est planta malefica.

A P H Y L L A N T H E S

673. APHYLLANTHES (*Monspelliensis*) *Sauv. Monsp.* 8. *Linn. Hort. Cliff.* 493.

Aphyllanthes Monspelliensium. *Lob. Adv.* 190. *I. B. Hist.* 3. *p.* 336.

Caryophyllus caeruleus Monspelliensium. *C. B. P.* 209. *Moris. Hist.* 2. *p.* 562. *Se.* 5. *t.* 25. *f.* 12.

Ad montem Sorat in locis sterilibus.

A L L I V M

FOLIIS CAULINIS PLANIS

674. ALLIVM (*ampeloprasum*, *vulgo* Aglio con capo tondo) caule planifolio, umbellifero, umbella globosa, staminibus tricuspi-

datis, petalis carina scabris. *Linn. Sp. Pl.* 1. 423.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, floribus sphaerice congestis, radice laterali solida. *Hall. Helv.*5. *Opusc.* 344.

Porrum radice laterali solida, foliis linearibus, caule erecto, umbella subglobosa. *Roy. Lugbd.*40.

Allium sphaerico capite, folio latiore, seu Scorodoprasum alterum. *C. B. P.* 74. *Rubd. Elys.* 2.*p.* 151.

Scorodoprasum (*vulgo* Aglio con foglie larghe, e fiori rosseggianti) latifolium, spontaneum, Italicum, floribus dilute purpureis odoratis. *Mich. Gen.*25. *t.*24.*f.*5.

Ad Amphitheatrum Flavium. Incisivum, et aperiens.

675. ALLIVM (*Porrum, vulgo* Porro volgare) caule planifolio umbellifero, staminibus tricuspidatis, radice tunicata. *Linn. Hort. Vpsal.*77.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, floribus sphaerice congestis, radice tunicata, cauli circumnata *Hall. All.* 7.

Porrum radice ambiente, tunicata, oblonga, solitaria. *Linn. Hort. Cliff.* 136. *Roy. Lugbd.* 40.

Porrum commune capitatum. *C. B. P.* 72.

Porrum sativum, latifolium. *C. B. P.* 72. *(a)*

Ad nemus Porcigliani, (a) seritur quotidie in hortis. Lithontripticum etc,

676. ALLIM (*rotundum*) caule planifolio, umbellifero, staminibus tricuspidatis, umbella subglobosa, floribus lateralibus. *Linn. Sp. Pl.* 4. 423.

Allium staminibus alternetrifidis, spica sphaerica, foliis gramineis, radice multiplici. *Hall. Opusc.* 350. *n.* 8.

Allium montanum capite rotundo. *C. B. P.* 75.

Scorodoprasum latifolium, spontaneum, Italicum, floribus diluto purpureis, odoratis. *Mich. Gen.* 25. *t.* 24. *f.* 1.

In locis montanis, Amphitheatro Flavio etc.

677. ALLIVM (*victoriale vulgo* Aglio con foglia larga, e macchiata) caule planifolio umbellifero, umbella rotundata, staminibus lanceolatis, corolla longioribus, foliis ellipticis. *Mat. Med.* 163.

Allium foliis caulinis lanceolatis, floribus umbellatis. *Roy. Lugbd.* 39.

Allium radice oblonga, reticulo obducta. *Hall. All.* 20.

Allium montanum latifolium maculatum. *C. B. P.* 74.

Allium anguinum. *Cam Epit* 329.

Ad Aquam Traversam extra Januam Angelicam 3. ab Vrbe Lapide. Ad montem Albanum.

678. ALLIVM (*subhirsutum* , *vulgo* Moli di Dioscoride) caule planifolio umbellifero, foliis inferioribus hirsutis, staminibus subulatis. *Osb. it.* 49.

Allium foliis radicalibus subhirsutis, caulinis, glabris, floribus umbellatis. *Hall. All.* 18.

Allium foliis lanceolatolinearibus, florum umbella fastigiata. *Roy. Lugbd.* 39.

Moly angustifolium, umbellatum. *C.B.P.*75.

Moly Dioscoridis. *Clus. Hist.* 1. *p.* 192.

Extra Januam Portuensem non procul a fovea Lapidum.

679. ALLIVM (*roseum vulgo* Aglio con fiore di colore di Rosa) caule planifolio, umbellifero, umbella fastigiata. staminibus corollam aequantibus, foliis laevibus.

Allium foliis ensiformibus, radice bulbillis stipata, floribus amplis, umbellatis. *Sauv. Monsp.* 42.

Allium silvestre, sive Moly minus, roseo amplo flore. *Mag. Monsp.* 11. *t.* 10.

Cum praecedenti cohabitat,

680. ALLIVM (*carinatum* , *vulgo* Aglio con fiori bulbiferi) caule planifolio, bulbifero, staminibus subulatis. *Flor. Svec.*2. *n.*281.

Allium umbella bulbifera, vagina bicorni, foliis carinatis. *Hall. All.* 27. *t.* 1. *f.* 2.

Ampeloprasum proliferum. *Lob. Icon.* 156.

Allium (*vulgo* Alio bicorne) montanum bicorne, angustifolium, flore dilute purpurascente. *C. B. P.* 74. (*a*)

Allium, seu Moly montanum. 2. *Clus. Hist.* 1. *p.* 193.

Ad Flavium Theatrum vulgo Collosseo.

681. ALLIVM (*sativum vulgo* Aglio comune) caule planifolio bulbifero, bulbo composito, staminibus tricuspidatis. *Linn. Hort. Vpsal.* 76.

Allium radicis bulbo multipartito, capitulo bulbifero, foliis linearibus. *Linn. Hort. Cliff.* 137. *Roy. Lugbd.* 39.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis gramineis, capite bulbifero, radicibus in unum bulbum congruentibus. *Hall. All.* 1.

Allium sativum. *C. B. P.* 73. (*a*)

Allium. *Cam. Epit.* 328. (*b*)

Ad vineas infructiferas, et ad Montem Testaceum. (a) (b) colitur in hortis.

682. ALLIVM (*villosum*) scapo in summitate tantum folioso, et triphyllo, foliis villosis, flore umbellato, staminibus tricuspidatis.

Extra Januam S. Pancratii, et signanter ad Clivum Vinearum in publica via, quae ad Ecclesiam Divi Pancratii ducit. Alexipharmacam, vermifugam, et lithontripticam facultatem habent Alliorum species etc.

FOLIIS CAVLINIS TERETIBVS

683. ALLIVM (*sphaerocephalon vulgo* Scorodopraso) caule teretifolio umbellifero, foliis semiteretibus, staminibus tricuspidatis, corolla longioribus. *Linn. Spec. P.* 14. *p.* 426.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, spica sphaerica non bulbifera, suave-rubente. *Hall. Opusc.* 353. *n.* 10.

Allium montanum, capite rotundo. *C. B. P.* 75. *Rudb. Elys.* 1. *p.* 157. *f.* 7.

Allium, sive Moly montanum,, purpureo flore. *Clus. Hist.* 1. *p.* 195.

Alii genus forte Scorodoprasum alterum. *I. B. Hist.* 2. *p.* 564.

Scorodoprasum montanum Iuncifolium, capite rotundo dilute janthino, floribus paucis. *Mich. Gen.* 25. *t.* 24. *f.* 2.

Prope Castrum Farnese.

684. ALLIVM (*moscatum*) caule teretifolio, umbellifero, umbella fastigiata, subsexflorus, petalis acutis, staminibus simplicibus, foliis setaceis. *Lin. Sp. Pl.* 17. 427.

Alium foliis teretibus caulinis, floribus umbellatis. *Hall. All.* 17.

Moly moscatum capillaceo folio. *C. B. P.* 76. *Prod.* 28. *t.* 28. *Rudb. Elys.* 2. *p.* 166. *f.* 14. *Sauv. Monsp.* 10.

Ad Ianuarium montem, Palatiolam etc.

685. ALLIVM (*flavum*) caule tereti folio umbellifero, floribus pendulis, petalis ovatis, staminibus corolla longioribus. *Lin. Sp. Pl.* 19. 428.

Allium foliis teretibus, vagina bicorni, umbella lutea pendula. *Hall. Opusc.* 24.

Allium juncifolium, bicorne, lutenm. *Rudb. Elys.* 2.*p*. 157. *f*. 6.

Ad montem Gemmarum etc.

Datur varietas, quae flores purpurascentes producit etc.

In sterilibus montanis.

686. ALLIVM (*vineale*) caule teretifolio bulbifero, staminibus cuspidatis. *Lin. Sp. Pl.* 21. 428.

Allium staminibus alterne trifidis, foliis fistulosis, capite bulbifero, radice multiplici. *Hall. All.* 4.

Allium sylvestre, campestre, purpurascens. *C. B. P.* 74.

Allium campestre juncifolium, capitatum, purpurascens, majus. *C. B. P.* 74.

Porrum sylvestre vinearum. *C. B. P.* 72.

Porrum sylvestre, gemino capite. *C. B. P.* 72.

In campis, et vineis alicubi.

687. ALLIVM (*ascalonica*, *vulgo* Scalogna) scapo nudo tereti, foliis subulatis, umbella

globosa, staminibus tricuspidatis. *Linn. Sp. Pl.* 24. 429.

Cepa foliis subulatis, radicibus oblongis conglobatis. *Hort. Cliff.* 36.

Cepa Ascalonica. *Moriss. Hist.* 2. *p.* 303. 5. 4. *t.* 14. *f.* 3.

Colitur alicubi. Est in usu in coquinis.

688. ALLIVM (*chamaemoly vulgo* Moli piccolo con foglie di Gramiccia) scapo nudo subnullo, capsulis cernuis, foliis planis ciliatis. *Linn. Spec. Pl.* 37. *p.* 433.

Moly humile, folio gramineo. *C. B. P.* 75. *Rudb. Elys.* 2. *p.* 166. *f.* 15.

Chamaemoly, an Moly Dioscoridis? *Col. Ecphr.* 325. *t.* 326.

In Monte Testaceo habitat.

689. ALLIVM (*ursinum vulgo* Aglio ursino) scapo nudo semicylindrico, foliis lanceolatis petiolatis, umbella fastigiata. *Linn. Spec. Plant.* 29. *p.* 431.

Allium foliis radicalibus petiolatis, floribus umbellatis. *Roy. Lugbd.* 39. *Hall. All.* 21. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 49.

Allium sylvestre latifolium. *C. B. P.* 74.

Allium Vrsinum. *Fuchs. Hist.* 739. *Cam. Epit.* 330.

In nemorosis montibus Januarii, et Nursiae.

690. ALLIUM (*triquetrum vulgo* Aglio con la radice longa) scapo nudo, foliis triquetris, staminibus simplicibus. *Linn. Sp Pl.* 30. *p.* 431.

Allium caule triangulo . *Tour. I. R. H.* 385. *Roy. Lugbd.* 39.

Allium pratense folio gramineo , flore prorsus albo , radice oblonga . *Rudb. Elys.* 2. *p.* 159. *f.* 16.

Moly parvum , caule triangulo . *C. B. P.* 75.

Moly caule, et foliis triangularibus . *Park. Par.* 142. *t.* 143. *f.* 4.

In pratis humidiusculis .

691. ALLIVM (*cepa , vulgo* Cipolla volgare) scapo nudo, inferne ventricoso longiore , foliis teretibus . *Linn. Hort. Vps.* 77.

Allium staminibus alterne trifidis , caule ad terram ventricoso . *Hall. All.* 10.

Cepa scapo nudo ventricoso , foliis longiore , radice depressa . *Linn. Hort. Cliff.* 137. *Roy. Lugbd.* 40.

Cepa vulgaris . *C. B. P.* 71.

In locis apricis et etiam seritur in hortis. Incisivum, et aperiens.

LILIVM

692. LILIVM (*candidum*) foliis sparsis , corollis campanulatis, intus glabris . *Roy. Lugbd.* 30. *Linn. Hort. Cliff.* 120. *Gron. Orient.* 105.

Lilium album flore erecto, vulgare. *C.B.P.*76.
Lilium candidnm. *Dod. Pempt.* 197.

Fere ubique in hortis. Emolliens etc.

693. LILIVM (*bulbiferum*, *vulgo* Giglio purpureo croceo) foliis sparsis, corollis campanulatis erectis, intus scabris. *Roy. Lugbd.* 31. *Linn. Hort. Cliff.* 120. *Gmel. Sibir.* 1. *p.* 41. *Gron. Orient.* 104.

Lilium purpureo croceum majus. *C.B. P.*76.
Lilium purpureo croceum minus. *C.B.P.*77. *(a)*
Lilium phoeniceum. *C. B. P.* 77. *(b)*
Lilium bulbiferum latifolium majus. *C. B. P.* 77. *(c)*
Lilium bulbiferum angustifolium. *C. B. P.* 77. *(d)*
Lilium bulbiferum minus. *C. B. P.*77. *(e)*
Lilium bulbiferum incanum. *C. B. P* 77. *(f)*

In montibus Viterbii, et prope Vetruclanum habitant.

694. LILITVM (*martagon*) foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Hort. Cliff.* 120. *Hort. Vpsal.* 81. *Gmel. Sibir.* 1. *p.* 44. *Roy. Lugbd.*31.

Lilium floribus reflexis, montanum. *C.B.P.*77.
Lilium silvestre. *Dod. Pempt.* 201.
Lilium floribus reflexis, alterum, hirsutum. *C. B. P.*78.

Ad Fajolam, Montem Ciminum etc.

695. LILIVM (*punctatum*) foliis sparsis, floribus reflexis, corollis revolutis, et punctatis.

Ad Samnitas prope Fellettinum, ad Fajolam etc.

696. LILIVM (*Canadense vulgo* Giglio con fiori gialli macchiati di nero) foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis campanulatis. *Lin. Spec. Pl.* 7. *p.* 435.

Lilium angustifolium, flore flavo, maculis nigris distincto. *Tour. I. R. H.* 371. *Bar. Rar.* 778. *t.* 125.

Ad Vetrudanum. Bulbi liliorum sunt laxantes, et emollientes.

697. LILIVM (*verticillatum vulgo* Giglio o Martagone con foglie verticillate) foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis revolutis, ex purpureo, et nigro mixtis.

Ad montem Sorat.

ERYTHRONIVM

698. ERYTHRONIVM (*Dens canis vulgo* Dente Canino) *Linn. Hort. Cliff.* 119. *Roy. Lugbd.* 30. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 39. *t.* 7.

Dens Canis latiore, rotundioreque folio. *C. B. P.* 87.

Dens caninus. *Dod. Pempt.* 203.

Dens Canis angustiore, longioreque folio. *C. B. P.* 87. *(a)*

Erythronium foliis ovatooblongis, glabris, ni-

gromaculatis. *Gron. Virg.* 151. *flore flavo.* (*b*)

In monte Viterbii. Anthelminticum esse dicit Clusius.

ORNITHOGALVM

699. ORNITHOGALVM (*luteum vulgo* Ornitogalo giallo) scapo anguloso diphyllo, pedunculis umbellatis simplicibus. *Linn. Flor. Svec.* 270. 285.

Ornithogalum scapo diphyllo, pedunculis simplicibus terminalibus, filamentis omnibus subulatis. *Linn. Hort. Cliff.* 124. *Roy. Lugbd.* 31.

Ornithogalum luteum. *C. B. P.* 71.

Pyrrochiton. *Renealm. Spec.* 91. *t.* 90.

Ad nemus Matthaeiorum octavo ab urbe lapide.

700. ORNITHOGALVM (*Narbonense*) racemo oblongo, filamentis lanceolatis membranaceis, pedunculis floribusque patentibus. *Amoen. Ac.* 4. *p.* 312.

Ornithogalum majus spicatum flore albo. *C.B. P.* 70.

Ornithogalum Narbonense. *Dod. Pemp.* 222.

Ad Palazziola, Agrum Fellettinum, et alibi.

701. ORNITHOGALVM (*umbellatum vulgo* Ornitogalo con fiori umbellati) floribus corymbosis, pedunculis scapo altioribus, fila-

mentis emarginatis. *Roy. Lugbd.* 32. *Linn. Hort. Cliff.* 124. *Gron. Orie.* 111.

Ornithogalum umbellatum, medium, angustifolium. *C. B. P.* 70.

Eliocarmos. *Reneal. Spec.* 88. *t.* 87.

Prope templum trium fontium.

702. ORNITHOGALVM (*pyramidale vulgo* Ornitogalo maggiore con più fiori, e questi di colore giallastro) racemo conico, floribus numerosis adscendentibus. *Roy.Lugbd.* 32.

Ornithogalum angustifolium, spicatum, maximum. *C.B.P.*70. *Rudb. Elys.*2. *p.* 134. *f.* 4.

Ornithogalum lacteum, maximum. *Besl. Eyst. Vern.* 5. *t.* 14. *f.* 2.

In vineis extra januam Flaminiam.

703. ORNITHOGALVM (*conicum*) racemo conico, floribus tirsatim dispositis.

Ad nemus Ariciae, vulgo il Selvotto. Vires ut in Cepis.

SATVRNIA

704. SATVRNIA (*cernua*) A bubillo parvo tunicato perbrevis scapus exit, vix a terra egrediens, foliis gramineis ciliatis vestitus, eum spatha radicalis amplexatur, idem divaricatur in duas, vel plures partes, sive ramulos, in quorum summitate plures, vel pauciores vegetant flores liliacei, petalis sex

ovatis constantes, in quorum centro embrio existit subrotundus, brevissimo cum pistillo a staminibus sex, cum apicibus didymis, reniformibus, connubio stabili permanentibus.

Stigma subrotundum est, et umbilicatum. Embrio abit in fructum subrotundum, trivalvem, sexlocularem, seminibus foetum quasi triangularibus. A structura igitur partium, quae in Saturnia reperiuntur, stabiliendum est, an competere possit ad Allii genus, ut nonnulli putarunt, quod esse possit Allium scapo nudo, subnullo, capsulis cernuis, foliis planis ciliatis *Linn. Spec. Plant. I. fol.* 433. *n.* 37. Moly humile folio gramineo. *C. B. P.* 75. *Rubd. Elys.* 2. *p.* 166. *f.* 15. Chamaemoly, et Moly Dios. *Col. Ecphr.* 225. *t.* 326. Vnde ex dictis unusquisque judicare poterit, an nostra Saturnia locum habere possit in Alliorum familia, si innixi stare velint doctissimorum botanicorum doctrinis; Et ut recte procedant, confundere haud debent unum genus cum alio. Clarissimus enim Hallerus capsulas ponit in Allio semper trigonas, triloculares, trivalves, et semina subrotunda. Linnaeus doctissimus assignat Alliorum generi capsulas

brevissimas, latas, trilobas, trivalvas, triloculares, semina subrotunda, antheras oblongas, erectas, pistillum trigonum, stigma acutum. etc. Vnde etc.

Saturnia foliis gramineis ciliatis.

Saturniam appellavi, quia vitam vivit nostra planta in Ianiculo monte extra januam D. Pancratii. Ianuario, et Februario.

Ianiculus mons est ubi Saturnus colonus fuit, ut Romanarum antiquitatum historiae notum faciunt etc.

SCILLA

705. SCILLA (*maritima*, *vulgo* Scilla rossa volgare) nudiflora, bracteis refractis. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 442.

Scilla radice tunicata. *Linn. Hort. Cliff.* 123. *Roy. Lugbd.* 32.

Scilla vulgaris, radice rubra. *C. B. P.* 73. (*a*)

Scilla Hispanica. *Clus. Hist.* 1. *p.* 171.

Scilla (*vulgo* Scilla bianca) radice alba. *C.B. P.* 73. *Seb. Mus.* 1. *t.* 44. *f.* 4. 5. (*b*)

Ad Litora maris Tyrrheni.

706. SCILLA (*Italica*, *vulgo* Giacinto stellare con fiori cenerognioli) corymbo conferto hemisphaerico. *Linn. Spec. Pl.* 3. *p.* 442.

Scilla radice solida, floribus corymbosis confertissimis. *Linn. Hort. Cliff.* 123. *Roy. Lugbd.* 32.

Hyacinthus stellaris, spicatus, cinereus. *C. B. P.* 46.

Hyacinthus stellaris, Italicus. *Besl. Eyst. Vern.* 42. *f.*1.

Hyacinthus stellatus, cinerei coloris. *Clus. Hist.* 1.*p.* 184.

Ad oras maritimas Ostienses. In pituitosis etc. Scilla cruda est valide acris, et fauces exurit, neque cruda, neque in substantia umquam utimur, praeparatur igitur cum pasta involuta et in clibano coquitur. Conficitur Acetum et Oxymel Scilliticum ad pituitam solvendam etc.

707. SCILLA (*autumnalis vulgo* Giacinto stellare autunnale) foliis filiformibus linearibus, floribus corymbosis, pedunculis nudis adscendentibus, longitudine floris. *Linn. Spec. Pl.* 7. *p.* 443.

Scilla radice solida, foliis setaceis, floribus fastigiatis, pedunculis arcuatis ex ala tuberculi mammillaris. *Guett. Stamp.* 131. *Dalib. Par.* 102.

Scilla radice solida, scapo multifloro, floribus capitatis. *Sauv. Monsp.* 19.

Hyacinthus stellaris, autumnalis, minor. *C. B. P.* 47.

Hyacinthus autumnalis, minor. *Clus.* 1.*p.*185.

Ad Colles Sacchetti, et in Valle Inferni vulgo.

ASPHODELVS

708. ASPHODELVS (*fistulosus vulgo* Asfodelo con foglie strette e vote) caule nudo, foliis

strictis, subulatis, striatis, subfistulosis. *Linn. Hort. Cliff.* 83.

Asphodelus caule nudo, foliis strictis. *Roy. Lugbd* 34.

Asphodelus foliis fistulosis. *C.B. P.*29.

Asphodelus minor. *Clus. Hist.* 1. *p.* 197.

In Monte Testaceo, et alibi. Radix in vino infusa venenum expellit, si bibatur, et conducit in urina, et menstruis provocandis, et ulceribus detergendis.

709. ASPHODELVS (*ramosus vulgo* Asfodelo bianco, ramoso, e Porrazza) caule nudo ramoso, foliis ensiformibus, carinatis, laevibus. *Mat. Med.* 172.

Asphodelus caule nudo, foliis laxis. *Linn. Hort. Cliff.*127. *Roy. Lugbd.*24.

Asphodelus albus ramosus, mas. *C. B. P.*28.

Asphodelus. 1. 2. *Clus. Hist.* 1. *p.* 197.

Juxta sepes, et vias multis in locis.

710. ASPHODELVS (*foliis angustissimis vulgo* Asfodelo bianco con foglie strette) caule nudo, foliis angustissimis, carinatis, laevibus.

Asphodelus albus, non ramosus. *C. B. P.*28.

Asphodelus. 2. *Clus. Hist.*1.*p.*197.

Non procul a Vetruclano. Radix detergens, et urinam provocans et menstrua.

ANTHERICVM

711. ANTHERICVM (*ramosum vulgo* Falangio maggiore , ramoso con fiori piccoli) foliis planis , scapo ramoso, corollis planis, pistillo recto . *Linn. Spec. Plant.* 4. *p.* 445.

Anthericum foliis planis , corollis planis deciduis . *Linn. Flor. Svec.*267. 289.

Anthericum caulibus ramosis , foliis planis . *Guett. Stamp. p.* 129.

Phalangium parvo flore, ramosum. *C.B.P.* 29.

Phalangium majus . *Cam. Epit.* 580.

Prope flumen Vezza , et ad Cryptas S. Stephani . Ad phalangiorum morsum.

LEONTICE

712. LEONTICE (*Leontopetalum vulgo* Leonto petalo) foliis decompositis , petiolo communi trifido . *Linn. Hort. Cliff.* 122. *Gron. Orient.* 114.

Leontopetalon, foliis costae ramosae innascentibus . *Tour. I. R. H. Coroll.*49.

Leontopetalon . *C. B. P.* 324. *Cam. Epit.* 565. *Moris. Hist.* 2. *p.* 285. *Se.* 3. *t.* 15. *f.* 6. *Rai. Hist.* 1326.

Ad Planum Fraxinorum . Contra morsus serpentum , et dolores inde natos. Diosc.

ASPARAGVS

713. ASPARAGVS (*officinalis vulgo* Sparagio)

caule herbaceo, erecto, foliis setaceis, stipulis duabus interioribus, una exteriore. *Linn. Hort. Cliff.* 121. *Roy. Lugbd.* 28.

Asparagus (*maritimus vulgo* Sparagio con foglia più grossa) maritimus, crassiore folio. *C. B. P.* 490. *(a)*

Asparagus (*vulgo* Sparagio con foglia sottile) sylvestris, tenuissimo folio. *C.B.P.* 490. *(b)*

Asparagus (*altilis vulgo* Sparagio domestico) sativa. *C. B. P.* 489. *(c)*

Asparagus. *Cam. Epit.* 259.

Ad Ostia Tiberina, et multis aliis in locis habitant. (c) Seritur in hortis.

714. ASPARAGVS (*albus vulgo* Sparagio salvatico) spinis retroflexis, foliis fasciculatis, angulatis, muticis, deciduis. *Linn. Sp. Pl.* 6. 449.

Asparagus aculeis solitariis, ramulis flexuosis, binis, oppositis, spinosis, foliosis, foliis fasciculatis. *Roy. Lugbd.* 29.

Asparagus aculeatus, spinis horridus. *C.B.P.* 490.

Corruta tertia. *Clus. Hist.* 2. *p.* 178.

In dumetis, et Sylvis etc.

715. ASPARAGVS (*aculifolius vulgo* Sparagio salvatico, che le sue frondi puncicano) caule inermi fruticoso, foliis acinaciformibus

rigidulis, perennantibus, mucronatis, aequalibus. *Linn.Spec. Plant.* 7. *p.*449.

Asparagus foliis acinaciformibus pungentibus, caule fruticoso inermi. *Sauv. Monsp.* 45.

Asparagus foliis acutis. *C. B. P.*490.

Asparagus sylvestris. *Cam. Epit.*260.

In dumetis, et sepibus. Asparagi aperientes. Asparagorum radices inter quinque radices aperientes connumerantur. Vrinam movent etc.

CONVALLARIA

LILIVM CONVALLIVM TOVR. COROLLIS CAMPANVLATIS

716. CONVALLARIA (*majalis*, *vulgo* Mughetto) scapo nudo. *Flor. Lap.* 113. *Hort. Cliff.* 124. *Roy. Lugbd.* 26. *Gmel. Sibir.* 1. *p.* 34.

Lilium convallium album. *C. B. P.* 304.

Lilium convallium alpinum. *C. B. P.* 304.

Ad montem Sorat. Refocillans.

POLYGONATA TOVR. COROLLIS INFVNDIBVLIFORMIBVS

717. CONVALLARIA (*verticillata* Poligonato non ramoso) foliis verticillatis. *Linn. Hort. Cliff.* 125. *Roy. Lugbd.* 26.

Polygonatum angustifolium, non ramosum. *C. B. P.* 303.

Polygonatum alterum. *Dod. Pempt.* 345.

Polygonatum (*vulgo* Poligonato ramoso con

foglia stretta) angustifolium, ramosum. *C. B. P.* 304. *(a)*

Ad Nemus vulgo la Fajola, et alibi. In fluore albo.

718. CONVALLARIA (*polygonatum vulgo* Poligonato con foglia larga, e sigillo di Salomone) foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris. *Mat.Med.* 168. *Philos. Bot.* 218. *Gmel. Sibir.* 1. *p.* 34.

Convallaria foliis alternis, floribus axillaribus. *Linn. Hort. Cliff.* 124. *Roy. Lugbd.* 26. *Gron. Virg.* 37.

Convallaria foliis alternis, pedunculis pendulis unifloris. *Sauv. Monsp.* 42.

Polygonatum floribus ex singularibus pedunculis. *C. B. P.* 303.

Polygonatum latifolium, flore majore odoro. *C. B. P.* 303.

In nemoribus montanis, et ad radices Collium Aquae Transversae. Adstringens etc.

719. CONVALLARIA (*pleniflora vulgo* sigillo di Salomone con fiore doppio) latifolia, foliis alternis, amplexicaulibus, floribus semiplenis, distincte petiolatis binatim, et ex eodem puncto axillari prodeuntibus. *Hort. Rom. Maratti*.

Ad S. Paolum non procul a monte Januario.

HYACINTHVS

720. HYACINTHVS (*non scriptus*, *vulgo* Giacinto, con fiore lungo turchino) corollis campanulatis, sexpartitis, apice revolutis. *Roy. Lugbd.* 27. *Linn. Hort. Cliff.* 125. *Sauv. Monsp.* 17.

Hyacinthus oblongo flore, caeruleus, major. *C. B. P.* 43.

Ad Colles, et nemora Farnesiorum.

721. HYACINTHVS (*Muscari*, *vulgo* Muscari, e Fiore Musco) corollis ovatis, omnibus aequalibus. *Hort. Cliff.* 126. *Hort. Vpsal.* 85. *Roy. Lugbd.* 28.

Muscari obsoletiore flore. *Clus. Hist.* 1. *p.* 178.

Hyacintus racemosus, muscatus. *C.B.P.* 43. *(a)*

Multis in locis in Agris. (a) in hortis colitur.

722. HYACINTHVS (*comosus vulgo* Giacinto comoso - rosseggiante) corollis angulato-cylindricis, summis sterilibus, longius pedicellatis. *Linn. Spec. Pl.* 9. *p.* 455.

Hyacinthus corollis globosis, summis peduculatis, foliis ensiformibus. *Sauv. Monsp.* 17.

Hyacinthus comosus, major, purpureus. *C. B. P.* 42.

Hyacinthus. *Cam Epit.* 798.

In agris multis in locis.

723. HYACINTHVS (*botryoides*, *vulgo* Gia-

cinto con li fiori cerulei disposti in forma di rampazzo) corollis globosis, uniformibus, foliis canaliculatocylindricis strictis. *Linn. Spec. Pl.* 10. *p.* 455.

Hyacinthus corollis globosis. *Roy. Lugbd.* 28. *Linn. Hort. Cliff.* 126.

Hyacinthus corollis globosis, foliis in cylindrum convolutis. *Sauv. Monsp.* 19.

Hyacinthus racemosus, caeruleus major. *C. B. P.* 42.

Hyacinthus botryoides purpureus. III.. *Clus. Hist.* 1. *p.* 181.

Hyacinthus botryoides caeruleus, amoenus. *Lob. Icon.* 108.

In Campis frequens.

724. HYACINTHVS (*racemosus vulgo* Giacinto minore con foglie di giunco, e fiori turchini racemosi) corollis ovatis, summis sessilibus, foliis laxis. *Sauv. Monsp.* 17.

Hyacinthus racemosus caeruleus minor juncifolius. *C. B. P.* 43.

Hyacinthus botryoides. *Clus. Hist.* 1. *p.* 181.

Cum supra dictis ut plurimum habitat. Bulbus est emeticus.

ACORVS

725. ACORVS (*calamus*) *Roy. Lugbd.* 6. *Linn. Flor. Svec.* 277. 297.

Acorus (*vulgaris vulgo* Acoro vero) verus,

sive calamus aromaticus officinarum. *C. B. P.* 34. *Linn. Hort. Cliff.* 137. *Park. Theat.* 140. *Rai. Synop. ed.* 3. 437.

Typha aromatica, clava rugosa. *Moris. Hist.* 3. *p.* 246.

Acorum. *Rumph. Amb.* 5. *p.* 178. *t.* 72. *f.* 1.

Calamus aromaticus vulgaris, multis Acorum. *I. B.* 2. 734.

Calamus aromaticus. *Petit.* 49. *et Mont. Cat. Plant. Agri Bon. Prodr.* 29.

Ad lacum Triviae, et in colle vulgo Fiorito, sed rarus. Obvius in aliquibus hortis. Radix cordialis, et stomachica.

IVNCVS

CVLMIS NVDIS

726. IVNCVS (*acutus vulgo* Gionco acuto) culmo subnudo, tereti, mucronato, panicula terminali, involucro diphyllo, spinoso. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 463.

IVNCVS culmo pungente, panicula ex folii solitarii axilla. *Sauv. Monsp.* 9.

Iuncus panicula universali culmi breviore infime coarctata, secundariis paululum laxis, capsulis triquetro-subovatis nitentibus. *Guett. Stamp.* 2. *p.* 412.

Iuncus acutus, capitulis Sorghi. *I. R. Hist.* 2. *p.* 520. *Moris. Hist.* 3. *p.* 232. *Se.* 8. *t.* 10. *f.* 15.

Iuncus panicula universali culmo longiore,

secundariis laxis longe pedunculatis, media praecipue. *Guett. Stamp.* 2. *p.* 412. *(a)*

Iuncus acutus, maritimus, anglicus. *Rai. Hist.* 1303. *Moris. ibid. f.* 14.

Ad litus maris Mediterranei in locis paludosis.

727. IVNCVS (*inflexus vulgo* Gionco con la punta rivoltata) culmo nudo, apice membranaceo, incurvo, panicula laterali. *Linn. Spec. Plant.* 4. *p.* 464.

Iuncus culmo nudo, paniculam arcuatim tegente. *Sauv. Monsp.* 9.

Iuncus acumine reflexo, major. *C. B. P.* 12. *Prodr.* 184. *Moris. Hist.* 3. *p.* 233. *Se.* 8. *t.* 10. *f.* 25. *Barr. Icon.* 204. *Hall. Helv.* 252.

Iuncus acumine reflexo, alter. *C. B. P.* 12. *Prodr.* 22. *Scheuch. gram.* 345. *(a)*

Iuncus (*vulgo* Giunco con la pannicola spargliata) panicula universali laterali culmo longiore, secundariis sparsis. *Guett. Stamp.* 2. *p* 412. *(b)*

Iuncus acutus panicula sparsa. *C. B. P.* 11.

Habitat in Farnesiorum villa, et ad Maccarese.

728. IVNCVS (*effusus vulgo* Giunco appuntato, e alla base squamoso) culmo nudo stricto, panicula laterali. *Roy. Lugbd.* 44.

Iuncus culmo nudo, acuminato, ad basim

squamato, floribus sessilibus. *Hall. Helv.* 254. *Flor. Lap.* 116. *(a)*

Iuncoides alpinum, flosculis Iunci glomeratis atrofuscis. *Scheuch. Hist.* 323.

Iuncus culmo nudo, acuminato, ad basim squamato, floribus pedunculatis. *Gron. Virg.* 38. *Flor. Lap.* 117. *(b)*

Iuncus laevis, panicula sparsa, major. *C. B. P.* 12. *Scheuch. Gram.* 341.

Iuncus laevis. *Dod. Pempt.* 606.

In dumetis uliginosis, et (a) in Valle Corsa.

CVLMIS FOLIOSIS

729. IVNCVS (*articulatus vulgo* Gramiccia acquatica con le frondi articolate) foliis nodoso-articulatis, petalis obtusis. *Linn. Flor. Svec.* 285. 303.

Iuncus foliis articulosis, panicula inaequali, capitulis sessilibus, capsulis subulatis triquetris. *Roy. Lugbd.* 43.

Iuncus foliis articulosis, floribus umbellatis. *Tour. I. R. H.* 247.

Gramen Iunceum, folio articulato, aquaticum. *C B.P.*5. *Prodr.* 12. *Theat.*76. *Scheuch. Gram.* 331.

Gramen Iunceum, folio articuloso, cum utriculis. *C.B. Prodr.* 12. *Scheuc.Gram.* 333. *(a)*

Iuncus alpinus, folio articuloso. *Scheuch.Gram.* 333. (*b*)

Gramen junceum, folio articuloso, sylvaticum. *C. B. P.* 5. *Moris. Hist.* 3. *p.* 227. *Se.* 8. *t.* 9. *f.* 1. *Scheuch. Gram.* 334.

Iunci foliosi, foliis per siccitatem nodosis. *Mich. Gen.* 38. *n.* 1. 13.

In uliginosis, et hieme inundatis.

730. IVNCVS (*bulbosus vulgo* Giunco piccolo con la panicola spennacchiata) foliis linearibus canaliculatis, capsulis obtusis. *Linn. Flor. Svec.* 284. 304.

Iuncus foliis linearibus canaliculato-concavis, capsulis triangularibus. *Guett. Stamp.* 134.

Iuncus foliis angulatis, culmo subnudo, panicula terminali prolifera, capsulis ovatis. *Roy. Lugbd.* 43.

Iuncus parvus cum pericarpiis rotundis. *I. B. Hist.* 2. *p.* 522.

Iuncus repens apocarpos, minor. *Barr. Icon.* 114.

Gramen Iunceum, junci sparsa panicula. *Moris. Hist.* 3. *p.* 227. *Se.* 8. *t.* 9. *f.* 11.

In pratis sterilibus, et ad vias campestres.

731. IVNCVS (*Bufonius vulgo* Giunco palustre, o Buffonio) culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus solitariis sessilibus. *Roy.*

*Lugbd.*43. *Hall. Helv.* 254. *Linn. Flor. Svec.* 283. 305.

Iuncus palustris humilior, panicula laxissima. *Rupp. Ien.* 130.

Gramen nemorosum, calyculis paleaceis, erectum. *Scheuch. Gram.* 327.

Gramen nemorosum, calyculis paleaceis. *C. B. P.* 7.

Holosteum. *Lob. Icon.* 18.

Gramen nemorosum, calyculis paleaceis repens. *Scheuch. Gram.* 329. *(a)*

Gramen nemorosum, calyculis paleaceis, species altera procerior. *Scheuch. Gram.*328. *(b)*

Gramen bufonium, erectum, angustifolium, majus. *Barr. Icon.* 264. (*c*)

Gramen holosteum, alpinum, minimum. *C. B. P.* 7. *Prodr.* 64. (*d*)

Gramen Iuncoides, minimum, Anglo-Britannicum. *Rai. Angl.*3.*p.*434.

In uliginosis, et locis aqua repletis, tam in agro salino, quam in Insula Sacra. (d) ad Supinum.

732 IVNCVS (*pilosus vulgo* Gramiccia di macchia irsuto,e di foglia larga) foliis, planis pilosis,corymbo ramoso.*Linn.Flor.Svec.*287.308.

Iuncus foliis planis, panicula diffusa, pedunculis proliferis, flosculis intermediis sessilibus. *Roy. Lugbd.* 43.

Gramen nemorosum hirsutum, latifolium, majus. *C. B. P.* 7. *Moris. Hist.* 3. *p.* 225. *Se.* 8. *t.* 9. *f.* 1.

Gramen (*vulgo* Gramiccia di foglia stretta irsuta e con semi di Lino) hirsutum, angustifolium, perenne, Lini utriculis. *Barr. Icon.* 740. (*a*)

Iuncus (*vulgo* Gramiccia irsuta, minore, e di foglia larga) foliis planis, culmo paniculato, floribus sparsis. *Linn. Flor. Lapp.* 124. (*b*)

Gramen hirsutum, latifolium, maximum, juncea panicula. *Moris. Hist.* 3. *p.* 225. *Se.* 8. *t.* 9. *f.* 2.

Gramen hirsutum, angustifolium, majus. *C. B. P.* 7. *Prodr.* 16. *Moris. Hist.* 3. *p.* 225. *Se.* 8. *t.* 9. *f.* 3. *Scheuch. Gram.* 318. (*c*)

Gramen hirsutum, latifolium minus. *I. B. Theat.* 102. (*d*)

In variis nemoribus, et praesertim in sylvis, vulgo il Selvotto, et etiam al Capannone, et alibi.

BERBERIS

733. BERBERIS (*vulgaris* Berberi volgare, e Crespino) pedunculis racemosis. *Gr. Or.* 120.

Berberis spinis triplicibus. *Linn. Hort. Cliff.* 122. *Roy. Lugbd.* 348. *Hall. Helv.* 424.

Berberis dumetorum. *C. B. P.* 454.

Berberis vulgaris, sive Crespinus. *Cam. Epit.* 86.

In dumetis et sylvis. Adstringens, et refrigerans etc.

FRANCKENIA

734. FRANCKENIA (*laevis vulgo* Franca marittima sempre verdeggiante con frondi d'Erica) foliis linearibus, basi ciliatis. *Linn. Spec. P.* 1. *p.* 473.

Franckenia foliis confertis. *Roy. Lugbd.* 452.

Franckenia foliis acinaciformibus congestis. *Sauv. Monsp.* 46.

Franca floribus solitariis sessilibus, foliis prismaticis, triangularibus. *Guett. St.* 2. *p.* 459.

Franca maritima supina, saxatilis, glauca, ericoides, semper virens, flore purpureo. *Mich. Gen.* 23. *t.* 22. *f.* 1.

Lychnis supina maritima, Ericae facie. *Rai. Angl.* 3. *p.* 38.

Anthyllis repens, Italica, Thymi foliis, rubente flore, Polygoni facie. *Till. Pis.* 46.

Cali, sive Vermiculari marinae non dissimilis planta. *I. B. Hist.* 3. *p.* 703.

Polygonum fructicosum, supinum, Ericoides, cinereum, Thymi folio, Hispanicum. *Barr. Icon.* 714. *Bocc. Mus.* 1. *p.* 7. *t.* 11.

Polygonum maritimum, minus, foliis Serpylli. *C. B. P.* 281.

In maritimis, et signanter non procul a Turre S. Laurentii.

735. FRANCKENIA (*hirsuta vulgo* Alsine marittima supina irsuta con frondi vermicolate)

caulibus hirsutis, floribus fasciculatis terminalibus. *Linn. Spec. Plant.* 2. *p.* 473.

Franca maritima, supina, multiflora, candida, caulibus hirsutis, foliis quasi vermiculatis. *Mich. Gen.* 23. *t.* 22. *f.* 2.

Polygonum Creticum, Thymi folio. *C.B. P.* 281. *Prodr.* 131.

Alsine Cretica, maritima, supina, caule hirsuto, foliis quasi vermiculatis. *Tour. Coroll.* 45.

Prope oras maritimas ad Centum Cellas.

736. FRANCKENIA (*pulverulenta vulgo* Franca marittima con quattro foglie) foliis obovatis, retusis, subtus pulverulentis. *Linn. Spec. Pl.* 3. *p.* 474.

Franckenia foliis ovalibus. *Sauv. Monsp.* 168.

Franca maritima, quadrifolia, supina, Chamaesyces folio, et facie. *Mich. Gen.* 23.

Anthyllis Valentina. *Clus. Hist.* 2. *p.* 186.

Anthyllis marina, Chamaesyces similis. *C. B. P.* 282.

In litore Centum Cellarum.

PEPLIS

737. PEPLIS (*Portula*) floribus apetalis. *Flor. Lapp.* 28. *Hall. Helv.* 406.

Glaucoides palustre, Portulacae folio, flore purpureo. *Mich. Gen.* 21. *t.* 18.

Alsine palustris minor serpillifolia. *C.B.P.* 251.

Ad Pontinas lacunas etc.

HEXANDRIA DIGYNIA

ORYZA

738. ORYZA (*sativa vulgo* Riso .) *C. B. P.* 24. *Dod. Pempt.* 509. *Linn. Hort. Cliff.* 137. *Roy. Lugbd.* 58.

Seritur in praedio paludoso Castri vulgo Longhezza Ducis Strozzi, prope Molendinum . Semina conducunt phthysicis , et iis qui perdiderunt sanguinis magnam quantitatem etc.

HEXANDRIA TRIGYNIA

RVMEX

HERMAPHRODITI : VALVVLIS FLORIS GRANVLO NOTATIS

739. RVMEX (*Patientia vulgo* Romice e Lampazzo ortense o Lapato) floribus hermaphroditis : valvulis integerrimis: unica granifera : foliis cordatis . *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 476.
Lapathum hortense, folio oblongo. *C.B.P.* 114.
Lapathum sativum . *Dod. Pempt.* 648.

Fere ubiqüe in cultis habitat . Alvum movet , et est antiscorbuticum .

740. RVMEX (*crispus*) floribus hermaphroditis, valvulis integris, graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis . *Linn. Spec. Plant.* 3. 476.
Rumex floribus hermaproditis, valvulis integerrimis planis , foliis cordatooblongis . *Linn. Hort. Cliff.* 138. *Roy. Lugbd.* 229.
Rumex foliis cordatooblongis acuminatis integris . *Linn. Flor. Lap.* 129.

Lapathum folio acuto crispo. *C. B. P.* 115.

Lapathum acutum crispum. *Tabern. Icon.* 436.

Vivit in locis pinguibus, et humidiusculis.

741. RVMEX (*pulcher vulgo* Romice con li semi dentati) floribus hermaphroditis, valvulis dentatis: subunica granifera, foliis radicalibus panduriformibus. *Linn. Spec. Pl.* 6. *p.* 774.

Rumex floribus hermaphroditis, foliis lyratis. *Guett. Stamp.* 1. *p.* 7.

Lapathum ramis procumbentibus, seminis involucro dentato, foliis inferioribus instar fidium. *Moris. Hist.* 2. *p.* 580.

Lapathum pulchrum Bononiense, sinuatum. *I. B. Hist.* 2. *p.* 988. *Rai Hist.* 174.

Ad Agrum Reatinum juxta Velinum fluvium, et ad vias remotas in ipsa Vrbe Roma multis in locis.

742. RVMEX (*maritimus vulgo* Lampazzo, e Romice acquatico con foglia stretta) floribus hermaphroditis, valvulis dentatis, graniferis, foliis linearibus. *Linn. Flor. Svec.* 2. *n.* 313.

Lapathum aquaticum, Luteolae folio. *Tour. I. R. H.* 504.

Lapathum aquaticum angustissimo acuminato folio. *Bocc. Mus.* 2. *p.* 142. *t.* 104.

Anthoxanthon. *I. B. Hist.* 2. *p.* 987.

Ad Ardeam, et Porciglianum.

743. RVMEX (*divaricatus*, *vulgo* Lampazzo con foglie lunghe biancheggiante) floribus hermaphroditis, valvulis dentatis, graniferis, foliis cordato-oblongis, obtusis, pubescentibus. *Lin. Spec. Pl.* 10. *p.* 478.

Lapathum arvense subhirsutum, folio retuso, caule longius brachiato, capsula seminis crenata. *Till. Pis.* 93. *t.* 37. *f.* 2.

Extra Januam D. Laurentii, et aliis in locis.

744. RVMEX (*acutus*, *vulgo* Romice colle frondi appuntate) floribus hermaproditis, valvulis dentatis graniferis, foliis cordatooblongis acuminatis. *Linn. Hort. Cliff.* 138. *Mat. Med.* 176. *Flor. Svec.* 293. 316. *Roy. Lugbd.* 229.

Lapathum acutum, sive oxylapathum. *I. B. Hist.* 2. *p.* 903. *Lob. Icon.* 284.

Lapathum acutum. *Rai Hist.* 175.

Circa fossas potissimum vivit etc.

745. RVMEX (*obtusifolius vulgo* Romice, e Lampazzo) floribus hermaphroditis, valvulis dentatis, graniferis, foliis cordatooblongis obtusiusculis crenulatis. *Linn. Spec. Plant.* 12. 478.

Lapathum involucro seminis dentato, foliis obtusis, ora crispula. *Haller. Helv.* 172.

Lapathum sylvestre, folio subrotundo, seminis involucris dentatis. *Moris. Hist.* 2. *p.* 580.

Lapathum folio minus acuto. *C. B. P.* 111.

Lapathum vulgare folio obtuso. *I. R. Rai. Hist.* 175.

Lapathum. *Cam. Epit.* 228.

Secus vias remotas passim.

HERMAPHRODITI, VALVVLIS FLORIS GRANO DESTITVTIS

746. RVMEX (*bucephalophorus vulgo* Romice con li frutti dentati e foglie quasi di Basilico) floribus hermaphroditis, valvulis dentatis, nudis, pedicellis planis reflexis. *Lin. Hort. Vpsal.* 90.

Rumex fructibus dentatis, calyce reflexis, caput bovinum referentibus. *Linn. Hort. Cliff.* 139.

Acetosa Ocymi folio, Neapolitana. *C. B. P.* 114.

Acetosa Ocymi folio, bucephalophoros. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 151. *t.* 150.

Ad Pinetum Sacchetti, et multis aliis in locis.

747. RVMEX (*aquaticus vulgo* Romice con foglia grande assai) floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis acutis. *Flor. Svec.* 2. *n.* 315.

Lapathum aquaticum, folio cubitali. *C. B. P.* 116.

Lapathum palustre. *Tabern. Ic.* 437.

Hippolapathum. *Dalech. Hist.* 604. *Cam. Epit.* 232.

Herba Britannica. *Munt. Brit. t.* 1.

Reati in Sabinis juxta fluvium Velinum, ad Pontinas etc.

748. RVMEX (*scutatus vulgo* Acetosa ortense con foglia rotonda) floribus hermaphroditis, foliis cordatohastatis. *Linn. Hort. Cliff.* 138. *Virid. Cliff.* 32. *Roy. Lugbd.* 230.

Acetosa rotundifolia hortensis. *C. B. P.* 114. *Moris. Hist.* 2. *p.* 583. *Se.*5. *t.* 28. *f.* 9.

Lapathum androgynum, acetosum, foliis sagittatis, ramis divergentibus. *Hall. Helv.* 170.

Oxalis rotundifolia. *Dod. Pempt.* 649.

Acetosa scutata repens. *C. B. P.* 114. *(a)*

Non procul a Templo S. Salvatoris majoris in Sabinis. Adstringit, et roborat etc.

FLORIBVS DICLINIS.

749. RVMEX (*Acetosa vulgo* Acetosa pratense con fiore bianco) floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. *Linn. Hort. Cliff.* 130. *Vir. Cliff.* 32. *Roy. Lugbd.* 231.

Acetosa pratensis. *C. B. P.* 14. *(a)*

Acetosa pratensis flore albo. *Tour. I. R. H.* 502. *(b)*

Oxalis crispa (*vulgo* Acetosa con foglia crespa) *I. B. Hist.* 2. *p.* 990. *Tabern. Icon.* 440. (*c*)

Acetosa (*vulgo* Acetosa grande montana) montana maxima . *C. B. P.* 114. *Scheuch. Alp.* 129. (*d*)

Acetosa (*vulgo* Acetosa con foglia d'Aro) lato Ari folio rotundo. *Bocc. Mus.* 165. *t.* 125. (*e*)

Prope Castrum Farnesium. (d) (e) ad montem Januarium . Conveniunt Acetosae omnes in febribus ardentibus, et putridis etc.

750. RVMEX (*Acetosella* , *vulgo* Acetosella lanceolata) floribus dioicis foliis lanceolato-hastatis . *Linn. Hort. Cliff.* 139. *Vir. Cliff.* 32. *Roy. Lugbd.* 231. *Gron. Virg.* 153.

Acetosa arvensis lanceolata *C. B. P.* 114.

Oxalis Ovina . *Tabern. Icon.* 440.

Acetosa (*vulgo* Acetosa strata per terra con foglie strette , e lanceolate) lanceolata , angustifolia , repens . *C. B. P.* 14. *Prodr.* 55. (*a*)

Acetosa (*vulgo* Acetosa minima non lanceolata) arvensis minima , non lanceolata . *C. B. P.* 114. (*b*)

Acetosa (*vulgo* Acetosa minore , dritta, con li lobi tagliati in molte parti) minor , erecta , lobis multifidis . *Bocc. Mus.* 164. *t.* 126. (*c*)

Romae, Vetruclani, et aliis multis in locis arvensibus , et pratiris habitant . Sunt etiam antiscorbuticae Acetosae omnes etc.

TRIGLOCHIN

751. TRIGLOCHIN (*palustre vulgo* Gramiccia Juncea acquatica, e spigata) capsulis trilocularibus, sublinearibus. *Flor. Svec.* 298. 321.

Triglochin fructu tenui. *Roy. Lugbd.* 44. *Hall. Helv.* 258.

Gramen Iunceum, spicatum, sive Triglochin. *C. B. P.* 6. *Theat.* 80.

Calamagrostis IV. *Dalech. Hist.* 1006.

Iuncago maritima, perennis, bulbosa radice. *Mich. Gen.* 44.

Iuncago maritima. *Barr. Rar.* 55. *t.* 271.

Ad Ostia Tiberina, et inundata maritima.

752. TRIGLOCHIN (*maritimum vulgo* Gramiccia spigata con frutto subrotondo) capsulis sexlocularibus ovatis. *Flor. Svec.* 299. 322.

Triglochin fructu subrotundo. *Flor. Lapp.* 135. *Roy. Lugbd.* 45.

Iuncago palustris, et maritima, perennis, fructu breviore, quinquecapsulari. *Mich. Gen.* 44.

Gramen spicatum alternum. *Bauh. P.* 6. *Theat.* 82.

Cum superiori, eisdem in locis.

COLCHICVM

753. COLCHICVM (*autumnale vulgo* Col-

chico volgare) foliis planis, lanceolatis, erectis. *Linn. Hort. Cliff.* 140. *Roy. Lugbd.* 41. *Sauv. Monsp.* 18. 19.

Colchicum commune. *C. B. P.* 67.

Colchicum. *Fuch. Hist.* 356. 357.

Ad pratum D. Pauli extra moenia. etc.

754. COLCHICVM (*montanum vulgo* Colchico montano con foglia stretta) foliis linearibus patentissimis. *Loefl.*

Colchicum montanum angustifolium. *C. B. P.* 68.

Colchicum montanum. *Clus. Hisp.* 266. *t.* 267. *Hist.* 1. *p.* 200.

Folia Autumno una cum flore erumpunt, et habitat prope Criptam Ferratam, et Ariciam in loco vulgo il Capannone, ed il Selvotto. Planta est venefica.

HEXANDRIA POLYGYNIA

ALISMA

755. ALISMA (*Plantago*, *vulgo* Piantagine acquatica) foliis ovatis, acutis, fructibus obtuse trigonis. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 486.

Alisma fructu obtuso trigono. *Linn. Hort. Cliff.* 141. *Gmel. Sib.* 1. *p.* 77.

Plantago aquatica, latifolia. *C. B. P.* 190.

Plantago aquatica. *Cam. Epit.* 264.

Ad aquarum fossas fere ubique.

756. ALISMA (*flava vulgo* Damasonio) fo-

liis ovatis,acutis, pedunculis umbellatis, fructibus globosis. *Linn. Spec. Pl.* 2. *p.* 486.
Damasonium maximum, Plantaginis folio, flore flavescente, fructu globoso. *Plum. Spec.* 7. *Icon.* 115.
Ad Ostia Tiberina.

757. ALISMA (*Damasonium vulgo* Piantagine acquatica stellata) foliis cordato-oblongis, floribus hexagynis, capsulis subulatis. *Linn. Spec. Plant.* 3. *p.* 486.
Alisma fructu sexcorni. *Linn. Hort. Cliff.* 141. *Roy. Lugbd.* 46. *Sauv. Monsp.* 14.
Plantago aquatica stellata. *C. B. P.* 190.
Plantago aquatica, minor,altera. *Lob. Icon.*301.
Damasonium stellatum. *Dalech. Hist.* 1058.
In aquosis, signanter Maccarese. Radix est lithontriptica.

758. ALISMA (*prolifera vulgo* Alisma prolifera) foliis cordatooblongis, floribus octogynis, umbellis proliferis.
In aquosis Pontinarum, et Maccarese etc.

759. ALISMA (*ranunculoides vulgo* Piantagine acquatica di foglia stretta) foliis linearilanceolatis, fructibus globososquarrosis. *Linn. Spec. Plant.* 6. *p.* 487.
Alisma fructu globoso, undique echinato. *Linn. Hort. Cliff.*141.*Roy. Lugbd.*46. *Sauv. Monsp.* 14.

Damasonium angustissimo Plantaginis folio. *Vaill. Act.* 1719. *p.* 35.

Plantago aquatica, humilis, angustifolia. *I.B. Hist.* 3. *p.* 738. *Lob. Icon.* 300.

Ranunculus aquaticus, Plantaginis folio angustissimo. *T. Pet. Gaz.* 41. *t.* 26. *f.* 12.

Multis in locis ad aquarum fossas, sig. ad Pontinas, et Insulam Sacram.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA

HEPTANDRIA MONOGYNIA

TRIENTALIS

760. TRIENTALIS (*Europaea vulgo* Alsine alpina) foliis lanceolatis integerrimis. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 488.

Trientalis. *Roy. Lugbd.* 438. *Hall. Opusc.* 123. *Kalm. It.* 2. *p.* 263.

Alsine alpina. *Swenkf. Siles.* 117.

Pyrola Alsines flore, Europaea. *C. B. P.* 191. *Prodr.* 101.

Ad Samnitarum montes prope Felettinum.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA

OCTANDRIA MONOGYNIA

EPILOBIVM

STAMINIBVS DECLINATIS

761. EPILOBIVM (*angustifolium*) foliis sparsis linearilanceolatis, floribus inaequalibus: *Linn. Spec. Pl.* 1. 493.

Epilobium floribus difformibus, pistillo declinato. *Flor. Svec.* 304. 327.

Epilobium foliis lanceolatis integerrimis. *Linn. Hort. Cliff.* 154. *Roy. Lugbd.* 250.

Lysimachia (*vulgo* Lisimachia Camenerio di foglia stretta) Chamenerion dicta, angustifolia. *C. B. P.* 245. (*a*)

Lysimachia (Lysimachia Camenerio di foglia larga) Chamaenerion dicta, latifolia. *C. B. P.* 245. (*b*)

Lysimachia Chamaenerion dicta, alpina. *C. B. P.* 245. *Prodr.* 116. (*c*)

Ad ripas torrentium fere ubique, et signa. in loco Valle dell' Inferno. (c) ad Carpinetum.

STAMINIBVS ERECTIS REGVLARIBVS PETALIS BIFIDIS.

762. EPILOBIVM (*hirsutum vulgo* Lisima-

chia con fiore grande siliquosa) foliis oppositis lanceolatis, serratis decurrenti - amplexicaulibus. *Linn. Hort. Cliff.* 145. *Roy. Lugbd.* 251. *Gron. Virg.* 154.

Lysimachia siliquosa hirsuta, magno flore. *C. B. P.* 245.

Lysimachia purpurea. *Fuchs. Hist.* 491.

Lysimachia (*vulgo* Lisimachia irsuta con fiore piccolo) siliquosa, hirsuta, parvo flore. *C. B. P.* 245. *Prodr.* 116. (*a*)

Cum praecedenti, uti et ad Pontinas, et Sabatia stagna.

763. EPILOBIVM (*montanum, vulgo* Lisimachia maggiore con fiore rosso, e siliquosa) foliis oppositis ovatis dentatis. *Roy. Lugbd.* 251. *Linn. Hort. Cliff.* 145.

Lysimachia siliquosa, glabra, major. *C. B. P.* 245.

Pseudo-Lysimachium purpureum, primum. *Dod. Pempt.* 85.

Ad Cinque Cammini, extra januam Portuensem etc.

764. EPILOBIVM (*tetragonum vulgo* Lisimachia minore, con frondi liscie, e siliquosa) foliis lanceolatis denticulatis, imis oppositis, caule tetragono. *Sauv. Monsp.* 75.

Lysimachia siliquosa, glabra, minor. *C. B. P.* 303. *Rai Hist.* 801.

Lysimachia minor. *Tabern. Icon.* 854.

Ad Trebulum montem, Erectum, Fajolam, multisque aliis humidiunsculis in locis. Adstringens.

765. EPILOBIVM (*palustre*) foliis oppositis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto. *Linn. Fl. Svec.* 307. 330.

Epilobium foliis linearibus. *Linn. Flor. Lap.* 149. *Roy. Lugbd.* 251.

Lysimachia siliquosa, glabra, angustifolia. *C. B. P.* 245.

Ad Triviae lacum, ad Sabatium, Regillum etc.

VACCINIVM.

766. VACCINIVM (*Myrtillus*) pedunculis unifloris, foliis serratis, ovatis, deciduis, caule angulato. *Linn. Flor. Lap.* 143. *Hort. Cliff.* 148. *Roy. Lugbd.* 239. *Hall. Helv.* 419.

Vitis Idaea, foliis oblongis, crenatis, fructu nigricante. *C. B. P.* 470.

Myrtillus Germanica, et Vitis Idaea. *Dalech. Hist.* 191. 192.

In vertice montis Matereto supra Vissum etc.

ERICA

767. ERICA (*vulgaris vulgo* Erica e Scopa volgare) antheris bicornibus inclusis, corollis inaequalibus campanulatis, mediocribus, foliis oppositis sagittatis. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 501.

Erica foliis quadrifariam imbricatis triquetris glabris erectis, corollis inaequalibus calyce brevioribus. *Roy. Lugbd.* 442. *Linn. Hort. Cliff.* 146.

Erica vulgaris glabra. *C. B. P.* 485.

Ad Casetta Mattei 7. ab Vrbe lapide extra januam Portuensem.

768. ERICA (*Scoparia vulgo* Erica maggiore, e Scopa) antheris bicornibus inclusis, corollis campanulatis longioribus, foliis ternis patentibus, ramis albis. *Linn. Spec. Plant.* 5. *p.* 502.

Erica erecta, foliis ternis, floribus ad alas sessilibus verticillatis. *Sauv. Monsp.* 170.

Erica major Scoparia, foliis deciduis. *C. B. P.* 485.

In alpestribus et sterilibus. Lythontriptica etc.

DAPHNE

FLORIBVS LATERALIBVS

769. DAPHNE (*Mezereum vulgo* Laureola femina) floribus sessilibus ternis caulinis, foliis lanceolatis deciduis. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 509.

Daphne floribus sessilibus infra folia elliptico-lanceolata. *Roy. Lugbd.* 201. *Hort. Cliff.* 147. *Flor. Lapp.* 140.

Laureola folio deciduo, flore purpureo, officinis Laureola femina. *C. B. P.* 462.

Daphnoides . *Cam. Epit.* 937.

In Sylvis, et signanter al Selvotto e alla Fajola. Violentissime purgat, et corrigitur cum mele, ac saccaro.

770. DAPHNE (*Laureola vulgo* Laureola maschio) racemis axillaribus, foliis lanceolato-glabris . *Linn. Spec. Pl.* 6. *p.* 510.

Daphne racemis lateralibus foliis lanceolatis integris . *Hort. Cliff.* 147. *Sauv. Monsp.* 57.

Laureola semper virens, flore viridi, quibusdam Laureola mas . *C. B. P.* 662.

Laureola . *Dod. Pempt.* 365.

In Sylvis, et sign. ad Le Monticelle di sopra, ad Selvotto etc.

771. DAPHNE (*Thymelaea*) floribus sessilibus axillaribus, foliis lanceolatis, caulibus simplicissimis . *Linn. Spec. Plant.* 2. 509.

Daphne floribus tetrandris secundum caules simplicissimos . *Sauv. Monsp.* 56.

Thymelea foliis Polygalae glabris . *C. B. Pin.* 463.

Sanamunda viridis vel glabra . *C. B. P.* 160.

Sanamunda glabra . *I. B. Hist.* 1. *p.* 592.

Ad Ostia Tiberina etc.

FLORIBVS TERMINALIBVS

772. DAPHNE (*Gnidium vulgo* Timelea con foglie di Lino) panicula terminali, foliis lineari-lanceolatis acuminatis . *Linn. Spec. Plant.* 10. *p.* 511.

Daphne foliis lanceolatis, basi angustioribus, racemo nudo terminali. *Sauv. Monsp.* 56.

Daphne floribus racenosis, foliis linearilanceolatis acuminatis integris. *Guett. Stamp.* 2. *p.* 427.

Thymelaea foliis Lini. *C. B. P.* 463.

Thymelaea. *Clus. Hist.* 1. *p.* 87. *Cam. Epit.* 974.

Prope Maccarese, ad Insulam Sacram. etc.

PASSERINA

773. PASSERINA (*hirsuta vulgo* Timelea tomentosa, e Sanamunda) foliis carnosis, extus glabris, caulibus tomentosis. *Linn. Spec. Plant.* 2. *p.* 513.

Thymelaea tomentosa, foliis Sedi minoris. *C. B. P.* 461.

Sanamunda. 3. *Clus. Hist.* 1. *p.* 89.

Breyn. *Cent.* *I.* 19.

Sesamoides parvum Dalechampi. *I. B. Hist.* 1. *p.* 595.

Ad Ostia Tiberina, ad Maccarese etc. Purgans.

OCTANDRIA DIGYNIA

MOEHRINGIA

774. MOEHRINGIA (*muscosa vulgo* Alsine con foglia stretta, e muscosa) *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 515.

Alsine montana, capillaceo folio. *C. B. P.* 251.

Scheuch. Alp. 503. *t.* 6. *Pluk. Alm.* 23. *t.* 75. *f.* 1.

Alsine saxifraga, angustifolia, minima, montana. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 292. *t.* 290.

Alsine tenuifolia, muscosa. *C. B. P.* 251. *Moris. Bles.* 10. *Hist.* 2. *p.* 551. *Se.* 5. *t.* 23. *f.* 12.

Ad montes Ianuarium, et Fiscellum. Frangit lapillos. etc.

OCTANDRIA TRIGYNIA

POLYGONVM

BISTORTA SPICA VNICA

775. POLYGONVM (*Bistorta vulgo* Bistorta maggiore) caule simplicissimo monostachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. *Linn. Spec. Plant.* 2. *p.* 516. *Mat. Med.* 188.

Bistorta foliis ovatooblongis, acuminatis. *Roy. Lugbd.* 217. *Linn. Hort. Cliff.* 150. *Hort. Vpsal.* 95.

Bistorta major, radice magis intorta. *C. B. P.* 192.

Bistorta. *Cam. Epit.* 683.

In montibus Ianuarii, Nursiae, Casciae etc.

776. POLYGONVM (*viviparum vulgo* Bistorta minore) caule simplicissimo, monostachio, foliis lanceolatis. *Linn. Spec. Pl.* 3. *p.* 516.

Bistorta foliis lanceolatis. *Hort. Cliff.* 150. *Flor. Lapp.* 152.

Bistorta montana minor, radice intorta, inodora, flosculis in spicae cacumine albis, sterilibus, inferna spicae parte tuberculis proliferis turbinatis puniceis foecunda. *Amm. Ruth.* 169.

Bistorta alpina media. *C. B. P.* 192.

Bistorta alpina minor. *C. B. P.* 192.

In montibus supradictis, sed potius est rara. Roborat et adstringit. etc.

PERSICARIA PISTILLO BIFIDO

777. POLYGONVM (*lapathifolium vulgo* Persicaria maggiore) floribus pentandris, semidigynis, staminibus corollae regulari aequantibus. *Linn. Spec. Plant.* 5. *p.* 517.

Persicaria floribus pentandris digynis, corolla regulari, staminibus aequali. *Wach. ultr.* 257.

Persicaria florum staminibus quinis semidigynis, stylo bifido, corollae regulari aequantibus. *Hort. Cliff.* 42.

Persicaria major, lapathi foliis, calyce floris purpureo. *Tour. I. R. H.* 510. *Rai. Suppl.* 119.

Persicaria Hydropiper. *Lob. Icon.* 315.

Intra, et extra Vrbem, humidulis in locis. Ad calculum frangendum incomparabilis etc.

778. POLYGONVM (*amphibium vulgo* Potamogeto con foglie di Salcio) floribus pentandris, semidigynis, staminibus corolla longioribus. *Linn. Spec. Pl.* 6. *p.* 517.

Persicaria florum staminibus quinis, corollam superantibus, stylo bifido. *Hort. Cliff.* 41. *Roy. Lugbd.* 216.

Potamogeton salicis folio. *C.B.P.* 193.

Ad ripas Tiberis, sign. ad Renella.

779. POLYGONVM (*Hydropiper, vulgo* Persicaria urente) floribus hexandris, semidigynis, foliis lanceolatis, stipulis submuticis. *Linn. Spec. Plant.* 9. 517.

Polygonum foliis lanceolatis, floribus hexandris semidigynis. *Mat. Med.* 187.

Persicaria floribus hexandris, semidigynis. *Flor. Svec.* 320. 343.

Persicaria florum staminibus senis, stylo bifido. *Roy. Lugbd.* 216. *Linn. Hort. Cliff.* 46.

Persicaria urens, sive Hydropiper. *C.B.P.* 101.

Hydropiper. *Dod. Pempt.* 607.

In humidis, pluribus in locis.

780. POLYGONVM (*Persicaria vulgo* Persicaria non urente) floribus hexandris, spicis ovatooblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis. *Linn. Spec. Plant.* 10. *p.* 518.

Persicaria florum staminibus senis, stylo dupli-

ci. *Roy. Lugbd.* 216. *Gron. Virg.* 157. *Linn. Hort. Cliff.* 42.

Persicaria mitis. *I. B. Hist.* 3. *p.* 779. *Flor. Lapp.* 71.

Persicaria mitis, maculosa, et non maculosa. *C. B. P.* 101. *(a)*

Persicaria angustifolia. *C. B. P.* 101. *Prodr.* 43.

Persicaria foliis angustissimis, pene glabris, spinis interruptis rarissimis, vaginis ciliaribus. *Hall. Helv.* 181. *Gaett.* 28.

In incultis, et humidiusculis. Detergens, depurans etc.

POLYGONVM, FOLIIS INDIVISIS, FLORIBVS OCTANDRIS.

781. POLYGONVM (*maritimum vulgo* Poligono di foglia larga, marittimo) floribus octandris trigynis axillaribus, foliis ovali-lanceolatis semper virentibus, caule suffrutescente. *Linn. Spec. Pl.* 14 *p.* 519.

Polygonum maritimum latifolium. *C.B.P.* 281.

Polygonum maritimum. *Cam. Epit.* 691.

Ad litora nostri maris Tyrrheni. Adstringens etc.

782. POLYGONVM (*auriculare vulgo* Poligono, e Centinodia con foglia piccola) floribus octandris, trigynis, axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo. *Linn. Spec. Pl.* 15. *p* 519.

Polygonum caule procumbente herbaceo, fo-

liis lanceolatis integerrimis . *Mat. Med.* 186.

Polygonum . *Linn. Hort. Cliff.* 150. *Roy. Lugbd.* 215 *Gron. Virg.* 44. *Hall. Helv.* 182.

Polygonum latifolium . *C. B. P.* 281.

Polygonum brevi , angustoque folio . *C. B. P.* 281. *(a)*

Polygonum oblongo , angusto folio . *C. B. P.* 281. *(b)*

Polygonum (*vulgo* Poligono , e Centinodia con calici porporascenti) calycibus purpurascentibus . *Dill. App.* 65. *(c)*

Polygonum erectum , humile , foliis orbum . *Dill. App.* 65. *(d)*

Ad campos cultos , et incultos , et etiam per vias intra , et extra Vrbem remotas . Corroborans, et adstringens etc.

783. POLYGONVM (*Fagopyrum*) foliis cordatosagittatis , caule erectiusculo inermi , seminum angulis aequalibus . *Linn. Spec. Plant.* 24. 522.

Polygonum caule erectiusculo inermi ramoso , foliis cordatosagittatis , seminibus laevibus . *Mat Med.* 188.

Helxine caule erectiusculo inermi , foliis cordatosagittatis , seminibus integerrimis . *Hort. Vpsal.* 96.

Helxine caule rectiusculo inermi, foliis cordato

sagittatis. *Hort. Cliff.* 151. *Roy. Lugbd.* 217. *Flor. Svec.* 324. 345.

Erysimum cereale, folio hederaceo. *C.B.P.* 27

Ocymum cereale. *Tabern. Hist.* 276.

Ad campos multis in locis etc.

784. POLYGONVM (*Convolvulus vulgo* Poligono con seme triangolare) foliis cordatis, caule volubili, floribus planiusculis. *Linn. Spec. Pl.* 25. *p.* 522.

Helxine caule volubili. *Roy. Lugbd.* 217. *Linn. Hort. Cliff.* 150. *Gron. Virg.* 157.

Convolvulus minor, semine triangulo. *C. B. P.* 295.

Convolvulum nigrum. *Dod. Pempt.* 396.

In aliquibus sepibus, et campis extra Januam Trigeminam, vulgo Divi Pauli.

785. POLYGONVM (*scandens vulgo* Frumento Saracenico con seme nero, *et etiam Riz.* Fagopiro Americano) foliis cordatis, caule erecto scandente, petiolis basi subtus poro pertusis. *Linn. Spec. Pl.* 27. *p.* 522.

Fagopyrum scandens, Americanum, maximum. *Tour. I. R. H.* 511.

Fagopyrum scandens, caule rubente, semine nigro. *Gron. Virg.* 44.

Fagotriticum volubile, majus, Virginianum. *Pluk. Alm.* 143. *t.* 177. *f.* 7.

Habitat in loco vulgo la Castagnola.

786. POLYGONVM (*dumetorum vulgo* Fiumento Saracenico con semi alati, e Fagopiro salvatico) foliis cordatis, caule volubili, laevi, floribus carinato-alatis. *Linn. Spec. Pl.* 26. *p.* 522.

Fagopyrum praelongum dumetorum, seminibus alatis duplici more dispositis. *Dill. App.* 60.

Fagopyrum scandens altissimum dumetorum, seminibus tribus alis pellucidis. *Rupp. Jen.* 99. *Hall. Helv.* 173.

Fagopyrum sylvaticum scandens flore foliaceo. *Ponth. Anth.* 265.

Fagopyrum majus, scandens. *Vaill. Paris.* 52.

Ad Silvam Fajola etc. Semina dant farinam bonam ad nutritionem etc.

OCTANDRIA TETRAGYNIA

PARIS

787. PARIS (*quadrifolia*, *vulgo* Erba Paris) foliis quaternis. *Roy. Lugbd.* 461. *Hall. Helv.* 412. *Linn. Hort. Cliff.* 153.

Solanum quadrifolium bacciferum. *C.B.P.* 167.

Aconitum salutiferum. *Tab. His.* 120.

Ad montem Januarium, et Nursiam. In tumoribus calidis etc.

ADOXA

788. ADOXA (*Moscatellina vulgo* Ranunculo bulboso, chiamato Moscatellino) *Linn. Hort. Cliff.* 152. *Roy. Lugbd.* 252.

Moscatella. *Cord. Hist.* 172.

Ranunculus nemorosus Moscatellina dictus. *C. B. P.* 178.

Fumaria bulbosa, sive tuberosa minima. *Tabern. Icon.* 39.

Ad Selvotto, Fajola etc. Radix resolvens, et detergens etc.

E L A T I N E

789. ELATINE (*Hydropiper, vulgo* Alsinastro con foglie di Serpollo) foliis oppositis. *Roy. Lugbd.* 452. *Gron. Virg.* 158. *Linn. Flor. Lapp.* 156.

Hydropiper. *Buxb. Cent.* 3. *p.* 35. *t.* 37. *f.* 3.

Alsinastrum serpillifolium, flore albo tetrapetalo. *Vaill. Par.* 5. *t.* 2. *f.* 2.

In fossis, et ad aquas stagnantes etc.

790. ELATINA (*alsinastrum*) foliis verticillatis. *Roy. Lugbd.* 452. *Sauv. Monsp.* 164. *Linn. Flor. Svec.* 2. *n.* 349.

Alsinastrnm (*vulgo* Alsinastro con foglie di Gallio) Galii folio. *Vaill. Paris.* 6. *t.* 1. *f.* 6. (*a*)

Alsinastrum (con foglie di Graziola) Gratiolae folio. *Tour. I. R. H.* 244. *Rai Suppl.* 502. (*b*)

Ubi stagnant aquae, et in fossis, et sign. ad Acquatraversa, et Campo morto.

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA

ENNEANDRIA MONOGYNIA

LAVRVS

791. LAVRVS (*nobilis*, *vulgo* Lauro volgare e Alloro) foliis venosis, lanceolatis, perennantibus, floribus quadrifidis dioicis. *Linn. Hort. Cliff.* 155. *Roy. Lugbd.* 98.
Laurus vulgaris. *C. B. P.* 460.
Laurus. *Cam. Epit.* 60.

Multis in locis felicissime vivit, et perennat. Incidit, et roborat etc.

ENNEANDRIA HEXAGYNIA

BVTOMVS

792. BVTOMVS (*umbellatus*, *vulgo* Giunco florido) *Flor. Lapp.* 159. *Flor. Svec.* 328. 350. *Roy. Lugbd.* 45. *Hall. Helv.* 298.
Iuncus floridus major. *C. B. P.* 112.
Sedo affinis Iuncoides umbellata palustris. *Moris. Hist.* 3. *p.* 468. *Se.* 12. *t.* 5. *f.* 1.
Gladiolus aquatilis. *Dod. Pempt.* 600.

Ad aquam vulgo Transversam etc. Refrigerat, et resolvit etc.

CLASSIS X.

DECANDRIA

DECANDRIA MONOGYNIA

ANAGYRIS

793. ANAGYRIS (*foetida vulgo* Anagiri fetida). *Clus. Hist.* 1. *p.* 93.

Anagyris floribus lateralibus. *Roy. Lugbd.* 371.

Anagyris foetida. *C. B. P.* 391.

Ad nonnullos sylvosos montes uti ad Selvottum, ad Fajola, ad montem Trebulum. In passione hysterica etc.

CERCIS

794. CERCIS (*Siliquastrum vulgo* Siliquastro, e Arbore di Giuda) foliis cordato-orbiculatis, glabris. *Hort. Cliff.* 156. *Roy. Lugbd.* 463. *Gronov. Orient.* 131.

Siliqua Sylvestris rotundifolia. *C. B. P.* 402.

Arbor Iudae. *Dod. Pempt* 786.

In nemoribus nonnullis: etiam in sylvetis viridariorum Romae.

DICTAMNVS

795. DICTAMNVS (*albus vulgo* Frassinella, e Dittamo bianco) *Linn. Hort. Cliff.* 161. *Roy. Lugbd.* 463. *Sauv. Monsp.* 232.

Dictamnus albus vulgo Fraxinella. *C.B.P.* 222.

Fraxinella. *Reneal. Spec.* 122. *t.* 121.

Ad Ianuarium montem, ad montem Leonem, Casciam etc. Alexipharmaca, anthelminthica etc.

R V T A

796. RVTA (*graveolens vulgo* Ruta salvatica) foliis decompositis, petalis laceris, floribus lateralibus quadrifidis. *Hort. Cliff.* 145. *Roy. Lugbd.* 461.

Ruta sylvestris major. *C. B. P.* 336. *Moris. Hist.* 2. *p.* 507. *Se.* 5. *t.* 14. *f.* 3.

Ruta (*vulgo* Ruta ortense con foglie strette.) Chalepensis tenuifolia, florum petalis villis scatentibus. *Moris. Hist.* 2. *p.* 509. (*a*)

Ruta hortensis altera. *C. B. P.* 336. *Rai. Hist.* 874.

Ruta (*vulgo* Ruta ortense con foglie larghe.) hortensis latifolia. *C. B. P.* 336. (*b*)

Ruta graveolens hortensis. *Dod. Pempt.* 119.

In locis sterilibus et saxosis. (a) et (b) seritur in hortis. Alexipharmaca, anthysterica, antispasmodica etc.

T R I B V L V S

797. TRIBVLVS (*terrestris vulgo* Tribolo terrestre) foliolis sexjugatis, subaequalibus, seminibus quadricornibus. *Hort. Cliff.* 160. *Roy. Lugbd.* 460. *Sauv. Monsp.* 227.

Tribulus terrestris, Ciceris folio, fructu aculeato. *C. B. P.* 250.

Tribulus terrestris. *Lob. Icon.* 2. *p.* 84.

Vivit secus vias. Refrigerans, et adstringens.

ARBVTVS

798. ARBVTVS (*Vnedo vulgo* Cerasa marina maggiore, e Arbuto) caule arboreo, foliis glabris serratis, baccis polyspermis. *Linn. Hort. Cliff.* 163. *Roy. Lugbd.* 440. *Sauv. Monsp.* 59. *Gron. Orient.* 137.

Arbutus folio serrato. *C. B. P.* 460. *Mill. Dict. t.* 48. *f.* 1. 2.

Arbutus. *Cam. Epit.* 168.

In sylvis frequens.

799. ARBVTVS (*Andrachne vulgo* Cerasa marina minore) caule arboreo, foliis glabris integerrimis, baccis polyspermis. *Linn. Spec. Plant.* 2. *p.* 566.

Arbutus folio non serrato. *C. B. P.* 460.

Andrachne Theophrasti. *Clus. Hist.* 1. *p.* 48.

Arbutus fructu turbinato, folio non serrato. *Tourn. I. R. H.* 598.

Arbutus oblongo, et acuto fructu. *Barr. Icon.*

Vivit ad tumbuleta, nempe sylvas maris Mediterranei. Adstringens.

DECANDRIA DIGYNIA

CHRYSOPLENIVM

800. CHRYSOPLENIVM (*oppositifolium*) foliis oppositis. *Sauv. Monsp.* 128.

Chrysoplenium foliis amplioribus auriculatis. *Tour. I. R. H.* 146.

Chrysoplenium vel Saxifraga aurea. *Tabern. Hist.* 1224.

Saxifraga aurea. *Dod. Pempt.* 316. *Lob. Hist.* 336. *Ic.* 312.

Saxifraga rotundifolia, aurea. *C. B. P.* 309.

Saxifraga Romanorum. *Dalech. Hist.* 1114.

Sedum palustre luteum, foliis subrotundis sessilibus. *Moris. Hist.* 3. *p.* 477. *S.* 12. *t.* 8. *f.* 7.

Alchimilla rotundifolia aurea hirsuta. *Herm. Lugbd.* 14.

In humidiusculis, et umbrosis locis vivit etc. Lithontripticam vim possidet, et diureticam.

SAXIFRAGA

FOLIIS INDIVISIS, CAVLE SVBNVDO

801. SAXIFRAGA (*Cotyledon vulgo* Semprevivo con foglie lunghe al margine bianche) foliis radicatis, aggregatis, lingulatis, cartilagineo-serratis, caule paniculato. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 570.

Saxifraga foliorum marginibus cartilagine crenatis. *Roy. Lugbd.* 453. *Linn. Hort. Cliff.* 168.

Saxifraga foliis radicalibus in orbem positis: serraturis cartilagineis. *Flor. Lap.* 177. *t.* 2. *f.* 2.

Sanicula montana, crenata, folio longiore, pediculo folioso. *Pluk. Almag.* 331. *t.* 222. *f.* 1.

Sedum serratum, album, bicorne, marginibus

argenteis. *Moris. Hist.* 3. *p.* 478. *Se.* 12. *t.* 9. *f.* 19. 20.

Cotyledon media, foliis oblongis, serratis. *C. B. P.* 285.

Cotyledon (*vulgo* Semprevivo minore con foglie subrotunde fatte a sega) minor, foliis subrotundis serratis. *C. B. P.* 285. *Prodr.* 133. (*a*)

Saxifraga sedifolia, flore albo, multiflora. *Tour. I. R. H.* 252. (*b*)

Sedum serratum, flore albo, multiflorum. *Dod. Pempt.* 113.

In montibus S. Poli, Nursiae et Ianuarii etc.

802. SAXIFRAGA (*Geum*) foliis reniformibus dentatis, caule nudo paniculato. *Linn. Sp. Pl.* 17. 574.

Sanicula montana rotundifolia minor. *C. B. P.* 243.

Sedum montanum rotundifolium minus album non guttatum. *Moris Hist.* 3. *p.* 478. *S.* 12. *t.* 9. *f.* 12.

Ad montes Sevetum, Lucretilem, et ad Tretinas rupes.

FOLIIS INDIVISIS, CAVLE FOLIOSO

803. SAXIFRAGA (*autumnalis vulgo* Semprevivo Alpino con fiori gialli macchiati) foliis caulinis linearibus alternis, ciliatis ra-

dicalibus aggregatis. *Linn. Spec. Plant.* 20. *p.* 575.

Saxifraga foliorum margine ciliari, floribus luteis, maculosis. *Hall. Helv.* 399.

Saxifraga angustifolia autumnalis, flore luteo guttato, foliis florum magis acuminatis. *Brey. Cent.* 106. *t.* 48.

Sedum alpinum floribus luteis maculosis. *C. B. P.* 284.

Sedum angustifolium autumnale flore luteo guttato. *Moris. Hist.* 3. *p.*477. *Se.* 12. *t.*8. *f.*6.

In humentibus montis Muscae, et in montibus Spoletinis.

FOLIIS LOBATIS, CAVLE ERECTO

804. SAXIFRAGA (*granulata vulgo* Sassifragia con foglie tonde, e radice granellosa) foliis caulinis reniformibus, lobatis, caule ramoso, radice granulata. *Hort. Cliff.* 167. *Roy. Lugbd.* 453. *Hall. Helv.* 401.

Saxifraga rotundifolia alba. *C.B.P.* 309.

Saxifraga alba. *Dod. Pempt.* 316.

Saxifraga. IV. *Cam.Epit.* 719.

In monte Januario, herbosis etc.

805. SAXIFRAGA (*tridactylites vulgo* Semprevivo con foglie tridentate) foliis caulinis cuneiformibus trifidis, alternis, caule erecto, ramoso. *Linn. Spec. Plant.* 32. *p.*578.

Saxifraga foliis trifidis basi angustatis, caule ere-

cto. *Roy. Lugbd.* 457. *Sauv. Monsp.* 208.

Saxifraga foliis omnibus trilobis, basi angustis, caule erecto. *Hort. Cliff.* 168. *Flor. Lap.* 173.

Sedum tridactylites tectorum. *C. B. P.* 285.

Paronychia altera. *Dod. Pempt.* 113.

Intra, et extra ipsam Vrbem multis in locis remotis

GYPSOPHILA

806. GYPSOPHILA (*perfoliata, vulgo* Saponaria con foglie lanciate (foliis ovato-lanceolatis, semiamplexicaulibus. *Linn. Spec. Plant.* 9. 583.

Saponaria foliis lanceolatis, calycibus campanulatis. *Hort. Cliff.* 165.

Spergula multiflora, foliis inferioribus Saponariae, superioribus Behen similibus. *Dill. Elth.* 368. *t.* 276. *f.* 357.

Ad Sermonetam habitabat anno 1759.

SAPONARIA

807. SAPONARIA (*officinalis vulgo* Saponaria volgare) calycibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis. *Hort. Cliff.* 165. *Roy. Lugbd.* 414. *Gron. Virg.* 160. *Gort. Gelr.* 245.

Saponaria major laevis. *C. B. P.* 206.

Saponaria vulgaris. *Cam. Epit.* 152.

Multis in locis intra, et extra Vrbem. Detergens, et resolvens etc.

808. SAPONARIA (*Vaccaria vulgo* Vaccaria)

calycibus pyramidatis quinquangularibus, foliis ovatis acuminatis sessilibus. *Hort. Cliff.* 166. *Hort. Vpsal.* 107. *Roy. Lugbd.* 443. *Guett. Stamp.* 287. *Sauv. Monspel.* 153.

Lychnis segetum rubra, foliis perfoliatis. *C. B. P.* 204.

Vaccaria. *Dod. Pempt.* 104.

Inter segetes. Diuretica, et sudorifera.

809. SAPONARIA (*Ocymoides*, *vulgo* Licnide Ocimoide) calycibus cylindricis villosis, caulibus dichotomis procumbentibus. *Linn. Spec. Pl.* 4. *p.* 585.

Saponaria minor quibusdam. *I. B. Hist.* 3. *p.* 344.

Lychnis, vel Ocymoides repens montanum. *C. B. P.* 206.

In montanis umbrosis, ad rupes Triviae.

DIANTHVS

FLORES AGGREGATI

810. DIANTHVS (*barbatus*, *vulgo* Garofolo con folia larga, barbato) floribus aggregatis fasciculatis, squamis calycinis ovato-subulatis tubum aequantibus, foliis lanceolatis. *Hort. Cliff.* 155. *Roy. Lugbd.* 444. *Sauv. Monsp.* 144.

Caryophyllus hortensis, barbatus, latifolius. *C. B P.* 208.

Thyrsis. *Reneal. Spec.* 47.

Caryophyllus (*vulgo* Garofalo barbato con foglia stretta) barbatus hortensis , angustifolius . *C. B. P.* 209. *(a)*

Armerius flos alter *Dod. Pempt.* 176.

Ad colles apricos . Cephalici et cordiales etc.

811. DIANTHVS (*Carthusianorum vulgo* Garofali con fiori a mazzetti) floribus subaggregatis , squamis calycinis ovatis aristatis , tubum subaequantibus , foliis linearibus , trinervis . *Hort. Vpsal.* 105.

Dianthus floribus aggregatis, squamis calycinis lanceolatis , corollis crenatis . *Guett. Stamp.* 284.

Caryophyllus sylvestris vulgaris , latifolius . *C. B. P.* 209.

Caryophyllus arvensis , calyculo florum numeroso . *Loes. Pruss.* 37. *f.* 7.

Caryophyllus sylvestris , flore rubro plurimo de summo caule prodeunte . *Segu. Ver.* 434. *t.* 8. *f.* 2.

Ad montem Albanum , Fiscellum , Januarium etc.

812. DIANTHVS (*Armeria vulgo*, Armerio) floribus aggregatis fasciculatis,squamis calycinis lanceolatis, villosis, tubum aequantibus. *Hort. Cliff.* 165. *Flor. Svec.* 245. 381. *Roy. Lugbd.* 443. *Sauv. Monsp.* 144.

Caryophyllus barbatus sylvestris . *C. B. P.* 208.

Armeria sylvestris altera. *Lob. Icon.* 448.
Ad montem Marium, et alibi.

813. DIANTHVS (*prolifer vulgo* Garofalo salvatico prolifero) floribus aggregatis capitatis, squamis calycinis ovatis obtusis, muticis, tubum superantibus. *Linn. Spec. Plant.* 4. *p.* 587.

Dianthus floribus aggregatis, capitulo magno, squamvis calycinis ovatis obtusis, magnis. *Hort. Vpsal.* 106. *Sauv. Monsp.* 144.

Caryophyllus sylvestris prolifer. *C. B. P.* 209. *Segu. Veron.* 26. *t.* 7. *f.* 1.

Caryophyllus sylvestris annuus, multis capsulis simul junctis donatus. *Moris. Hist.* 2 *p.* 563.
Ad Collem Marii, et in pascuis sterilibus.

FLORES SOLITARII

814. DIANTHVS (*Caryophyllus vulgo* Garofalo semplice con fiore grande) floribus solitariis, squamis calycinis subovatis brevissimis, corollis crenatis. *Hort. Cliff.* 104. *Roy Lugbd.* 443. *Sauv. Mons. p.* 143.

Caryophyllus (*Coronarius*) hortensis simplex, flore majore. *C. B. P.* 208. (*a*)

Caryophyllus (*vulgo* Garofalo maggiore) altilis, major. *C. B. P.* 207. (*b*)

Caryophyllus flore semipleno ex squamis calycinis longissime imbricatis. *Hort. Cliff. l. c.* (*c*)

Tunica angustifolia, procumbens, petalis serratis. *Hal. Helv.* 382. *(d)*

Caryophyllus sylvestris, flore rubro inodoro, calyce oblongo cum brevibus unguibus. *Seg. Veron.* 435. *t.*7. *f.*3.

Ad montes Januarium, Fiscellum, Fajolae etc. Sunt cordiales; et cephalici flores Caryophyllorum.

815. DIANTHVS (*superbus vulgo* Garofolo salvatico odoroso) floribus paniculatis, squamis calycinis brevibus acuminatis, corollis multifido-capillaribus, caule erecto. *Linn. Amoen. Ac.* 4. *p.* 272. *Flor. Svec.* 2. *p.* 383.

Caryophyllus simplex alter, flore laciniato odoratissimo *C. B. P.* 210.

Caryophyllus sylvestris. VI. *Clus. Hist.* 1. *p.* 284.

Ad Carpinetum etc. Colitur in fictilibus.

CAVLE VNIFLORO.

816. DIANTHVS (*arenarius*) caule simplici unifloro. *Monnier. Obs.* 152.

Caryophyllus sylvestris humilis, flore unico. *C. B. P.* 209.

Caryophyllus sylvestris. *Clus. Hist.* 1. *p.* 281. *Dill. Elth.* 402.

Armerius flos tertius. *Dod. Pempt.* 176.

Ad montes Januarium, Leonem etc. cum multis aliis varietatibus.

DECANDRIA TRIGYNIA

CVCVBALVS

817. CVCVBALVS (*bacciferus vulgo* Cucubalo) calycibus campanulatis, petalis distantibus, pericarpiis coloratis, ramis divaricatis. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 591.

Cucubalus caule ramoso, floribus trigynis, fructu colorato globoso. *Hort. Cliff.* 170. *Roy. Lugbd.* 448. *Sauv. Monsp.* 152.

Alsine scandens, baccifera. *C.B.P.* 250.

Alsine repens. *Dod. Pempt.* 403.

Ad sepes, et nemora multis in locis. Emolliens etc.

818. CVCVBALVS (*Behen*, *vulgo* Licnide, e Behen bianco delle Spezierie) calycibus subglobosis, glabris, reticulato-venosis, capsulis trilocularibus, corollis subnudis. *Flor. Svec.* 360. 385.

Cucubalus floribus trigynis, calycibus glabris, capsulis trilocularibus. *Hort. Cliff.* 176. *Roy. Lugbd.* 448.

Cucubalus calycibus ovatis, hermaphroditis. *Flor. Lapp.* 180.

Lychnis sylvestris, quae Behen album vulgo. *C. B. P.* 205.

Papaver spumeum. *Lob. Icon.* 340.

In collibus, et campis siccis, uti etiam ad collem Marii, ad Pinetum Sacchetti, et ad Aquam Transversam. Detergens.

819. CVCVBALVS (*catholicus*) petalis bipartitis, staminibus longis, foliis lanceatoovatis. *Linn. Hort. Vpsal.* 111.

Silene foliis ovatis utrinque acutis, caule paniculato, floribus nutantibus tenuissimis. *Roy. Lugbd.* 447.

Lychnis viscosa altissima flore muscoso, Ocymastri facie. *Cupan. Cath.* 110.

Ad Saccaratam, collem Marii, Aquam Transversam etc.

820. CVCVBALVS (*mollissimus vulgo* Licnide marittima con foglie polpute, ed impolverate) petalis semi bifidis, panicula brachiata dichotoma, caule foliisque holosericeis, radicalibus spatulatis. *Linn. Spec. Pl.* 11. *p.* 593.

Lychnis maritima pulverulenta, folio carnoso. *Tour. I. R. H.* 338.

Ad montem Circellum, et ad Vocem Viridem.

S I L E N E

FLORIBVS LATERALIBVS SOLITARIIS

821. SILENE (*Anglica vulgo* Licnide irsuta con fiore bianco piccolo) hirsuta, petalis integerrimis, floribus erectis, fructibus reflexis, pedunculatis, alternis. *Hort. Vpsal.* 113.

Viscago Cerasti foliis, vasculis pendulis, Anglica. *Dill. Elth.* 417. *t.* 309. *f.* 398.

Lychnis sylvestris, hirsuta, annua, flore minore albo. *Vaill. Paris.* 121. *t.* 16. *f.* 12.

Ad Amasenum.

822. SILENE (*Gallica vulgo* Licnide con fiore piccolo colore di carne) floribus subspicatis, alternis secundis, petalis indivisis, fructibus erectis. *Linn. Spec. Pl.* 5. *p.*595.

Silene hirsuta, foliis sessilibus, oblongo-cuneiformibus, obtusis, calycibus striatis, fructibus erectis alternis. *Dalibard. Paris.* 129.

Lychnis sylvestris hirsuta, annua, flore minore carneo. *Vaill. Paris.* 121. *t.* 16. *f.* 12.

Viscago hirta, Gallica, flore parvo carneo, petalis integris. *Dill. Elth.* 419. *t.*310. *f.*399.

Ad sylvam vulgo la Fajola etc.

FLORIBVS LATERALIBVS CONFERTIS

823. SILENE (*nutans*) petalis bifidis, floribus lateralibus secundis cernuis, panicula nutante. *Linn. Sp. Plant.* 8. 596.

Silene foliis lanceolatis, caule paniculato, floribus nutantibus, calyce striato, corolla involuta. *Linn. Hort. Cliff.* 171. *Flor. Svec.* 366. 588.

Lychnis montana viscosa alba latifolia. *C. B. P.* 205.

Ad prata arida etc,

824. SILENE (*amoena vulgo* Licnide marit-

tima strata per terra) petalis bifidis, coronula subcoadunata, floribus secundis, pedunculis oppositis trifloris, ramis alternis. *Linn. Spec. Pl.* 9. *p.* 596.

Silene petalis bifidis coronatis, corolla coadunata, calycibus erectis, raris, pilosis. *Hort. Vpsal.* 114.

Lychnis maritima repens. *C. B. P.* 205.

Lychnis maritima Anglicana. *I. B. Hist.* 3. *p.* 357.

Lychnis perennis angustifolia, marina, Anglica, procumbens. *Moris. Hist.* 2. *p.* 535. *Se.* 5. *t.* 20. *f.* 2.

Ad litus nostri Maris Tyrrheni, et signanter non procul a Turre Vajanica.

FLORIBVS EX DICHOTOMIA CAVLIS

825. SILENE (*conoidea vulgo* Licnide con foglia larga e calici gonfi, e solcati) calycibus fructus globosis acuminatis, striis triginta, foliis glabris, petalis integris. *Hort. Vpsal.* 110. *Sauv. Monsp.* 146.

Cucubalus calycibus conicis, striatis. *Hort. Cliff.* 171. *Roy. Lugbd.* 448.

Lychnis Sylvestris latifolia, calycibus turgidis, striatis. *C. B. P.* 205.

Lychnis Sylvestris. 2. *Clus. Hist.* 1. *p.* 288.

Inter segetes etc.

826. SILENE (*Cretica*) erecta, laevis, calycibus erectis decangulis sulcatis, petalis bifidis. *Linn. Hort. Vpsal.* 112.

Viscago foliis inferioribus Bellidis, superioribus Tunicae, calice strictiore, et turgidiore. *Dill. Elth.* 422. *t.* 314. *f.* 404. 405.

Lychnis viscosa, foliis inferioribus Bellidi similibus, flore minimo, carneo, sive rubro. *Magn. Hort.* 126.

Ad montem Leonem, Selvotto etc.

827. SILENE (*quadrifida*) petalis quadrilobis, caule dichotomo, floribus pedunculatis, foliis glabris recurvis. *Leys. Hal.* 383.

Cucubalus quadrifidus. *Sp. Plant.* 1. *p.* 415.

Lychnis alpina, foliis angustis reflexis, petalis quadripartitis. *Segu. Veron.* 3. *p.* 186. *t.* 5. *f.* 1.

Lychnis saxatilis, Linariae folio, glabra, flore albo, petalis tricuspidatis, semine limbofimbriato. *Till. Pis.* 106.

Lychnis viscosa, angustifolia, major. *C.B.P*205.

Lychnis Sylvestris X. *Clus. Hist.* 1. *p.* 291.

In umbrosis montium locis habitat.

828. SILENE (*saxifraga*) caulibus unifloris, pedunculis longitudine caulis, foliis glabris, floribus hermaphroditis, femineisque. *Linn. Spec. Plant.* 32. 602.

Caryophyllus saxifragus. *C. B. P.* 211.

Saxifraga antiquorum, quibusdam. *I. B. Hist.* 3. *p.* 338.

Lychnis minor saxifraga. *Segu. Veron.* 431. *t.* 6. *f.* 11.

In jugo montis Ianuarii etc.

STELLARIA

829. STELLARIA (*nemorum*) foliis cordatis, petiolatis, panicula pedunculis ramosis. *Linn. Flor. Svec.* 2. *n.* 391.

Alsine altissima nemorum. *C. B. P.* 250.

Alsine montana hederacea, maxima. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 289. *t.* 290.

Alsine montana, latifolia, flore laciniato. *C. B. P.* 250. *Rupp. Ien.* 109.

In nemoribus humidiusculis etc.

830. STELLARIA (*holostea*) foliis lanceolatis, serrulatis, petalis bifidis. *Linn. Sp. Pl.* 4. 603.

Alsine foliis lanceolatis. *Hort. Cliff.* 172. *Flor. Svec.* 371. 392.

Caryophyllus holosteus, arvensis, flore majore. *C. B. P.* 210.

Gramen. *Fuchs. Hist.* 136.

Ad nonnulla nemora etc.

831. STELLARIA (*graminea*) foliis lineari-

bus integerrimis, floribus paniculatis. *Linn. Sp. Plant.* 5. 604.

Alsine foliis linearibus. *Flor. Lap.* 189. 393. *Flor. Svec.* 372. *Hort. Cliff.* 172. *Roy. Lugbd.* 449.

Caryophyllus arvensis, glaber, flore minore. *C. B. P.* 210.

Gramen floridum, minus. *Taber. Icon.* 232.

In maceris, et siccis habitat.

ARENARIA

832. ARENARIA (*serpillifolia vulgo* Alsine minore, abbondante di gambi, e fiori, e foglie di Serpollo) foliis subovatis, acutis, sessilibus, corollis calyce brevioribus. *Linn. Flor. Svec.* 273. 398. *Hort. Cliff.* 273. *Roy. Lugbd.* 451.

Alsine minor multicaulis. *C. B. P.* 250.

Alsine minor. *Fuchs. Hist.* 23. *Icon. optima.*

Alsine minima. *I. B. Hist.* 3. 364. *Dod. Pempt.* 30.

Copiose in aggeribus glareosis, et in hortis etc.

833. ARENARIA (*montana vulgo* Alsine con foglie sottili strata per terra) foliis lanceolato-linearibus, scabris, caulibus sterilibus longissimis procumbentibus. *Amoen. Acad.* 4. *p.* 272.

Alsine foliis linearibus acuminatis, petalis flo-

rum integris, calyce duplo longioribus. *Mon. Ops.* 127.

Ad montem Albanum, et Sorat. Antiscorbutica, et aperiens etc.

834. ARENARIA (*rubra vulgo* Alsine minore, o sia Spergula minore con fiori turchini) foliis filiformibus, stipulis membranaceis vaginantibus. *Flor. Spec.* 376. 399.

Alsine (*campestris*) Spergulae facie, minor, sub-caeruleo flore. *C.B.P.*251. *Prodr.*119. *(a)*

Polygonum foliis gramineis, Spergulae capitulis. *Loes. Pruss.* 203. *t.* 63.

Arenaria (*marina vulgo* Arenaria con foglie sottili) foliis linearibus, longitudine internodiorum. *Hort. Cliff.* 173. *Gron. Virg.* 161. *Roy. Lugbd.* 451. *(b)*

Spergula marina nostra. *Rai. Hist.* 1034.

Alsine spergulae facie, media. *C. B. P.* 251.

In collibus arenosis. (a) vivit, sed (b) ad litus Maris mediterranei.

835. ARENARIA (*tenuifolia vulgo* Alsine con foglie sottili) foliis subulatis, aule paniculato, pedunculis simplicibus, capsulis erectis, petalis calyce brevioribus. *Linn. Spec. Pl.* 12. *p.* 607.

Arenaria foliis subulatis, calycinis laciniis membrana ipsis angustiore auctis, acutissimis. *Guett. Stamp.* 2. *p.* 282.

Alsine tenuifolia. *C. B. P.* 3. *p.* 364. *Vaill. Paris.* 7. *t.* 3. *f.* 1. *Segu. Ver.* 418. *t.* 6. *f.* 2.

In locis multis glareosis, in parietinis, et aridis etc.

836. ARENARIA (*ciliata*, *vulgo* Alsine con foglie di serpello) foliis ovatis, ciliatis, acutis. *Linn. Spec. Pl.* 15. *p.* 608.

Alsine serpylli folio, multicaulis, et multiflora. *Segu. Ver.* 1. *p.* 421. *t.* 5. *f.* 2.

In montanis pluribus in locis, et signanter in clivo montis Janiculi etc.

DECANDRIA PENTAGYNIA

COTYLEDON

837. COTYLEDON (*Vmbilicus Veneris, vulgo* Cotyledon, et Vmbilico di Venere maggiore) foliis peltatis. *Vir. Cliff.* 39. *Roy. Lugbd.* 454.

Cotyledon vera, radice tuberosa. *I. B. Hist.* 5 *p.* 683. (*a*)

Cotyledon major. *C. B. P.* 285. *Rai. Hist.* 1878.

Cotyledon Vmbilibus Veneris. *Clus. Hist.* 2 *p.* 63.

Cotyledon altile, floribus albis, spicatis, radice tuberosa. *Maratti*. (*b*)

Felicissime vivit in rupibus muscosis, et herbidis. Datur varietas media, et minor. Major reperitur, sign. ad saxa, quae sustinent sepes quarundam vinearum non procul ab Ecclesia D. Laurentii. Refrigerans etc.

Radix majoris est subrotunda, carnosa. Caulis tripetalis. Flores sunt albi cum velatura rosea diluta, et spicatim caulem vestiunt. Folia caulina variant, aliquando sunt cristata, aliquando reniformia, et crenata. Radicalia sunt rotunda, peltata, et integerrima.

S E D V M

P L A N I F O L I A

838. SEDVM (*Telephium Rizot.* Telefio volgare *vulgo* Erba grassa , e Fava grassa) foliis planiusculis serratis , corymbo folioso , caule erecto . *Linn. Spec. Pl.* 2. *p.* 616.

Sedum foliis planiusculis , patentibus , serratis, corymbo terminali . *Linn. Hort. Cliff.* 176. *Roy. Lugbd.* 456.

Telephium vulgare . *C. B. P.* 287.

Telephium album . *Fuchs. Hist.* 800.

Ad montem Albanum , ad Fajolam, multisque aliis in locis . Emolliens, consolidans , et resolvens .

839. SEDVM (*stellatum vulgo* Semprevivo stellato) foliis planiusculis , angulatis , floribus lateralibus sessilibus solitariis. *Hort. Cliff.* 176. *Roy. Lugbd* 456.

Sedum echinatum , vel stellatum , flore albo . *I. B. Hist.* 3. *p.* 680.

Sempervivum tertium . *Col. Phytob.* 3. *t.* 11.

Cotyledon stellata . *C. B. P.* 295.

Ad vias alpestres etc.

840. SEDVM (*Cepaea vulgo* Cepea) foliis planis , caule ramoso, floribus paniculatis. *Hort. Cliff.* 167. *Roy. Lugbd.* 456. *Sauv. Monsp.* 76.

Sedum annuum album , oblongo Portulacae

minoris folio. *Moris. Hist.*3. *p.* 473. *Se.*12. *t.* 7. *f.* 37.

Cepaea. *C. B. P.* 288. *Clus. Hist.* 2. *p.* 68.

Ad vias montanas etc. Ad morbos calidos etc.

TERETIFOLIA

841. SEDVM (*reflexum*, *vulgo* Semprevivo giallo con li rami ripiegati) foliis subulatis, sparsis, basi solutis, inferioribus recurvatis. *Flor. Svec.* 2. *p.* 1296.

Sedum minus, luteum, folio acuto. *C.B.P.*283.

Sedum minus, luteum, ramulis reflexis. *C. B. P.* 283.

Est obvium etiam intra Vrbem super tecta, et felicissime vivit supra muros vinearum etc.

842. SEDVM (*album vulgo* Semprevivo maggiore vermicolare con fiori bianchi) foliis oblongis, obtusis, teretiusculis, sessilibus, patentibus, cyma ramosa. *Hort. Cliff.* 177. *Roy. Lugbd.* 457. *Hall. Helv.* 398.

Sedum minus teretifolium, album. *C.B.P.*283.

Vermicularis, sive Illecebra major. *Lob. Hist.* 205.

In Sabinis, et aliquibus aliis in locis.

843. SEDVM (*acre vulgo* Semprevivo minore, acre e vermicolato) foliis subovatis, adnatosessilibus, gibbis, erectiusculis, alternis, cyma trifida. *Hort. Cliff.*177. *Flor. Svec.*

389. 403. *Mat. Med.* 218. *Roy. Lugbd.* 456.
Sempervivum minus, vermiculatum, acre. *C. B. P.* 283.
Illecebra, sive Sempervivum tertium. *Dod. Pempt.* 129.

In sterilibus, et siccis. Emoliens, laxans, refrigerans etc.

844. SEDVM (*rubens vulgo* Semprevivo piccolo, non acre, con fiore rosseggiante) foliis fusiformibus subdepressis, infimis quaternis, cyma subquadrifida, floribus pentandris, staminibus reflexis. *Linn. Spec. Pl.* 14. *p.* 619.
Sedum foliis oblonge ovatis, floribus in summum caulem congestis, calyce rubente. *Hall. Helv.* 396.
Sedum minimum montanum, non acre, flore purpurascente parvo, semine stellato. *Rai. Hist.* 692.
Sedum saxatile, atrorubentibus floribus. *C. B. P.* 283. *Prodr.* 132. *Scheuch. it.* 1. *p.* 48. *t.* 6. *f.* 3. 4. *Segu. Veron.* 3. *p.* 207.

Ad Arcinaccium et Fianellum etc.

845. SEDVM (*annuum vulgo* Semprevivo minimo, e non acre, con fiore bianco) caule erecto, solitario, annuo, foliis ovatis sessilibus, gibbis, alternis, cyma recurva. *Flor. Svech.* 391. 405.

Sedum minimum non acre, flore albo. *Rai. Angl.* 3. *p.* 270. *t.* 12. *f.* 2.

Sedum (*vulgo* Semprevivo minimo, e non acre con fiori gialli) minimum non acre, floribus sature luteis. *(a)*

In campis squallidis. (a) in montibus Vallis Corsae, et etiam in Theatro Flavio vulgo Colosseo.

O X A L I S

S C A P O R A D I C A L I

846. OXALIS (*Acetosella vulgo* Trifoglio acetoso volgare) scapo unifloro, foliis ternatis, radice squamoso-articulata. *Hort. Cliff.* 175. *Flor. Svec.* 385. 406. *Mat. Med.* 216. *Roy. Lugbd.* 458.

Oxalis foliis ternatis, scapo unifloro. *Flor. Lap.* 194.

Trifolium acetosum vulgare. *C. B. P.* 330.

Trifolium acetosum. *Dod. Pempt.* 578.

Multis in locis sylvosis, et non sylvosis, et in viis remotis etiam ipsa in Roma. Antiscorbutica et in inflammationibus.

FOLIIS CAVLINIS ALTERNIS

847. OXALIS (*corniculata vulgo* Trifoglio acetoso con fiori gialli, e corniculato) caule ramoso, diffuso, pedunculis umbelliferis. *Hort. Cliff.* 175. *Hort. Vpsal.* 116. *Roy. Lugbd.* 158. *Sauv. Monsp.* 173. *Gort. Gelr.* 91.

Oxys flavo flore. *Clus. Hist.* 2. *p.* 249.

Trifolium acetosum corniculatum. *C.B.P.*330. luteum minus, repens, etiam procumbens. *Moris. Hist.* 2. *p.* 183. *Se.* 2. *t.* 17. *f.* 2.

Mensibus Octobris, et Novembris floret ad Saccaratam etc. et in via ad januam S. Laurentii etc. felicissime vivit. In morbis acutis, et putridis etc.

AGROSTEMMA

848. AGROSTEMMA (*Githago vulgo* Gittone e Melantio) hirsuta, calycibus corollam aequantibus, petalis integris, nudis. *Linn. Spec. Plant.* 1. 624.

Agrostemma. *Hort. Cliff.* 175. *Flor. Svec.* 383. 407. *Roy. Lugbd.* 449.

Lychnis segetum, major. *C.B.P.* 204.

Lolium. *Fuchs. Hist.* 127.

Inter segetes.

849. AGROSTEMMA (*Coeli Rosa vulgo* Gittone con foglie liscie) glabra, foliis lineari-lanceolatis, petalis emarginatis, coronatis. *Hort. Vpsal.* 115.

Lychnis segetum, Nigellastrum minus glabrum dicta, flore eleganter rubello. *Moris. Hist.* 2. *p.* 543. *Se.* 5. *t.* 22. *f.* 32.

Lychnis foliis glabris, calyce duriore. *Bocc. Sic.* 27.

Pseudo-Melantium glabrum Siculum. *Rai. Hist.* 999.

In campis Signanis, et Ceccanis.

850. AGROSTEMMA (*Coronaria* , *vulgo* Licnide coronaria di Dioscoride con fiore rosso , e bianco) tomentosa , foliis ovato-lanceolatis , petalis integris , coronatis . *Hort. Upsal.* 115.

Coronaria . *Hort. Cliff.* 174. *Roy. Lugbd.* 449.

Lychnis coronaria Dioscoridis , sativa . *C. B. P.* 203.

Lychnis . *Cam. Epit.* 569.

Nonnullis in locis , et speciatim ad Montem Albanum , ad Falerium, ad Sylvam Candidam, ad colles Sancti Eliae etc. cum aliis varietatibus. Vulneraria anthelmintica , cephalica etc.

LYCHNIS

851. LYCHNIS (*Flos Cuculi vulgo* Margaritine sdoppie) petalis quadrifidis, fructu subrotundo . *Hort. Cliff.* 174. *Roy. Lugbd.* 139.

Caryophyllus pratensis , flore laciniato simplici , sive Flos Cuculi. *C. B. P.* 210.

Caryophyllus (Margaritine doppie) pratensis flore pleno. *C.B.P.*210. *Mill. Ic* 169. *f.* 2. *(a)*

Odontites Plinii . *Clus. Hist.* 1. *p.* 292. 293.

In Pratis multis in locis . (a) seritur in fictilibus .

852. LYCHNIS (*viscaria* , *vulgo* Licnide viscosa con fiore rosso) petalis integris . *Linn. Spec. Plant.* 3. *p.* 625.

Silene floribus pentagynis , capsulis quinquelocularibus . *Hort. Cliff.*172. *Roy. Lugbd.*44.

Lychnis sylvestris viscosa, rubra, angustifolia. *C. B. P.* 205.

Lychnis sylvestris. *IV. Clus. Hist.* 1. *p.* 289.

Ad Sorianum, et Vallem Petram.

853. LYCHNIS (*alpina*, *vulgo* Licnide con più fiori uniti e con foglie strette) petalis bifidis, floribus corymbosis. *Flor. Svec.* 2. *n.* 410.

Silene floribus corymbosis, caule erecto, foliis lanceolato-linearibus. *Roy. Lugbd.* 447.

Silene floribus in capitulum congestis, *Hall. Helv.* 376. *t.* 7.

Ad Montem Trebulum, ad Januarium etc.

854. LYCHNIS (*dioica vulgo* Licnide acquatica con fiore rosso) floribus dioicis. *Hort. Cliff.* 171. *Roy. Lugbd.* 448.

Lychnis sylvestris, sive aquatica, purpurea, simplex. *C. B. P.* 204.

Lychnis sylvestris, alba simplex. *C. B. P.* 204.

Ad Araemuleam, prope Formellum, et nonnullis aliis in locis, etiam secus vias campestres.

CERASTIVM

CAPSVLIS OBLONGIS

855. CERASTIVM (*vulgatum vulgo* Orecchio di Sorcio con fiore piccolo, e bianco) foliis ovatis, petalis calyci aequalibus, caulibus diffusis. *Flor. Svec.* 2. 415.

Myosotis arvensis hirsuta, parvo flore albo. *Vaill. Par.* 142. *t.*30. *f.*1.

Auricula Muris quorundam, flore parvo, vasculo tenui longo. *I. B. Hist.*3. *p* 359.

In Pratis, et viis remotis passim invenitur.

856. CERASTIVM (*viscosum vulgo* Orecchia di Sorcio, vischiosa, ed irsuta) erectum, villoso-viscosum. *Hort.Cliff.*174.*Roy. Lugbd.* 450.

Cerastium corolla calyci aequali. *Fl.Lapp.* 193.

Myosotis hirsuta, altera, viscosa. *Vaill. Par.* 142. *t.* 3. *f.* 1. 3.

Alsine hirsuta altera viscosa. *C. B. P.* 251.

Ad rudera Cryptae Rubrae, Villam Madamam etc. Vulneraria, et desiccans.

857. CERASTIVM (*arvense vulgo* Orecchia di Sorcio irsuta, e con fiore più grande) foliis lineari-lanceolatis, obtusis, glabris, corollis calyce majoribus. *Flor. Svec.* 381. 417.

Cerastium foliis, calycibusque hirsutis. *Hort. Cliff.* 174. *Roy. Lugbd.* 450.

Myosotis arvensis, hirsuta, flore majore. *Vaill. Par.* 141. *t.* 3. *f.* 4.

Caryophyllus arvensis, hirsutus, flore majore. *C. B. P.* 210.

Ad Tophellum et Ceccanum, ad Farnesinam etc. Ad lacrimalem Fistulam.

858. CERASTIVM (*dichotomum vulgo* Licnide minore con molti rami) foliis lanceolatis, caule dichotomo, ramosissimo, capsulis erectis. *Roy. Lugbd.* 450.

Lychnis segetum, minor. *C. B. P.* 204.

Alsine corniculata. *Clus. Hist.* 2. *p.* 184.

Ad Vallem Petram, et in nonnullis segetibus non distantibus ab ipsa Vrbe.

859. CERASTIVM (*alpinum vulgo* Licnide alpina strata per terra, con fiore grande bianco) foliis ovato-lanceolatis, caule diviso, capsulis oblongis. *Linn. Spec. Plant.* 8. *p.* 628.

Cerastium foliis lanceolato-ovatis, caule subunifloro. *Roy. Lugbd.* 451.

Cerastium corolla calyce majore. *Flor. Lapp.* 192.

Caryophyllus holosteus, alpinus, latifolius. *Oed. Dan. t.* 6.

Alsine Myosotis facie; Lichnis alpina flore amplo niveo, repens. *Rai. Angl.* 3. *p.* 349. *t.* 15. *f.* 2.

Ad Ianuarium montem, et ad montem vulgo Crepacore. Desiccans etc.

CAPSVLIS SVBROTVNDIS

860. CERASTIVM (*repens vulgo* Orecchia di Sorcio serpeggiante, con foglie tomentose)

caule perenni procumbente, foliis lanceolatis tomentosis. *Roy. Lugbd.* 450.

Cerastium perenne, procumbens. *Hort. Cliff.* 174.

Myosotis arvensis, Polygoni folio. *Vaill. Paris.* 141. *t.* 30. *f.* 5.

Ocymoides Lychnitis reptante radice. *Col. Phytob.* 115. *t.* 31.

Lychnis incana repens. *C. B. P.* 206.

Ad Falerium, et Vallem vulgo di Roveto.

861. CERASTIVM (*strictum vulgo* Alsine con foglie di Linaria irsuta) foliis linearibus acuminatis, glabris, pedunculis unifloris subtomentosis, capsulis globosis. *Linn. Spec. Plant.* 10. *p.* 629.

Alsine alpina subhirsuta, Linariae folio. *Scheuch. Alp.* 2. *p.* 130.

Caryophyllus holosteus, alpinus, foliis strictissimis, glabris, acutis, flore magno. *Burs. XI.* 119.

Ad montem Severum, et ad Tretinas rupes.

862. CERASTIVM (*suffruticosum vulgo* Orecchio di Sorcio con foglie sottilissime) caule perenni procumbente, foliis lineari-lanceolatis, subhirsutis. *Linn. Spec. Pl.* 11. *p* 629.

Myosotis tenuissimo folio rigido. *Tour. I. R. H.* 205.

Ad montem Arsiccium, et ad montes Soriani.

863. CERASTIVM (*aquaticum vulgo* Alsine maggiore) foliis cordatis sessilibus, floribus solitariis, fructibus pendulis. *Flor. Svec.* 2. *n.* 413.

Alsine major. *C. B. P.* 250.

Alsine maxima, solanifolia. *Mentz. p.* 2. *t.* 1. *f.* 3.

Ad lacum Vlubrae, et ad Stamna Ostiae, et ad Pontinas lacunas. Vmectans, et diluens.

SPERGVLA

864. SPERGVLA (*arvensis vulgo* Alsine Spergula maggiore) foliis verticillatis, floribus decandris. *Hort. Cliff.* 173. *Flor. Svec.* 377. 419. *Roy. Lugbd.* 451.

Spergula fructu pendulo. *Fl. Lapp.* 190.

Spergula. *Dod. Pempt.* 527.

Alsine, Spergula dicta, major. *C. B. P.* 251.

Ad Sylvam Foliani, et Messiam etc. Refrigerans etc.

865. SPERGVLA (*nodosa vulgo* Alsine nodosa) foliis oppositis, pedunculis simplicibus. *Hort. Cliff.* 173. *Flor. Svec.* 378. 420. *Roy. Lugbd.* 1033.

Alsine nodosa Germanica. *C. B. P.* 251.

Alsine palustris, Ericae folio, polygonoides, articulis crebrioribus, flore albo pulchello. *Pluk. Alm.* 23. *t.* 7. *f.* 4.

Ad campos Somnini, et Carcinacci. Vmectans, et diluens.

DECANDRIA DECAGYNIA

PHYTOLACCA.

866. PHYTOLACCA (*decandra vulgo* Fitolacca, ed Vva d'India) floribus decandris decagynis. *Hort. Cliff.* 177. *Hort. Vpsal.* 117. *Gron. Virg.* 161. *Roy. Lugbd.* 222.

Phytolacca vulgaris. *Dill. Elth.* 318. *t.* 239. *f.* 309.

Solanum racemosum Americanum. *Pluk. Alm.* 353. *t.* 225. *f.* 3.

Licet sit Planta Americana, nihilo minus ubertose vivit in nonnullis locis, et signanter ad rivulum vulgo Acquataccio, et ad sepes nonnullarum vinearum, et etiam ad Theatrum Flavium, et Theatrum Pompei supra muros. Vulneraria etc.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

STAMINA INTER XII. ET XIX. INCLVSIVE.

DODECANDRIA MONOGYNIA

ASARVM

867. ASARVM (*Europaeum vulgo* Assaro) foliis reniformibus, obtusis, binis. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 633.

Asarum foliis subcordatis, petiolatis. *Hort. Cliff.* 178. *Flor. Svec.* 392. 421. *Roy. Lugbd.* 207. *Guett. Stamp.* 198.

Asarum . *C. B. P. Cam. Epit.* 19.

Ad montis Januarii sylvam sed planta rara. Calefacit et urinam movet etc.

868. ASARVM (*Hypocistis vulgo* Ipocistide) aphyllum, squamosum . *Sauv. Monsp.* 4.

Hypocistis . *C. B. P.* 465. *Cam. Ep.* 96. 97.

Non procul a Mediterraneo nostro . Adstringens etc.

S T Y R A X

869. STYRAX (*officinale*, *vulgo* Storace, e Fiori d'Angioli) *Hort. Cliff.* 187. *Roy. Lugbd.* 265. *Sauv. Monsp.* 306. *Gron. Orient.* 149.

Styrax folio Mali Cotonei. *C. B. P.* 452.

Styrax . *Cam. Epit.* 38.

Licet sit planta peregrina, in quibusdam viridariis, et vineis felicissime vivit . Nervos, et tendines emollit etc.

N I T R A R I A

870. NITRARIA. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 638.

Osyris foliis obtusis . *Hort. Vpsal.* 295. *Gmel. Sibir.* 2. *p.* 237. *t.* 98.

Casia fructu nigro . *Amm. Ruth.* 256.

Ad Ostia Tiberina, Insulam Sacram etc.

P O R T V L A C A

871. PORTVLACA (*oleracea vulgo* Porcacchia con foglie strette) foliis cuneiformibus, floribus sessilibus . *Roy. Lugbd.* 473. *Gron. Virg.* 59. *Dalib. Paris.* 158. *Hall. Helv.* 392. *Sauv. Monsp.* 168. *Brown. Jam.* 233.

Portulaca foliis cuneiformibus verticillatis sessilibus . *Hort. Cliff.* 207.

Portulaca angustifolia , sylvestris . *C.B.P.* 288.

Portulaca (*vulgo* Porcacchia con foglie larghe) latifolia sativa . *C. B. P.* 288. *(a)*

Portulaca domestica . *Lob. Icon.* 388.

Non solum habitat in nonnullis campis, et viis remotis , sed etiam in hortis ipsa in Vrbe. Aperit , expellit , et refrigerat .

L Y T H R V M

872. LYTHRVM (*Salicaria* , *vulgo* Salicaria maggiore) foliis oppositis . *Hort. Cliff.* 178. *Roy. Lugbd.* 458. *Guett. Stamp.* 2. *p.* 122.

Lythrum floribus verticillatis . *Flor. Lapp.* 197.

Lysimachia spicata , purpurea . *C. B. P.* 246.

Lysimachia purpurea, communis, major . *Clus. Hist.* 2. *p.* 51.

Lysimachia (*vulgo* Lisimachia di tre foglie con fiore rosso) trifolia spicata, purpurea . *Bocc. Mus.* 167. *(a)*

Lysimachia (*vulgo* Lisimachia di quattro foglie con fiore rosso) quadrifolia , purpurea , mollioribus , et longioribus foliis . *Bocc. Mus.* 167. *(b)*

Ad Lacunas Pontinas , ad Albulam , et passim ad aquarum ripas vivit . Adstringens etc.

873. LYTHRVM (*Hyssopifolia vulgo* Salicaria con foglie d' Isopo) foliis alternis . *Hort.*

Cliff. 178. *Sauv. Monsp.* 53. *Roy. Lugbd.* 458. *Gort. Gelr.* 271.

Salicaria Hyssopi folio latiore. *Hall. Jan.* 147. *t.* 6. *f.* 3.

Hyssopifolia. *C. B. P.* 218.

Lysimachia (*vulgo* Lisimachia con fiore rosso, che non produce silique) rubra non siliquosa. *C. B. P.* 246. (*a*)

Lysimachia (*vulgo* Lisimachia con foglie di Lino con fiori rossi turchini) linifolia, purpureo-caerulea. *C. B. P.* 246. (*b*)

Ad Pontinas lacunas, et ad Alubrum, in aliisque nonnullis locis paludosis.

874. LYTHRVM (*Thymifolia vulgo* Salicaria marittima con frondi di Timo) foliis linearibus. *Sauv. Monsp.* 49.

Salicaria minima tenuifolia, *Tour. I. R. H.* 254.

Salicaria Hyssopi folio angustiore. *Buxb. Hal.* 290.

Hyssopifolia minor, seu potius Thymifolia maritima. *I. B. Hist.* 3. *p.* 792.

Polygonum aquaticum minus. *Barr. Icon.* 773. *f.* 2.

Ad Lacunas Pontinas, Ostiam etc. Sanguinem compescit, est vulneraria etc.

DODECANDRIA DIGYNIA

AGRIMONIA

875. AGRIMONIA (*Eupatoria vulgo* Agrimonia) foliis caulinis pinnatis, impari petiolato, fructibus hispidis. *Hort. Cliff.* 179. *Gron. Virg.* 53. *Roy. Lugbd.* 240. *Hall. Helv.* 407. *Guett. Stamp.* 1. *p.* 293. *Dalib. Paris.* 139.

Eupatorium veterum, sive Agrimonia. *C. B. P.* 321.

Eupatorium. *Fuchs. Hist.* 244. *Cam. Epit.* 756. *Mill. Ic.* 15.

In sylvosis fere omnibus habitat. Princeps est vulneraria planta, roborat, et exhilarat etc.

DODECANDRIA TRIGYNIA

RESEDA

876. RESEDA (*Luteola vulgo* Luteola con foglie di Salcio *et etiam* Erba rozza *Infectorum*) foliis simplicibus, lanceolatis, integris. *Hort. Cliff.* 212. *Roy. Lugbd.* 483. *Dalib. Paris.* 160.

Luteola herba Salicis folio. *C. B. P.* 100.

Lutum herba. *Dod. Pempt.* 80.

In ditione Tiburtina et alibi in locis humidulis.

877. RESEDA (*undata vulgo* Reseda minore) floribus trigynis, tetragynisque, calycibus quinque partitis, foliis pinnatis, undulatis. *Linn. Spec. Pl.* 6. *p.* 644.

Reseda minor, foliis incisis. *Barr. Icon.* 78. *t.* 588.

Multis in locis, etiam ad vias publicas remotas campestres;

878. RESEDA (*alba vulgo* Reseda maggiore con le foglie alate) foliis pinnatis, floribus tetragynis, calycibus sexpartitis. *Linn. Hort. Vpsal.* 149.

Reseda foliis pinnatis integerrimis. *Hort. Cliff.* 212.

Reseda maxima. *C. B. P.* 100. *Lob. Hist.* 110.

Signanter supra moenia Vrbis Romae.

879. RESEDA (*lutea*, *vulgo* Reseda volgare con fiori bianchi, e gialli) foliis omnibus trifidis, inferioribus pinnatis. *Hort. Cliff.* 212. *Roy. Lugbd.* 483. *Hall. Helv.* 315. *Dalib. Par.* 159. *Got. Gelr.* 310.

Reseda vulgaris. *C.B.P.* 100. *Rai. Hist.* 1053.

Reseda lutea. *I. B. Hist.* 3. *p* 467.

Secus vias dissitas Romae extra, et intra Vrbem, multis in locis. Discutiens, et incisiva etc.

880. RESEDA (*Phyteuma vulgo* Reseda minore, e volgare) foliis integris, trilobisque, calycibus sexpartitis maximis. *Hort. Cliff.* 412. *Dalib. Paris.* 159.

Reseda floribus trigynis, calycibus maximis hexaphyllis. *Hort. Vpsal.* 150.

Reseda minor, vulgaris. *Tour. I. R. H.* 423.

Resedae affinis Phyteuma. *C.B.P.* 100. *Prodr.* 42. *t.* 42.

Erucago Apula trifida quinquefolia. *Col. Ecphr.* 267. *t.* 269.

Reseda (*vulgo* Reseda minore, e volgare con le frondi meno tagliate) minor, vulgaris, folio minus inciso. *Tour. I. R. H.* 423. *(a)*

Reseda (*vulgo* Reseda minore, e volgare con le frondi intiere) minor, vulgaris foliis integris, *Tour. I. R. H.* 423. *(b)*

Phyteuma *I. B. His.* 3. *p.* 386.

Cum antecedenti habitat passim eisdem in locis. Incisiva, et discutiens etc.

E V P H O R B I A

V M B E L L A T R I F I D A

881. EVPHORBIA (*Peplus vulgo* Esula rotonda e Titimalo tondo) umbella trifida, dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis, petiolatis. *Amoen. Acad.* 3. 117.

Euphorbia foliis obverse ovatis, integerrimis, umbella universali trifida, triphylla, partialibus dichotomis, diphyllis. *Hort. Cliff.* 199. *Roy. Lugbd.* 197. *Dalib. Paris.* 156.

Peplus, seu Esula rotunda. *C. B. P.* 292.

Peplus. *Fuchs. Hist.* 603. *Dod. Pempt.* 375.

In sylva Capococtae et etiam ad Trafusinam, et in aliquibus aliis locis etiam cultis.

882. Euphorbia (*falcata*) umbella trifida , dichotoma, involucellis cordato-subfalcatis acutis , foliis lanceolatis obtusiusculis . *Amoen. Accad.*3. *p.*118.

Ad sylvam Spinae haerbae et Porcigliani etc. non procul a Mediterraneo .

883. EVPHORBIA (*terracina vulgo* Titimalo marino con le frondi spuntate) umbella quadrifida, dichotoma, foliis alternis lanceolatis, retusis , mucronatis . *Linn. Spec. Plant.* 33. *p.* 654.

Tithymalus marinus, folio retuso , terracinus. *Barr. Icon.*833.

In Valle Corsa , in Circaeio, et ad Asturam etc.

884. Euphorbia (*exigua vulgo* Esula piccola , e Titimalo piccolo) umbella trifida , dichotoma , involucellis lanceolatis , foliis linearibus . *Amoen. Acad.*3. *p.* 118.

Euphorbia (*acuta*) inermis , foliis alternis linearibus acutis , umbella universali trifida , partialibus dichotomis , diphyllis . *Hort. Cliff.*199. *Roy. Lugbd.* 197. *Dalib. Paris.* 157. *Gort. Gelr.* 304. *(a)*

Tithymalus , sive Esula exigua . *C.B.P.*291.

Esula minima Tragi . *Dalech. Hist.*1656.

Tithymalus (*retusa*) sive Esula exigua , foliis obtusis . *C. B. P.* 291. *Prodr.*132. *(b)*

Tithymalus exiguus saxatilis. *C. B. P.* 291. *Prodr.* 132. *Magn. Monsp.* 259. *t.* 258. *Burs. XVI.* 55. (c)

Inter Segetes (a). Ad montes Soriani (b) et ad collem Altillum (c).

VMBELLA QVADRIFIDA

885. EVPHORBIA (*Lathyris vulgo* Latiri maggiore, e Catapuzia) umbella quadrifida, dichotoma, foliis oppositis integerrimis. *Amoen. Acad.* 3. *p.* 119.

Euphorbia inermis, foliis oppositis lanceolatis, integerrimis, umbella universali quadrifida tetraphylla, ulterioribus dichotomis. *Hort. Vpsal.* 140.

Euphorbia inermis, foliis oppositis, lanceolatis, umbella universali trifida polyphylla, partialibus triphyllis, reliquis diphyllis. *Hort. Cliff.* 198. *Roy. Lugbd.* 196. *Dalib. Paris.* 155.

Lathyris major. *C. B. P.* 293.

Lathyris. *Cam. Epit.* 968 *Fuchs. Hist.* 454.

Ad vallem Petram, et Roveti.

VMBELLA QVINQVEFIDA

886. EVPHORBIA (*spinosa vulgo* Titimalo marittimo spinoso) umbella subquinquefida, simplici, involucellis ovatis, primariis tri-

phyllis, foliis oblongis integerrimis, caule fruticoso. *Amoen. Acad.* 3. *p.* 120.

Euphorbia inermis fruticosa, foliis lanceolatis integerrimis, floribus solitariis terminalibus, involucris triphyllis. *Hort. Cliff.* 201. *Roy. Lugbd.* 196.

Euphorbia inermis fruticosa, ramis siccis pungens, foliis ad umbellas ternis, saepius ovatis, floribus solitariis. *Sauv. Monsp.* 51.

Tithymalus Ragusinus, flore luteo pentapetalo. *Herm. Lugbd.* 600. *et* 601.

Tithymalus maritimus spinosus. *C. B. P.* 291.

Ad Circaeium montem et ad Asturam.

887. EVPHORBIA (*epithymoides*) umbella quinquefida, bifida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, obtusis, subtus villosis. *Linn. Spec. Plant.* 39. *p.* 656.

Tithymalus Epithymi fructu. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 52. *t.* 51.

Peplios altera species. *C. B. P.* 292.

Ad Falerium, et Trafusinam.

888. EVPHORBIA (*dulcis vulgo* Titimalo non acre) umbella quinquefida, bifida, involucellis subovatis, foliis lanceolatis obtusis integerrimis. *Amoen. Acad.* 3. *p.* 122.

Tithymalus montanus non acris. *C. B. P.* 292.

Pithyusa, sive Esula minor altera, floribus rubris. *Lob. Icon.* 358.

Ad Sylvam Mesiam etc.

889. EVPHORBIA (*portlandica vulgo* Titimalo con foglia d' Esula) umbella quinquefida, dichotoma, involucellis subcordatis, concavis, foliis lineari-lanceolatis, acutis, glabris, patentibus. *Ludf. Angl.* 183.

Tithymalus montanus Esulae folio, minor, Italicus. *Barr. Icon.* 822.

Tithymalus maritimus minor. *Rai. Syn.* 3. *p.* 313. *t.* 24. *f.* 6.

Ad Dragoncellam etc.

890. EVPHORBIA (*Paralias vulgo* Titimalo Paraglio) inermis, foliis setaceo-linearibus confertis, umbella universali multifida, partialibus ramose bifidis. *Hort. Cliff.* 200. *Roy. Lugbd.* 193. *Gort. Gelr.* 306. *Gron. Orient.* 162.

Tithymalus maritimus. *C. B. P.* 291. *Dod. Pempt.* 370. *f.* 1. 2.

Tithymalus Paralios. *Cam. Epit.* 962.

Ad Sylvas arenosas Asturae, Ostiae etc.

891. EVPHORBIA (*segetalis*) inermis, foliis alternis linearibus acutis, partialibus umbellae ovatorhombeis, petalis bicornibus. *Hort. Vpsal.* 142.

Euphorbia inermis foliis linearibus acutis, ad umbellam quinis isoscelibus, ad umbellulas ter dichotomas ovato-trigonis. *Sauv. Monsp.* 46.

Tithymalus annuus, lunato flore, Linariae folio longiore. *Moris. Hist.* 3. *p.* 339. *Se.* 10. *t.* 2. *f.* 3.

Tithymalus maritimo affinis, Linariae folio. *C. B. P.* 291.

Tithymalus segetum, longifolius. *Rai. Angl.* 3. *p.* 312.

Ad campos Signianos, et ad Aquamtraversam etc.

892. EVPHORBIA (*Helioscopius vulgo* Titimalo Elioscopio) foliis crenatis, umbella universali quinquefida pentaphylla, partialibus trifidis, propriis triphyllis. *Hort. Cliff.* 198. *Roy. Lugbd.* 197. *Dalib. Paris.* 156.

Euphorbia inermis, foliis subrotundis crenatis. *Flor. Lapp.* 220.

Tithymalus Helioscopius. *C. B. P.* 291. *Fuchs. Hist.* 811.

Habitat frequenter in locis cultis, et incultis, et etiam viis remotis ipsa in Vrbe.

893. EVPHORBIA (*serrata vulgo* Titimalo Caracio con foglie dentate) inermis, foliis denticulatis, caulinis lanceolatis, umbella-

rum cordatis. *Hort. Cliff.* 200. *Roy. Lugbd.* 197. *Hort. Vpsal.* 141.

Tithymalus Characias, folio serrato. *C.B.P.* 290.

Tithymalus Myrtites Valentinus. *Clus. Hist.* 2. *p.* 189.

Ad Sylvam Portus, et Laurentinam.

894. EVPHORBIA (*verrucosa vulgo* Titimalo Mirsinite con li frutti verrucosi) inermis, foliis linearibus, umbella universali trifida, triphylla, partialibus trifidis, propriis dichotomis diphyllis, foliolis subrotundis. *Guett. Stamp.* 269. *Dalibard. Paris.* 151.

Tithymalus Myrsinites, fructu Verrucae simili. *C. B. P.* 291.

Tithymalus foliis subhirsutis, ad caulem ellipticis, subfloribus binis subrotundis. *Hall. Helv.* 191.

Vivit ad Sylvam Asturae.

895. EVPHORBIA (*coralloides vulgo* Titimalo arboreo con foglie d' Ipericon, e gambo rosso) inermis, fruticosa, foliis lanceolatis, involucro universali quinquefido, partialibus trifidis, reliquis bifidis. *Hort. Vpsal.* 142. *Roy. Lugbd.* 198.

Tithymalus arboreus, caule corallino, folio

Hyperici, pericarpio barbato. *Bochr. Lugbd.* 1. *p.* 256.

Ad Sylvam Fossignani.

896. Euphorbia (*Orientalis vulgo* Titimalo con gambo purpureo, e foglie di Salcio) inermis foliis lanceolatis, involucro universali quinquefido, lanceolato, partiali, tetraphyllo, subrotundo, propriis diphyllis. *Roy. Lugbd.* 198.

Tithymalus Orientalis, Salicis folio, caule purpureo, flore magno. *Tour. Coroll.* 2.

Ad Collem Pardum.

VMBELLA MVLTIFIDA

897. EVPHORBIA (*Cyparissias vulgo* Titimalo Ciparisso) inermis, foliis confertis linearibus, umbella universali multifida, partialibus dichotomis, foliolis subrotundis. *Hort. Cliff.* 199. *Roy. Lugbd.* 197. *Daib. Paris.* 155. *Gol. Gelr.* 105.

Tithymalus Cyparissius. *C. B. P.* 291. *Dalech. Hist.* 1644.

Tithymalus Cypressinus. *Tabern. Hist.* 990.

In collibus, et viis remotis etiam ipsa in Vre, et alibi multis in locis.

898. EVPHORBIA (*Myrsinites vulgo* Titimalo Mirsinite con foglia larga) inermi foliis superioribus reflexis, latioribus, lanceolatis,

umbella universali trifida, partialibus bifidis. *Hort. Cliff.* 199.

Euphorbia inermis, foliis ligulatis spinula terminatis. *Sauv. Monsp.* 57.

Tithymalus Myrsinites latifolius. *C. B. P.* 290.

Tithymalus Myrsinites legitimus. *Clus. Hist.* 2. *p.* 189.

Ad Sylvam Asturae, et Ostiae etc.

899. EVPHORBIA (*dendroides vulgo* Titimalo arboreo con foglia di Mirto) umbella multifida, dichotoma, involucellis subcordatis, primariis triphyllis, caule arboreo. *Amoen. Acad.* 3. *p.* 128.

Tithymalus myrtifolius arboreus. *C. B. P.* 290.

Tithymalus dendroides. *Cam. Epit.* 965.

Ad Sylvas Asturae, et Maccarese.

900. EVPHORBIA (*Characias vulgo* Titimalo Caracia rosseggiante) umbella multifida, bifida, involucellis perfoliatis emarginatis, foliis lanceolatis integerrimis, caule perenni. *Amoen. Acad.* 3. *p.* 126.

Euphorbia inermis, foliis lanceolatis, umbella universali multifida, partialibus dichotomis, involucris semibifidis perfoliatis. *Hort. Cliff.* 199. *Roy. Lugbd.* 197.

Tithymalus Characias rubens, peregrinus. *C. B. P.* 290.

Tithymalus Characias. 1. *Clus. Hist.* 2. *p.* 188.

Ad Falerium, et ad rudera Cryptae Rubrae.

901. EVPHORBIA (*sylvatica vulgo* Titimalo con fiori lunati) umbella quinquefida, bifida, involucellis perfoliatis subcordatis, acutiusculis, foliis lanceolatis integerrimis. *Linn. Spec. Plant.* 62. *p.* 663.

Tithymalus lunato flore. *Col. Ecphr.* 2 *p.* 56. *t.* 57.

Tithymalus sylvaticus, lunato flore. *C. B. P.* 290. *Moris. Hist.* 3. *p.* 335. *Se.* 10. *t.* 1. *f.* 3.

Multis in locis habitat, et signanter ad Saccaratam, et ad Sylvam Messiam, et ad Pontem Milvium etc.

902. Euphorbia (*amygdaloides vulgo* Titimalo con frondi di Mandole) umbella multifida dichotoma, involucellis perfoliatis orbiculatis, foliis obtusis. *Amoen Acad.* 3. *p.* 126.

Tithymalus Characias Amygdaloides. *C. B. P.* 290.

Ad Focem viridem etc. Lac Tithymalorum omnium vim causticam habet etc.

DODECANDRIA DODECAGYNIA

SEMPERVIVVM

903. SEMPERVIVVM (*tectorum vulgo* Semprevivo de' tetti) foliis ciliatis, propaginibus patentibus. *Linn. Spec. Plant.* 3. *p.* 664.

Sempervivum foliis radicalibus carnosis, ciliatis, caulinis imbricatis membranaceis, co-

rymbo racemoso, reflexo. *Hort. Cliff.* 179. *Roy. Lugbd.* 457.

Sempervivum majus alterum, seu Barba Jovis. *Dod. Pempt.* 127.

Sedum majus vulgare. *C. B. P.* 283.

Supra tecta, muros, ac saxa ipsa in Vrbe. Refrigerans, et adstringens etc.

904. SEMPERVIVVM (*arachnoideum vulgo* Semprevivo tomentoso montano) foliis pilis intertextis, propaginibus globosis. *Linn. Spec. Plant.* 7. *p.*665.

Sempervivum foliis radicalibus in globum congestis, villis reticulatim connexis. *Hort. Cliff.* 180. *Roy. Lugbd.*457.

Sempervivum rubrum, montanum, gnaphaloides. *Col. Ecphr.* 1. *p.* 292. *t.* 291.

Sedum montanum tomentosum. *C. B. P.* 284.

Ad Tretinas rupes etc. Adstrigens, refrigerans, anodynum.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA

ICOSANDRIA MONOGYNIA

CACTVS

OPVNTIAE COMPRESSAE ARTICVLIS PROLIFERIS.

905. CACTVS (*Opuntia, vulgo* Fico d' India maggiore) compressus, articulatus, ramo-

sissimus, articulis ovatis, spinis setaceis. *Hort. Cliff.* 183. *Gron. Virg.* 54. *Roy. Lugbd.* 280.

Opuntia *vulgo* Herbariorum. *I. B. Hist.* 1. *p.* 154. *Mill. Icon.* 191.

Ficus Indica, folio spinoso, fructu majore. *C. B. P.* 458.

Vbertose vivit etiam ipsa in Vrbe Romae, et signanter super diruta Palatii Aurei Neronis ad Circum maximum; et alibi. Folia externe applicata anodyna sunt, et discutientia etc.

PHILADELPHVS

906. PHILADELPHVS (*coronarius vulgo* Siringa) foliis subdentatis. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 671.

Philadelphus. *Hort. Cliff.* 188.

Syringa alba, sive Philadelphus Athenaei. *C. B. P.* 399.

Frutex coronarius. *Clus. Hist.* 1. *p.* 55.

Licet habeatur peregrina, vivit ubertose multis in viridariis, hortis, vineisque. Adstringens etc.

MYRTVS

907. MYRTVS (*communis vulgo* Mortella) floribus solitariis, involucro diphyllo. *Hort. Cliff.* 42. *Roy. Lugbd.* 269.

Myrtus (*Romana*) foliis ovatis, pedunculis longioribus. *Mill. Dict. t.* 184. *f.* 1. (*a*)

Myrtus latifolia Romana. *C. B. P.* 468.

Myrtus (*Tarentina, vulgo* Mortella volgare minore) foliis ovatis, baccis rotundioribus. *Mill. Dict. (b)*

Myrtus minor, vulgaris. *C. B. P.* 468.

Myrtus (*Italica vulgo,* Mortella comune) foliis ovato lanceolatis, acutis, ramis rectioribus. *Mill. Dict. (c)*

Myrtus communis Italica. *C. B. P.* 468.

Ad sylvas Asturae, Ostiae, Macharesi etc. Syrupus baccarum in diarrhoea, et disenteria.

P V N I C A

908. PVNICA (*Granatum*) foliis lanceolatis, caule arboreo. *Hort. Cliff.* 134. *Roy. Lugbd.* 267. *Gron. Orient.* 144.

Malus Punica sylvestris (*vulgo* Granato Salvatico.) *C.B.P.*438. *(a)*

Malus (*vulgo* Granato domestico) Punica sativa. *C. B. P.*438. *(b)*

Malus punica. *Cam. Epit.* 130. 131.

Balaustia (*vulgo* Granato con fiori doppj chiamati Balausti nelle Spezierie) flore pleno majore, et minore. *C.B.P.*438. *(c)*

In silvis (a). In vineis et viridiariis (b) cicuratum, sicuti (c) ob venustatem florum. Adstringens, et roborans etc.

A M Y G D A L V S

909. AMYGDALVS (*Persica*, *vulgo* Persica volgare) foliorum serraturis omnibus acu-

tis, floribus sessilibus solitariis. *Hort. Cliff.* 189. *Roy. Lugbd.* 267.

Persica molli carne, et vulgaris. *C.B.P.* 440.

Persica rubra *Cam. Epit.* 145.

Nucipersica (*vulgo* Persicanoce etc.) quae nucum Iuglandium faciem repraesentat. *C. B. P.* 440. *Rai. Hist.* 1516. (*a*)

Dantur multae varietates, quae in hortis, et vineis satae feliciter vivunt.

910. AMYGDALVS (*communis*) foliis serraturis infimis, glandulosis, floribus sessilibus geminis. *Hort. Cliff.* 186. *Roy. Lugbd.* 267. *Gron. Orient.* 146.

Amygdalus (*vulgo* Mandola salvatica) sylvestris. *C.B.P.* 442. (*a*)

Amygdalus (*vulgo* Mandola dolce) sativa. *C.B. P.* 441. (*b*)

Est aperiens, pectoralis, et restaurans. Oleum emollit, alvum solvit etc.

Amygdalus. *Dod. Pempt.* 798.

Amygdalus (*vulgo* Mandola amara) amara. *Tour. I. R. H.* 627. (*c*)

In Arvis vineis hortisque ut plurimum habitant. Oleum ejus est diureticum lithontripticum antipleuriticum etc.

P R V N V S

911. PRVNVS (*Lusitanicus vulgo* Lauro Regio minore) floribus racemosis, foliis semper

virentibus eglandulosis. *Mill. Icon.* 131. *t.* 196. *f.* 1.

Padus foliis glandula destitutis. *Vir. Cliff.* 42. *Roy. Lugbd.* 269.

Padus foliis semper virentibus, ovatis. *Hort. Cliff.* 185.

Lauro-Cerasus Lusitanica minor. *Dill. Elth.* 193. *t.* 159. *f.* 193.

In sepibus occupariis viridariorum etc.

912. PRVNVS (*Lauro-Cerasus vulgo* Lauro Regio) floribus racemosis, foliis semper virentibus, dorso biglandulosis. *Linn. Spec. Plant.* 5. *p.* 678.

Padus glandulis duabus dorso foliorum innatis. *Virid. Cliff.* 42. *Roy. Lugbd.* 269.

Padus foliis semper virentibus, lanceolato-ovatis. *Hort. Cliff.* 185.

Cerasus folio laurino. *C.B.P.* 450.

Lauro-cerasus. *Clus. Hist.* 1. *p.* 4. *Cam. Hort.* *t.* 23.

Habitat eisdem in locis cum superiori. Folia adstringunt, stomachum confortant etc.

913. PRVNVS (*Armeniaca vulgo* Briccocola maggiore con la mandola dolce) floribus sessilibus, foliis subcordatis. *Linn. Spec. Pl.* 7. *p.* 679.

Prunus foliis ovato-cordatis. *Hort. Cliff.* 186. *Roy. Lugbd.* 268.

Mala Armeniaca major. *C. B. P.* 442.

Mala Armeniaca major, nucleo dulci. *C. B. P.* 442.

Mala (*vulgo* Briccocola minore) Armeniaca minor. *C. B. P.* 442.

In Vineis, hortis, et viridariis, habitat. Fructus est cordialis, pectoralis, et humectans.

914. PRVNVS (*Cerasus vulgo* Cerase domestiche) umbellis subsessilibus, foliis ovato-lanceolatis conduplicatis, glabris. *Linn. Spec. Pl.* 9. *p.* 679.

Cerasus foliis ovato-lanceolatis. *Virid. Cliff.* 43. *Roy. Lugbd.* 267. *Hall. Helv.* 356.

Cerasus (*caproniana vulgo* Visciolone Agro) sativa, rotunda, rubra, et acida. *C. B. P.* 449. (*a*)

Cerasus (*rosea*) hortensis flore roseo. *C. B. P.* 450. (*b*)

Cerasus (*plena*) hortensis flore pleno. *C.B.P.* 450. (*c*)

Cerasa (*dulcis vulgo* Cerasa bianca) alba dulcia. *C.B.P.* 450. (*d*)

Cerasa (*juliana vulgo* Cerasa volgare di poco sapore) carne tenera, et aquosa. *C.B.P.* 450. (*e*)

Fructus a. b. c. d. e. diluunt, et refrigerant.

Cerasus (*austera vulgo* Visciole) acidissima, sanguineo succo. *C. B. P.* 450. (*f*)

Adstringens et refrigerans.

Cerasus (*avium vulgo* Cerasa a rampazzi) racemosa, hortensis. *C.B.P.* 450. (*g*)

Cerasa (*bigarella vulgo* Graffioni) sativa majora. *C.B.P.* 450. (*h*)

Cerasa (*duracina vulgo* Duracine) crassa, carne dura. *C.B.P.* 450. (*i*)

Habitant in praediis, vineis, hortis, et pomariis.

915. PRVNVS (*avium vulgo* Cerase salvatiche di mezzo sapore) umbellis sessilibus, foliis ovato-lanceolatis, conduplicatis, subtus pubescentibus. *Flor. Svec.* 2. *p.* 474.

Cerasus sylvestris, fructu nigro, et rubro. *I. B. Hist.* 1. *p.* 157.

Cerasus major, sive sylvestris, fructu subdulci nigro, colore inficiente. *C. B. P.* 1539.

In pomariis montanis vivit.

916. PRVNVS (*domestica vulgo* Brugne) pedunculis subsolitariis, foliis lanceolato-ovatis, convolutis, ramis muticis. *Linn. Spec. Plant.* 11. *p.* 680.

Prunus (*sylvatica vulgo* Brugna salvatica) sylvestris fructu majore. *Vaill. Paris.* 140.

Prunus. *C. B. P.* 443.

Pruna (*Damascena, vulgo* Brugna Damascena

mezzana) majora, dulcia, et parva, atro-caerulea. *C. B. P.*443. *n.*23. (*a*)

Pruna (*Lungorica vulgo* Brugna di mezzo sapore) magna, crassa, subacida. *C.B.P.*443. (*b*)

Pruna (*juliana vulgo* Brugna turchina lunga) oblonga caerulea. *C.B.P.* 443. (*c*)

Pruna (*Pertigona vulgo* Brugna Pernicone) nigra, carne dura. *C.B.P.* 443. (*d*)

Pruna (*cerea vulgo* Brugna Zuccherina) coloris cerae, ex candido in luteum pallescente. *C. B.P.*443. (*e*)

Pruna (*acinaria, vulgo* Brugna Catalana) magna, rubra, rotunda. *C. B. P.*443. (*f*)

Pruna (*bicolor vulgo* Brugna Verdacchia) oblonga, crassa, pulposa, dulcia, viridia, lutea. (*g*)

Pruna (*Massimiliana*, *vulgo* Brugna Massimiliana) pulposa, dulcia rubro-violacea. (*h*)

Vivunt in praediis, vineis, pomariis, et hortis.

917. PRVNVS (*insititia vulgo* Brugna salvatica) sylvestris major. *Rai. Hist.* 1528.

Pruna (*vulgo* Brugna non insitata) sylvestria praecocia. *C. B. P.* 444.

In sylvis, et etiam in praediis.

918. PRVNVS (*spinosa vulgo* Brugnetta salvatica, e Spino nero) sylvestris, humilis, fructibus parvis atroviolaceis acerrimis.

Prunus sylvestris. *C. B. P.* 444. *Tabern. Icon.* 992.

In collibus apricis multis in locis, et signanter ad Montes Lanti, ad collem Pardum etc. Hujus cortex vim habet verae Chinae.

ICOSANDRIA DIGYNIA

CRATAEGVS

919. CRATAEGVS (*Aria vulgo* Sorbo Alpino) foliis ovatis inaequaliter serratis, subtus tomentosis. *Hort. Cliff.* 187. *Roy. Lugbd.* 271. *Sauv. Monsp.* 306.

Alni effigie lanato folio, major. *C.B.P.* 452.

Sorbus Alpina. *I. B. Hist.* 1. *p.* 65.

Ad montem Januarium etc.

920. CRATAEGVS (*torminalis*, *vulgo* Sorbo torminale) foliis cordatis septangulis, lobis infimis divaricatis. *Linn. Spec. Pl.* 2. *p.* 681.

Crataegus foliis cordatis acutis, lacinulis acutis serratis. *Hort. Cliff.* 187. *Roy. Lugbd.* 271. *Sauv. Monsp.* 286.

Sorbus torminalis, et Crataegus Theoprasti. *I. B. Hist.* 1. *p.* 63.

Sorbus torminalis. *Cam. Epit.* 162.

Mespilus Apii folio, sylvestris, non spinosa, seu Sorbus torminalis. *C.B.P.* 454.

Ad montem Fiscellum, et ad montem Severum.

921. Crataegus (*Oxyacantha vulgo* Spina bianca ed Oxiacanta) foliis obtusis, subtrifidis,

serratis . *Hort. Cliff.* 188. *Roy. Lugbd.* 272.

Mespilus Apii folio, sylvestris, spinosa, sive Oxyacantha. *C.B.P.* 454.

Oxyacantha, sive Spina acuta. *Dod. Pempt.* 751.

In sylvis et sepibus multis in locis.

922. CRATAEGVS (*Azarolus vulgo* Lazarola) foliis obtusis, subtrifidis, subdentatis. *Linn. Spec. Pl.* 9. *p.* 683.

Mespilus Apii folio laciniato. *C.B.P.* 453.

Mespilus Aronia Veterum. *I. B. Hist.* 1. *p.* 67.

Mespilus (*Aronia vulgo* Lazarola) orientalis, Apii folio, subtus-hirsuto. *Poch. Orient.* 189. *t.* 85. (*a*)

In pomariis, viridariis etc. habitat. Detergens, et adstringens.

ICOSANDRIA TRIGYNIA

SORBVS

923. SORBVS (*aucuparia*, *vulgo* Sorbo salvatico) foliis pinnatis, utrinque glabris. *Linn. Spec. Plant.* 1. *p.* 683.

Sorbus foliis pinnatis. *Hort. Cliff.* 188. *Roy. Lugbd.* 274. *Gron. Orient.* 151.

Sorbus sylvestris, foliis domesticae similis. *C. B. P.* 415.

Sorbus sylvestris *Cam. Epit.* 161.

In sylvis montanis multis in locis.

924. SORBVS (*umbellatus*) umbellatus, foliis

simplicibus ovato-acuminatis, in ambitu serratis. *Cat. Hort. Bot. Rom. Maratti.*

Est arbor procera per dichotomiam divisa, floret mense Junio, et Augusto, et Septembri fructus maturant. Habitat prope montem Monachum juxta montem Fiscollum, in loco, qui vulgo audit Li Trocchi. Ejus fructus gratam escam turdis praebent.

925. SORBVS (*domestica vulgo* Sorbo domestico) foliis pinnatis, subtus villosis. *Hal. Helv.*351.

Sorbus sativa. *C. B. P.*415.

Sorbus legitima. *Clus. Hist.* 1. *p.*10.

Alicubi in vineis, pomariis, et campis etc. Fructus immaturus adstringit, folia sunt antifebrilia etc.

ICOSANDRIA PENTAGYNIA

MESPILVS

926. MESPILVS (*Germanica, vulgo* Nespolo volgare) inermis, foliis lanceolatis, subtus tomentosis, floribus sessilibus, solitariis. *Hort. Cliff.*189. *Roy. Lugbd.*270.

Mespilus Germanica, folio laurino, non serrato. *C.B.P.*453.

Mespilus. *Dod. Pempt.*801.

Mespilus folio laurino, major. *C.B.P.*453.

In quibusdam pomariis et viridariis, et etiam in aliquibus sylvis humidiusculis. Adstringens, et refrigerans.

PYRVS

927. PYRVS (*communis, vulgo* Pere) foliis

serratis, pomis basi productis. *Hort. Cliff.* 190. *Roy. Lugbd.* 266. *Hall. Helv.* 351.

Pyrus (*Pyraster vulgo* Peruzzo) sylvestris. *C. B. P.* 439. *Dod. Pempt.* 351. (*a*)

Adstringens etc.

Pyrus (*Falerna vulgo* Pera Bergamotta) Bergamotta Gallis. *I. B. Hist.* 1. *p.* 44. (*b*)

Pyrus (*Pompejana*, *vulgo* Pera bugiarda, *et etiam* Buona Cristiana) Boni Christiani. *I. B. Hist.* 1. *p.* 44. (*c*)

Pyrus (*Angelica vulgo* Pera moscatella) Jesu, seu Moschatellina rubra. *I. B. Hist.* 1. *p.* 44. (*d*)

Pyrus (*Angelica vulgo* Pera Angelica) sativa, fructu aestivo, et autumnali, turbinato, e luteo rubente, punctulis ferrugineis adsperso. *Cat. Hort. Rom.* (*e*)

Pyrus (*Spadonia vulgo* Pera Spadona) sativa fructu magno, e luteo virente, succoso. *Cat. Hor. Rom.* (*f*)

Pyrus (*Spina vulgo* Pera Spina del Carpio) sativa fructu majore, et medio, lutescente, sapore e dulciusculo grato. *Cat. Hort. Rom.* (*g*)

Pyrus (*Muscaria*, *vulgo* Pera Moscarolla) sativa fructu aestivo, parvo, racemoso, odoratissimo. *Tour. I. R. H.* 628. seu Pyra superba odoratissima parva, sed ocyssima Plinii *Lugbd.* 306. (*h*)

Pyrus (*Burrè vulgo* Pera Burrè d'estate) sativa, fructu majori aestivo, e viridi rubente. (*i*)

Pyrus (*Sorbina*, *vulgo* Pera Poppina) sativa, fructu e rotundo acuminato, luteo rubente.

Pyrus (*Kermesina vulgo* Pera Kermesina) sativa fructu turbinato, e luteo kermesino. (*k*)

Humectantes, refrigerantes et emollientes fructus harum maturi.

Dantur multae aliae varietates, quae vivunt felicissime in pomariis, viridariis, et vineis.

928. PYRVS (*Malus vulgo* Mele) foliis serratis, pomis basi concavis. *Hort. Cliff.* 189. *Roy. Lugbd.* 266. *Hall. Helv.* 351.

Malus (*sylvestris vulgo* Melazzo) sylvestris. *C. B. P.* 433. *Dod. Pempt.* 790. (*a*)

Malus (*Paradisiaca vulgo* Melonano) pumila, quae potius frutex, quam arbor. *C. B. P.* 433. (*b*)

Malus (*glaciata*, *vulgo* Mela diacciola) sativa fructu maculis vitreis foris, et intus notato. *Tour. I. R. H.* 634. (*c*)

Mala vitrea. *Cord. Hist.* 181.

Malus (*Eruginea vulgo* Mela ruzza) sativa, fructu subrotundo, e viridi ferrugineo. *Tour. I. R. H.* 635. (*d*)

Malus (*purpurea vulgo* Melappione) sativa, fructu splendide purpureo. *Tour. I. R. H.* 635. (*e*)

Malus (*striata* , *vulgo* Mela Vergata) sapido fructu , striis rubris picto . *H. R. Par.* (*f*)

Malus (*Appia vulgo* Melappiola odorosa) sativa fructu parvo, cerae colore, odoratissimo . (*g*)

Malus (*Rosa vulgo* Mela rosa rossa odorosa) sativa fructu sanguinei coloris , ex austero subdulci . *Tour. I. R. H.* 635. (*h*)

Eadem colore , e viridi , albicante (*vulgo* Mela rosa bianca.)

Malus (*austera* , *vulgo* Mela pasticciera) sativa , fructu magno , e viridi , dilute rubente , et inodoro , austeri saporis . (*i*)

Dantur quam plurimae aliae varietates quae habitant cum descriptis in nostris pomariis, vineis , et viridariis . (a) vero vivit in sylvis non procul a mare Mediterraneo . Fructus maturi sunt refrigerantes, emollientes , cordiales , et aperientes etc.

929. PYRVS (*Cydonia*) foliis integerrimis , floribus solitariis. *Linn. Hort. Cliff.* 160. *Roy. Lugbd.* 267.

Malus (*sylvestris vulgo* Cotogno salvatico) Cotonea sylvestris. *C. B. P.* 435. (*a*)

Malus (*vulgo* Cotogno maggiore domestico) Cotonea major. *C.B.P.* 434. (*b*)

Malus (*vulgo* Cotogno domestico minore) Cotonea minor. *C. B. P.* 434. (*c*)

Cotonea (*vulgo* Pero , e Melo Cotogno) et Cydonia . *Lob. Hist.* 580.

In vineis , pomariis , et viridariis. (a) vero ad Radicatam , montem Arsiccium etc. Mala Cotonea adstringunt , et corroborant etc.

SPIRAEA

HERBAE

930. SPIRAEA (*Aruncus vulgo* Barba di Capra) foliis supradecompositis, spicis paniculatis, floribus dioicis. *Linn. Spec. Pl.* 8. *p.* 702.
Aruncus. *Hort. Cliff.* 463. *Roy. Lugbd.* 278. *Gron. Virg.* 121.
Barba Caprae floribus oblongis. *C. B. P.* 163.
Barba Caprae. *Cam. Hort.* 26. *t.* 9.

Ad montem Severum. Abstergit, et expurgat.

931. SPIRAEA (*Filipendula vulgo* Filipendula volgare) foliis pinnatis, foliolis uniformibus serratis, caule herbaceo, floribus cymosis. *Linn. Spec. Plant.* 9. *p.* 702.
Filipendula foliis pinnatis, foliolis uniformibus. *Hort. Cliff.* 291. *Flor. Svec.* 404. 439. *Mat. Med.* 139. *Roy. Lugbd.* 277.
Filipendula vulgaris. *C. B. P.* 163.
Filipendula. *Cam. Epit.* 608.

In pasquis Fajolae, monte Gentile etc. Radices sunt calefacientes, propellentes, et stimulantes.

932. SPIRAEA (*Vlmaria vulgo* Olmaria, e Regina delli prati) foliis pinnatis, impari majore lobato, floribus cymosis. *Hort. Cliff.* 191. *Flor. Lap.* 201. *Mat. Med.* 241. *Flor. Svec.* 405. 440. *Roy. Lugbd.* 277.
Barba Caprae floribus compactis. *C. B. P.* 164.

Regina prati. *Dod. Pempt.* 57.
Vlmaria Herbariorum.

In pratis umbrosis montis Ianuarii etc. Antispasmodica, antepileptica, corroborans, et adstringens. Radices sunt calefacientes, propellentes, et stimulantes.

ICOSANDRIA POLYGYNIA

ROSA

933. ROSA (*alpina vulgo* Rosa di montagna senza spine, con fiore sdoppio) germinibus ovatis, pedunculis subhispidis, caule inermi. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 703.
Rosa campestris, spinis carens, biflora. *C. B. P.* 484.
Rosa rubello flore simplici, non spinosa. *I. B. H.* 2. *p.* 39.
Rosa non spinosa. *Hall. Opusc.* 218.

Ad Fiscellum montem etc. Flores refrigerant, et adstringunt.

934. ROSA (*eglanteria vulgo* Rosa salvatica odorosa) aculeata, foliis odoratis, subtus rubiginosis. *Hall. Helv.* 350. *Flor. Svec.* 2. *n.* 443.
Rosa sylvestris, foliis odoratis. *C. B. P.* 483.
Rosa eglanteria. *Tabern. Icon.* 1087.

Ad sylvam Ciminiam, Fajolam etc. Contra calculum, et urinae difficultates.

935. ROSA (*cinnamomea vulgo* Rosa che odora di cannella) germinibus globosis, pe-

dunculisque glabris, caule aculeis stipularibus, petiolis subinermibus. *Linn. Spec. Pl.* 4. *p.* 703.

Rosa odore cinnamomi, simplex. *C. B. P.* 483.

Rosa cinnamomea, floribus subrubentibus, spinosa. *I. B. H.* 2. *p.* 39.

Ad sylvam Messiam etc.

936. ROSA (*centifolia vulgo* Rosa d'Olanda mezzana) germinibus ovatis, pedunculisque hispidis, caule hispido, aculeato, petiolis inermibus. *Lin. Spec. Pl.* 7. *p.* 704.

Rosa caule aculeato, pedunculis hispidis, calycibus semipinnatis, glabris. *Sp. Pl.* 1. *p.* 491.

Rosa multiplex media. *C. B. P.* 482.

Rosa centifolia Batavica. II. *Clus. Hist.* 1. *p.* 114.

Colitur in hortis.

937. ROSA (*Gallica vulgo* Rosa rossa doppia) germinibus ovatis, pedunculisque hispidis, caule, petiolisque hispido-aculeatis. *Linn. Spec. Pl.* 8. *p.* 704.

Rosa rubra multiplex. *C. B. P.* 481.

Rosa (*vulgo* Rosa semidoppia) rubra, flore semipleno. *I. B. H.* 2. *p.* 34.

Rosa (*versicolor vulgo* Rosa di più colori, o Prenestina) Praenestina, variegata, plena. *Mill. Dict. t.* 221. *f.* 2. (*a*)

Rosa versicolor. *C. B. P.* 481.

Rosa Praenestina alba, et versicolor. *I. B. Hist.*2. *p.*2.

In viridariis coluntur.

938. ROSA (*sempervirens vulgo* Rosa d' ogni mese e Damaschina maggiore) germinibus ovatis, pedunculisque hispidis, caule petiolisque aculeatis. *Linn. Spec. Pl.* 9. *p.* 704.

Rosa caule aculeato, foliis quinis glabris perennantibus. *Spec. Pl.* 1. *p.* 492.

Rosa moschata semper virens. *C. B. P.* 482.

Rosa semper virens Iungermanni. *Clus. Hist.*2. *App. Alt. Dill. Elth.* 326. *t.* 246. *f.*318.

In nonnullis viridariis. Datur alia varietas flore minore.

939. ROSA (*canina vulgo* Rosa Canina) germinibus ovatis, pedunculisque glabris, caule, petiolisque aculeatis. *Linn. Spec. Pl.* 10. *p.* 704.

Rosa caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus semipinnatis. *Flor. Svec.* 406. 441.

Rosa sylvestris, vulgaris, flore odorato incarnato. *C. B. P.* 483.

Rosa canina vulgo dicta. *Dod. Pempt.* 187.

Ad sepes vinearum, in collibus, cannetis, et sylvosis. Adstringens, roborans.

940. ROSA (*pendula vulgo* Rosa con foglie di Pimpinella) germinibus ovatis glabris,

pedunculis, cauleque hispidis, petiolis inermibus, fructibus pendulis. *Linn. Spec. Pl.* 12. *p.* 705.

Rosa Sanguisorbae majoris folio, fructu longo, pendulo. *Dill. Elth.* 325. *t.* 245. *f.* 317.

Ad sylvam Candidam, et Montem Severum.

941. ROSA (*alba, vulgo* Rosa bianca maggiore) germinibus ovatis, glabris, pedunculis hispidis, caule petiolisque aculeatis. *Linn. Spec. Pl.* 13. *p.* 705.

Rosa caule aculeato, pedunculis hispidis, calycibus semipinnatis, glabris. *Sp. Pl.* 1. *p.* 492.

Rosa alba, vulgaris, major. *C. B. P.* 482.

Rosa alba flore pleno. *Besl. Eyst. Vern.* 6. *t.* 3. *f.* 1.

In viridariis. Aqua in Lippitudine.

942. ROSA (*spinosissima*) germinibus ovatis glabris, pedunculis, caule, petiolisque aculeatissimis. *Linn. Spec. Pl.* 14. *p.* 705.

Rosa caule petiolisque aculeatis, calycis foliolis indivisis. *Flor. Svec.* 407. 442.

Rosa campestris, spinosissima, flore albo, odorato. *C. B. P.* 483.

Ad montem Severum, et Trebulum.

943. ROSA (*mirabilis*) spinis carens, foliis ovalibus serratis, floribus solitariis longo pe-

tiolo adalligatis, perianthio pentaphyllo, foliolis simplicibus. *It. Maratti*.

Est Arbor procera, cujus caudex diametro sexquipalmus, et ultra, duodecim palmorum, et ultra altitudinem aequat, ramos emittit assurgentes, et reconditos, fereque globum efformant: ejus flores pallide sulphurei sunt, Rosarum Damascenarum perfectum odorem spirant. Materies ligni est sublutea. Vivit juxta montem Monachum in eo tractu in quo dividitur Jurisdictio Praefecti Nursiae ab illa Praesidis Montis Alti.

944. ROSA (*gentilis vulgo* Rosa gialla senza odore) Pimpinellae majoris foliis, flore plenissimo sulphureo inodoro, calycibus in summitate pinnatis, germinibus subrotundis. Planta spinis crebrerrimis, et exiguis est armata. *Maratti*.

In nonnullis viridariis etiam Vrbis. Dantur multae species, et varietates Rosarum, sylvestres, et cicuratae. Rosa refrigerat, adstringit, somnum conciliat etc. Spongiolarum rosis sylvestribus adnatarum pulvis mirus est contra calculum, et urinae difficultates.

RVBVS

FRVTESCENTES

945. RVBVS (*Idaeus vulgo* Lamponi, e More rosse, ed anche Rogo Ideo) foliis quinato-pinnatis, ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. *Flor. Svec.* 408. 446. *Mat. Med.* 242.

Rubus caule erecto, hispido, foliis ternatis. *Flor. Lapp.* 204. *Hort. Cliff.* 192. *Hort. Vpsal.* 133. *Roy. Lugbd.* 273.

Rubus Idaeus spinosus. *C. B. P.* 479.
Rubus Idaeus laevis. *C. B. P.* 479.

Ad montes Januarium, Trebulum etc

946. RVBVS (*caesius vulgo* Mora di color nero slavato, che dà in turchino) foliis ternatis, subnudis, lateralibus bilobis, caule tereti aculeato. *Hort. Cliff.* 192. *Flor. Svec.* 410. 445. *Roy. Lugbd.* 273. *Hall. Helv.* 444.
Rubus repens, fructu caesio. *C. B. P.* 479.
Rubus minor. *Dod. Pempt.* 742.

In dumetis, et campis frequentissimus.

947. RVBVS (*fruticosus vulgo* Mora di fratta) foliis quinato-digitatis, ternatisque, caule, petiolisque aculeatis. *Flor. Svec.* 409. 444.
Rubus caule aculeato, foliis ternatis, ac quinatis. *Hort. Cliff.* 192. *Gron. Virg.* 163. *Roy. Lugbd.* 273.
Rubus vulgaris, sive Rubus fructu nigro. *C. B. P.* 479.
Rubus. *Cam. Epit.* 751.

In sepibus, et sylvis fere omnibus frequentissimus.

H E R B A C E I

948. RVBVS (*saxatilis vulgo* Moro, e Rogo con li frutti piccoli, ed agri) foliis ternatis, flagellis nudis reptantibus, herbaceis. *Flor. Svec.* 411. 447.
Rubus caule repente annuo, foliis ternatis. *Flor.*

Lapp. 206. *Roy. Lugbd.* 274. *Hall. Helv.* 344.

Rubus caule inermi, repente, nudo, fructibus parvis in racemum dispositis. *Descr. Agr. Rom.*

In collibus Arcinacci, et Altilli etc. In maceriis lapidosis nonnullorum camporum. Rubus adstringit, et desiccat.

F R A G A R I A

949. FRAGARIA (*vesca*, *vulgo* Fravole volgari con frutto rosso, e bianco) flagellis repetans. *Hort. Cliff.* 192. *Hort. Vpsal.* 133. *Mat. Med.* 245. *Roy. Lugbd.* 274. *Hall. Helv.* 243.

Fragaria (*sylvestris*) vulgaris. *Flor. Lapp.* 209. *C. B. P.* 226. *Gron. Virg.* 56.

Fragaria fructu albo. *C. B. P.* 326.

Fragaria fructu albo odoro, foliisque parte inversa candicantibus. *Descr. Agr. Rom. Maratti.*

Fragaria fructu majore. *Ibid.*

Ad sylvam, vulgo di Rocca di Papa, Triviae, et fere in omnibus nemoribus.

910. FRAGARIA (*sterilis vulgo* Fravola, che non matura il frutto) caule decumbente, repente. *Roy. Lugbd.* 274. *Dalib. Paris.* 14. *Sauv. Monsp.* 177.

Fragaria sterilis. *C. B. P.* 327.

Fragaria sterilis, sive minime vesca, hirsuta,

minime incana. *Moris. Hist.* 2. *p.* 186. *Se.* 2. *t.* 19. *f.* 5.

Fragaria sylvestris, minime vesca, seu sterilis. *Lob. Icon.* 698.

Ad cyptam Luparam, Fajolam et fere ubi praeced. Tota planta est officinalis. Roborat, adstringit. Fructus emolliunt, nutriunt, laxant, refrigerant, mitificant etc.

P O T E N T I L L A

951. POTENTILLA (*anserina*) foliis pinnatis serratis, caule repente. *Flor. Lapp.* 210. *Flor. Svec.* 415. 452. *Hort. Cliff.* 193. *Mat. Med.* 246. *Roy. Lugbd.* 275.

Potentilla. *C. B. P.* 321. *Cam. Epit.* 758.

Ad Januarium montem, Fiscellum etc.

952. POTENTILLA (*fruticosa vulgo* Pentafilloide frutescente) foliis pinnatis, caule fruticoso. *Hort. Cliff.* 193. *Roy. Lugbd.* 275. *Kalm. It.* 2. *p.* 263. *Huds. Angl.* 195.

Pentaphylloides rectum, fruticosum, Eboracense. *Moris. Hist.* 2. *p.* 193. *Se.* 2. *t.* 23. *f.* 5.

Pentaphylloides rectum, frutescens. *Walth. Hort.* 95. *t.* 17.

Pentaphylloides fruticosa, elatior. *Amm. Ruth.* 88. *t.* 17. *et* 89. *t.* 18. *f.* 1.

Ad Petrollam et Ceccanum etc. Refrigerans, admodum roborans, cum facultate adstringendi.

953. POTENTILLA (*supina vulgo* Pentafilo

irsuto, e Cinquefoglie) foliis pinnatis, caule dichotomo, decumbente. *Hort. Cliff.* 193. *Roy. Lugbd.* 275.

Pentaphyllum alpinum, minus, supinum. *Pluk. Alm.* 285. *t.* 106. *f.* 7.

Pentaphyllum supinum quorumdam, Potentillae facie. *Clus. Hist.* 2. *p.* 107.

Pentaphylli species, flore luteo, enneaphyllos, hirsuta. *Ambros. Phyt. t.* 414.

Quinquefolio frugifero affinis. *C. B. P.* 326.

Ad montes Soriani, et Ariccium. Radix adstringit.

FOLIIS DIGITATIS

954. POTENTILLA (*recta vulgo* Pentafilo eretto volgare Cinquefolio) foliis septenatis, lanceolatis, serratis, utrinque subpilosis, caule erecto. *Linn. Spec. Pl.* 10. *p.* 711.

Potentilla foliis digitatis, caule erecto, corymboso. *Hort. Vpsal.* 133. *Roy. Lugbd.* 275.

Quinquefolium erectum, luteum. *C. B. P.* 325.

Quinquefolium alterum vulgare. *Dod. Pempt.* 116.

Ad Agrorum margines etc. Roborans, et adstringens.

955. POTENTILLA (*argentea vulgo* Potentilla, *et etiam* Argentina) foliis quinatis, cuneiformibus, incisis, subtus tomentosis, caule erecto. *Linn. Spec. Plant.* 11. *p.* 712.

Potentilla foliis digitatis, caule erecto corymboso. *Flor. Svec.* 417. 454.

Potentilla foliis digitatis, inciso-serratis, caule erecto. *Hort. Cliff.* 193.

Quinquefolium folio argenteo. *C. B. P.* 325.

Pentaphyllum minus. *Cam. Epit.* 760.

Ad Serram D. Antonii, ad montes S. Eliae, et Januarium. Haec vires possidet aemulas Corticis Peruviani, si ejus succus sumatur una hora ante paroxysmum etc.

956. POTENTILLA (*aurea vulgo* Cinquefolio, e Pentafilon minore, serpeggiante, con fiore di colore d'oro) foliis radicalibus quinatis serratis acuminatis, caulinis ternatis, caule declinato. *Amoen. Acad.* 4. *p.* 316.

Potentilla foliis quinatis, acute serratis, ora sericea, petalis maculatis. *Hall. Helv.* 339. *t.* 6. *f.* 4.

Quinque-folium minus, repens, alpinum, aureum. *C. B. P.* 325.

Ad montes Crepacuore, et Januarii etc. Adstringens, et roborans.

957. POTENTILLA (*verna vulgo* Pentafila, o Cinquefolio minore con fiori gialli) foliis radicalibus quinatis, acute serratis, retusis, caulinis ternatis, caule declinato. *Flor. Svec.* 419. 445.

Potentilla foliis quinatis, incisis, caule assurgente. *Flor. Lapp.* 212. *Hort. Cliff.* 194. *Roy. Lugbd.* 276.

Quinquefolium minus, repens, luteum. *C. B. P.* 325.

Pentaphyllum, sive quinquefolium minus. *Tabern. Icon.* 123.

Secus vias remotas, etiam in Vrbe, itemque in pratis etc.

958. POTENTILLA (*reptans vulgo* Pentafilon, o Cinquefolio maggiore con fiori gialli, e per terra) foliis digitatis, caule repente, pedunculis unifloris. *Flor. Svec.* 418. 456. *Mat. Med.* 247.

Potentilla foliis digitatis, longitudinaliter patenti-serratis, caule repente. *Hort. Cliff.* 194. *Gron. Virg.* 163.

Quinquefolium majus, repens, *C. B. P.* 325.

Quinquefolium majus, luteum. *Fuchs. Hist.* 624.

In aggeribus fossarum Nymphae, ad Saccaratam, et alicubi in viis remotis etc. In laxitate vasorum etc.

959. POTENTILLA (*caulescens*) foliis quinatis, apice connivente serratis, caulibus multifloris erectis, receptaculis hirsutis. *Amoen. Acad.* 4. *p.* 317.

Quinquefolium album majus *C. B. Prod.* 139. *caulescens*. *C. B. P.* 325. *Hall. Opusc.* 263. *n.* 50. 47.

Quinquefolium album, minus, alterum, *C. B. P.* 325.

Quinquefolium 2. minus albo flore. *Clus.Hist.2. p.* 105.

Ad montes Januarium, et Leonem.

TORMENTILLA

960. TORMENTILLA (*erecta vulgo* Tormentilla) caule erectiusculo, foliis sessilibus. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 716.

Tormentilla. *Cam. Epit.* 685. *Hort. Cliff.* 194. *Roy. Lugbd.* 276.

Tormentilla sylvestris *C. B. P.* 326.

In pascuis siccis. Pro mictu cruento, dysenteria, diarrhoea, diabete, dolore dentium etc.

GEVM

961. GEVM (*Vrbanum vulgo* Cariofillata, o Garofolata volgare) floribus erectis, fructu globoso, villoso, aristis uncinatis, nudis, foliis lyratis. *Hort. Cliff.* 195. *Mat. Med.* 249. *Flor Svec.* 423. 460. *Roy. Lugbd.* 276.

Caryophyllata vulgaris. *C. B. P.* 321.

Caryophyllata *Dod. Pempt.* 137.

In umbrosis, et sylvis, etiam in sylvulis viridariorum Vrbis. Radix circa plenilunium februarii effossa est cardiaca, corroborans, incitans etc.

962. GEVM (*rivale vulgo* Cariofillata acquatica) floribus nutantibus, fructu oblongo, aristis plumosis. *Hort. Cliff.* 195. *Roy. Lugbd.* 276.

Geum rivale. *Flor. Lapp.* 216.

Caryophyllata aquatica, nutante flore. *C. B. P.* 321.

Caryophyllata septentrionalium. *Lob. Icon.* 694.

Caryophyllata aquatica altera *C. B. P.* 322. (*a*)

Ad Sylvam Messiam.

C O M A R V M

963. COMARVM (*palustre*) *Flor. Lap.* 214. *Flor. Svec.* 422. 463. *Hort. Cliff.* 195. *Roy. Lugbd.* 276. *Hall. Hel.* 337.

Quinquefolium palustre rubrum. *C. B. P.* 325.

Pentaphyllum palustre. *Cord. Hist.* 95.

In humidiusculis Nymphae.

C L A S S I S XIII.

P O L Y A N D R I A

P O L Y A N D R I A M O N O G Y N I A

C A P P A R I S

964. CAPPARIS (*vulgaris vulgo* Capperi non spinosi) non spinosa fructu majore *C. B. P.* 480.

Capparis non spinosa *I. B. Hist.* 2. 63.

Capparis non spinosa, foliis subrotundis glabris, fructu majore ovato. *Desc. Agr. Rom. Maratti.*

In ruderatis, et moeniis Vrbis. Radicis cortex in primis laudatur ubi aperiendum est, et roborandum et, in vino albo infusus, est diureticus.

A C T A E A

965. ACTAEA (*spicata vulgo* Cristoforiana) racemo ovato, fructibusque baccatis. *Linn. Spec. Pl.* 1. 722.

Actaea. *Linn. Hort. Cliff.* 209. *Flor. Svec.* 431. 464. *Hort. Vps.* 138 *Mat. Med.* 253. *Roy. Lugbd.* 480. *Dalib. Paris.* 152.

Actaea caule inermi. *Flor. Lap.* 217.

Aconitum (*nigra*) bacciferum *C. B. P.* 183.

Christophoriana. *Clus. Hist.* 2. *p.* 86.

Ad Januarium montem, in sylvosis etc.

C H E L I D O N I V M

966. CHELIDONIVM (*majus vulgo* Celidonia maggiore volgare) pedunculis umbellatis. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 723.

Chelidonium pedunculis multifloris. *Hort. Cliff.* 201. *Roy. Lugbd.* 478. *Dalib. Paris.* 152.

Chelidonium majus vulgare. *C. B. P.* 144.

Chelidonium majus. *Fuchs. Hist.* 865.

Chelidonium (*vulgo* Celidonia maggiore con foglie quasi simili a quelle delle Quercie) majus foliis quernis. *C. B. P.* 144.

Chelidonium majus, folio laciniato. *Clus. Hist.* 2. *p.* 203.

Ruderatis, et humentibus multis in locis. Radix ubi fortiter movendum ibi convenit. Vino infusa conducis in hydrope etc.

967. CHELIDONIVM (*glaucium vulgo* Glaucio, e Papavero cornicolato con fiore giallo) glabrum, pedunculis unifloris. *Hort. Vpsal.* 137. *Roy. Lugbd.* 473. *Dalib. Paris.* 152.

Chelidonium pedunculis unifloris, foliis amplexicaulibus sinuatis, caule glabro. *Linn. Spec. Pl.* 2. *p.* 734.

Chelidonium pedunculis unifloris. *Hort. Cliff.* 201. *Gron. Virg.* 57.

Papaver corniculatum luteum. *C. B. P.* 171.

Papaver corniculatum, flavo flore. *Clus. Hist.* 2. *p.* 91.

Glaucium flore luteo. Tour. *I. R. H.* 254.

Papaver corniculatum majus. *Dod. Pempt.* 448.

In arenosis ad Tyrrhenum. Folia sunt incisiva, abstergentia etc.

968. CHELIDONIVM (*corniculatum*) pedunculis unifloris, foliis sessilibus pinnatifidis, caule hispido. *Lin. Sp. Pl.* 3. 724.

Chelidonium hispidum, pedunculis unifloris. *Hor. Vpsal.* 138. *Sauv. Monsp.* 286.

Glaucium hirsutum, flore phoeniceo. *Tour. I. R. H.* 254.

Papaver corniculatum. *C. B. P.* 17.1

Ad S. Marinellam non procul a mari.

PAPAVER

CAPSVLIS HISPIDIS

969. PAPAVER (*hybridum vulgo* Papavero, o Argemone con capo piccolo, ed ispido) capsulis subglobosis, torosis, hispidis, caule folioso, multifloro. *Linn. Spec. Pl.* 1 *p.* 725.

Papaver foliis ternato - pinnatifidis, capsulis sulcatis, hispidis. *Hort. Cliff.* 201.

Papaver caule ramoso, foliis lineari-pinnatifidis, capsulis sulcatis, hispidis. *Hort. Vpsal.* 136.

Argemone capitulo breviore. *C. B. P.* 172.

Argemone capitulo hirsuto rotundo, torulis canaliculato. *Moris. Hist.* 2. *p.* 278. *Se.* 3. *t.* 14. *f.* 9. *Lob. Icon.* 276.

Ad agros multis in locis. Abstergit, et incidit.

970. PAPAVER (*Argemone vulgo* Papavero, o Argemone con il capo più sottile, più lungo, ed irsuto) capsulis clavatis, hispidis, caule folioso, multifloro. *Sp. Pl.* 2. *p.* 725.

Papaver capsulis hispidis, oblongo-turbinatis, sulcatis. *Flor. Svec.* 829. 466. *Dalib. Paris.* 152. *Gron. Orient.* 158.

Papaver foliis ternato-pinnatis, fructu angulato. *Hort. Cliff.* 201. *Roy. Lugbd.* 419. *Sauv. Monsp.* 252.

Argemone capitulo longiore. *C. B. P.* 172. *Lob. Icon.* 276.

Argemone capitulo tenuiore, longiore, hirsuto. *Moris. Hist.* 2. *p.*278. *Se.*3. *t.* 14. *f.* 10.

In campis arenosis, et viis campestribus multis in locis.

CAPSVLIS GLABRIS.

971. PAPAVER (*dubium vulgo* Papavero erratico con il capo lungo, e liscio) capsulis oblongis, glabris, caule multiflore, setis adpressis, foliis pinnatifidis incisis. *Flor. Spec.* 2. *n.* 467.

Papaver erraticum, capite longissimo, glabro. *Tour. I. R. H.* 238. *Rupp. Ien.*3. *p.*71.

Argemone capitulo longiore, glabro. *Moris. Hist.* 2. *p.* 279. *S.* 3. *t.* 14. *f.* 11.

Inter segetes.

972. PAPAVER (*Rhoeas vulgo* Papavero, e Papammero selvatico) capsulis glabris, globosis, caule piloso, multifloro, foliis pinnatifidis, incisis. *Linn. Spec. Pl.*6. *p.*726.

Papaver foliis pinnatifidis, hispidis, fructu ovato. *Hort. Cliff.* 201. *Roy. Lugbd.* 478. *Dalib. Paris.* 151. *Hall. Helv.* 303.

Papaver caule multifloro, folioso, hispido, foliis pinnatifidis, capsulis laevibus. *Hort. Vps.*136. *Sauv. Monsp.*252. *Gron. Orient.*157.

Papaver erraticum majus. *C. B. P.* 171.

Papaver Rhoeas prius. *Dalech. Hist.* 439.

Papaver erraticum minus. *C. B. P.* 171.

In arvis et campestribus.

973. PAPAVER (*somniferum*) calycibus, capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus incisis. *Linn. Spec. Pl.* 7. *p.*726.

Papaver caule multifloro, foliis simplicibus glabris, incisis caulinis. *Hort. Vpsal.* 135.

Papaver foliis simplicibus, glabris, incisis. *Hort. Cliff.* 200. *Roy. Lugbd.* 879. *Hall. Helv.* 303.

Papaver (*vulgo* Papavero ortense col seme bianco) hortense semine albo. *C. B. P.* 170. (*a*)

Papaver (*vulgo* Papavero con seme nero) hortense semine nigro. *C. B. P.* 170. (*b*)

Papaver (*vulgo* Papavero ciuffuto con semi, e fiori bianchi) cristatum, floribus, et semine album. *C. B. P.* 171. (*c*)

Papaver (*vulgo* Papavero ciuffuto con semi neri, e fiore rosso) cristatum, floribus rubris, semine nigro. *C. B. P.* 171. (*d*)

Papaver (*vulgo* Papavero doppio bianco) flore pleno, album. *C. B. P.* 171. (*e*)

In campis, et ruderatis. (a) (b) (c) (d) (e) seruntur in hortis. Demulcet, calefacit, est narcoticum. Ex ipso Meconium, et Opium extrahuntur.

NYMPHAEA

974. NYMPHAEA (*lutea vulgo* Ninfea di fiore giallo, *Nenufari officinarum*) foliis cordatis, integerrimis, calyce petalis majore,

pentaphyllo. *Flor. Lapp.*218. *Flor. Svec.*426. 469. *Hort. Cliff.*203. *Roy. Lugbd.*480. *Dalib. Paris.* 150.

Nymphaea lutea major. *C. B. P.*193.

Nymphaea lutea. *Cam. Epit.*635.

Ad Pontinas lacunas, et ad Nympham.

975. NYMPHAEA (*alba vulgo* Ninfea, e Nenufari di fiori bianchi) foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. *Linn. Spec. Pl.* 2.*p.* 729.

Nymphaea calyce tetraphyllo, corolla multiplici. *Flor. Lapp.* 219. *Flor. Svec.* 427. 470. *Hort. Cliff.*203. *Roy. Lugbd.*480. *Dalib. Paris.* 150.

Nymphaea alba major. *C. B. P.*193.

Nymphaea alba. *Cam. Epit.* 634.

Ad lacunas Pontinas et in lacu montis vulgo Fiorito. Aperientes, humectantes, refrigerantes.

T I L I A

976. TILIA (*Europaea vulgo* Tiglio di foglia) floribus nectario destitutis. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p.* 733.

Tilia. *Hort. Cliff.* 204. *Flor. Svec.* 432. 471. *Roy. Lugbd.* 477. *Dalib. Paris.* 153.

Tilia femina, folio majore. *C. B. P.*426.

Tilia Vrbana. *Gesn. tab.*111.

Tilia (*vulgo* Tiglio maggiore) montana maximo folio . *C. B. P.* 426. *(a)*

Tilia (*vulgo* Tiglio minore) femina folio minore . *C. B. P.* 246. *(b)*

In montanis pluribus in locis . Commendatur contra epilepsiam infantum , vertiginem , morbum hypocondriacum , apoplexiam item pro urina, et menstruis provocandis etc.

C I S T V S

E X T I P V L A T A E F R V T I C O S A E

977. CISTVS (*pilosus vulgo* Cisto maschio) arborescens , extipulatus , foliis ovatis , petiolatis , hirtis . *Linn. Spec. Pl.* 2. *p.*736.

Cistus mas , folio rotundo , hirsutissimo . *C. B. P.* 464.

Cistus mas , major, folio rotundiore . *I. B. Duham. Arb.* 1. *p.* 167. *t.* 64.

Cistus mas Matthioli . *Dalech. Hist.*222.

Ad Sylvacciam Corneti , et alibi .

978. CISTVS (*ladanifera vulgo* Cisto ladanifero) arborescens extipulatus , foliis lanceolatis , supra laevibus , petiolis basi coalitis , vaginantibus . *Hort. Cliff.*205. *Sauv. Monsp.* 147. 150.

Cistus ladanifera , Hispanica , incana . *C. B. P.* 467.

Cistus Ledon. I. angustifolius . *Clus. Hist.* 1. *p.* 77.

Cistus Ledon flore macula nigricante notato. *I. B. Comm. Hort.* 1. *p.* 39. *t.* 20. *(a)*

Cistus (*Citisus*) Ledon altissimus, foliis ovatis utrinque acuminatis, petiolatis, argenteis, floribus luteis parvis, splendentibus, ad ungulas in utraque parte macula sature nigra, et rutilante notatis. *Cat. Pl. Agr. Rom. Maratti. (b)*

Ad montes Vallis Corsae. Flores emolliunt, et maturant. Ex ipso trasudat Ladanum, optimum in diarrhoea, dysenteria etc.

979. CISTVS (*incanus*, *vulgo* Cisto maschio con foglia stretta tomentosa) arborescens, extipulatus, foliis spatulatis, tomentosis, rugosis, inferioribus basi vaginantibus, connatis. *Hort Cliff.* 205. *Hort. Vpsal.* 143. *Roy. Lugbd.* 475.

Cistus mas angustifolius. *C. B. P.* 464.

Cistus mas 2. *Clus. Hist.* 1. *p.* 69.

Ad sylvas Ostiae, Maccaresi, et alibi.

980. CISTVS (*albidus vulgo* Cisto maschio con foglia lunga biancheggiante) arborescens, extipulatus, foliis ovato-lanceolatis, tomentosis, incanis, sessilibus, subtrinerviis. *Sauv. Monsp.* 150.

Cistus mas folio oblongo incano. *C. B. P.* 464.

Cistus mas 1. *Clus. Hist.* 1. *p.* 68.

Cistus mas 4. Monspelliensis, folio oblongo albido. *I. B. Hist.* 2. *p.* 3.

In sylvis maritimis etc.

981. CISTVS (*salvifolius vulgo* Cisto femina con foglia di Salvia) arborescens extipulatus, foliis ovatis, petiolatis, utrinque hirsutis. *Hort. Cliff.* 205. *Roy. Lugbd.* 475. *Sauv. Monsp.* 150.

Cistus femina, folio Salviae. *C. B. P.* 464.

Cistus femina. *Clus. Hist.* 1. *p.* 70.

Habitat fere semper eisdem in locis cum superiori.

982. CISTVS (*Libanotis vulgo* Cisto arborescente, con foglie strette) arborescens, extipulatus, foliis revoluto-linearibus, floribus umbellatis. *Linn. Spec. Pl.* 13. *p.* 739.

Cistus angusto Libanotidis folio, flore singulari. *Barr. Icon.* 294.

Cistus Ledon angustis foliis. *C. B. P.* 497.

In sylvis Porcigliani etc.

EXTIPVLATI, SVFFRVTICOSI

983. CISTVS (*umbellatus*) suffruticosus procumbens extipulatus, foliis oppositis, linearibus, floribus umbellatis. *Linn. Spec. Pl.* 14. 739.

Cistus foliis linearibus non stipulatis, caule florali umbellato lignoso. *Guett. Stamp.* 2. *p.* 180. *Dalib. Paris.* 158.

Cistus Ledon foliis Thymi. *C. B. P.* 467.
Ledon X. *Clus. Hist.* 1. *p.*81.

Ad Sevetum.

984. CISTVS (*laevipes vulgo* Eliantemo con foglie d'Erica, e fiore giallo) suffruticosus, adscendens, extipulatus, foliis alternis fasciculatis, linearibus, glabris, pedunculis racemosis. *Amoen. Acad.* 4. *p.* 275.

Chamaecistus Ericae folio, luteus, elatior. *C. B. P.* 466.

Helianthemum tenuifolium, glabrum, erectum, luteo flore. *I. B. H.* 2. *p.* 18.

Ad montes Soractum, et Sorianos, ad Aquam Transversam et alibi.

985. CISTVS (*Italicus vulgo* Eliantemo con foglie di Serpollo villose, con fiori smorti) suffruticosus extipulatus, foliis oppositis, hispidis, inferioribus ovatis, superioribus lanceolatis, ramis patentibus. *Linn. Spec. Pl.* 17. *p.* 740.

Helianthemum Serpylli folio villoso, flore pallido, Italicum. *Barr. Rar.* 510. *t.*366.

Ad Falerium et montem Arsiccium.

986. CISTVS (*marifolius*, *vulgo* Eliantemo con foglie di Timo, e fiori gialli) suffruticosus, extipulatus, foliis oppositis, oblongis, petiolatis, planis, subtus incanis. *Linn. Spec. Plant.* 19. *p.* 741.

Helianthemum alpinum, foliis Pilosellae minoris. *Fuch. I. B. Hist.* 2. *p.* 18. *Segu. Veron.* 3. *p.* 196.

Helianthemum, foliis ad terram congestis, superne pilosis inferne tomentosis. *Hall. Helv.* 359.

Helianthemum luteum, Thymi durioris folio. *Barr. Rar.* 521. *t.* 441.

Ad Baucum et Fellettinum.

EXTIPVLATI, ERBACEI

987. CISTVS (*guttatus vulgo* Eliantemo con fiori macchiati) herbaceus, extipulatus, foliis oppositis lanceolatis trinerviis, racemis ebracteatis. *Huds. Angl.* 204.

Cistus annuus, foliis radicalibus oppositis lanceolatis trinerviis, ramiferis ternatis linearibus. *Sauv. Monsp.* 148.

Cistus foliis oblongo-acuminatis, non stipulatis, caule florali racemoso. *Guett. Stamp.* 2. *p.* 181. *Dalib. Paris.* 158.

Cistus flore pallido, punicante macula insignito. *C. B. P.* 465.

Helianthemum flore maculoso. *Col. Ecphr.* 2. *p.* 78. *t.* 77.

Ad Trebulum, et Januarium.

STIPVLATI SVFFRVTICOSI

988. CISTVS (*serpillifolius*) suffruticosus,

stipulatus, foliis oblongis, calycibus laevibus. *Sauv. Monsp.* 148.

Chamaecistus luteus, Thymi folio, Oliganthes. *Barr. Icon.* 44.

Ad Sevetum montem.

989. CISTVS (*surreianus*, *vulgo* Eliantemo volgare) suffruticosus, procumbens, stipulatus, foliis-ovato-oblongis, subpilosis, petalis lanceolatis. *Huds. Angl.* 205.

Helianthemum vulgare, petalis florum perangustis. *Dill. Helt.* 177. *t.* 145. *f.* 174.

Ad Aquam Transversam etc.

990 CISTVS (*hirtus* *vulgo* Eliantemo con foglie strette di Serpollo villose, e fiori gialli) subfructicosus, stipulatus, foliis ovatis, calycibus hispidis. *Linn. Spec. Pl.* 34. *p.* 744.

Cistus foliis lanceolato-linearibus, integerrimis, subtus incanis. *Gron. Orient.* 169.

Cistus foliis oblongo-linearibus, margine revolutis. *Le Monier. Obs.* 229. *Sauv. Monsp.* 148.

Cistus Ledon, Roris marini foliis subtus incanis. *C. B. P.* 467.

Helianthemum angusto Serpilli folio, villosum, flore aureo, Italicum. *Barr. Rar.* 511. *t.* 488.

Ad Septem pagos Vejetanos etc.

991. CISTVS (*apenninus*, *vulgo* Eliantemo con fiori bianchi) suffruticosus, stipulatus, pa-

tulus, foliis lanceolatis, hirtis. *Linn. Spec. Pl.* 35. *p* 744.

Helianthemum album Germanicum. *Tabern. Icon.* 1062.

Helianthemum saxatile, foliis, et caulibus incanis oblongis, floribus albis. *Mentz. pag.* 8. *f.* 3. *Dill. Elth.* 170.

Ad Serram D. Antonii.

992. CISTVS (*Helianthemum*, *vulgo* Panace Chironio) suffruticosus, procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis, revolutis, subpilosis. *Sp. Pl.* 33. 744.

Cistus stipulis quaternis, foliis oblongis utrinque nudis, caule procumbente. *Hort. Cliff.* 206. *Flor. Svec.* 433. 472.

Chamaecistus vulgaris flore luteo. *C. B. P.* 465. *Loes. Pruss* 43. *t.* 8.

Flos solis, Panax Chironium. *Cam. Epit.* 501.

Ad Aquam Transversam, et fere in omnibus collibus.

Helianthema, vi aromatica balsamica, sunt vulneraria, et demulcentia etc.

POLYANDRIA DIGYNIA

PAEONIA

993. PAEONIA (*officinalis*) foliolis oblongis. *Hort. Cliff.* 212. *Sauv. Monsp.* 307.

Paeonia (*vulgo* Peonia volgare, o femina) foliis deformiter lobatis. *Hall. Helv.* 311. (*a*)

Peonia communis, sive femina. *C. B. P.*323.

Paeonia femina. *Fuchs. Hist.* 202. *Lob. Icon.* 602.

Paeonia (*Peonia maschio*) foliis lobatis, et ovato-lanceolatis. *Hall. Helv.*311. (*b*)

Paeonia folio nigicante, splendido, quae mas. *C. B. P.* 323.

Paeonia mas. *Lob. Icon.*684.

Ad nemora montium S. Eliae etc. Radix maris effossa mense martio circa Novilunium vel Plenilunium laudatur in motibus convulsivis, vertigine, tremore, paralysi, epilepsia puerorum, et menstruis obstructis. In floribus eadem est virtus ac in Papavere, ad somnum conciliandum etc.

POLYANDRIA TRIGYNIA

DELPHINIVM

994. DELPHINIVM (*Consolida vulgo* Sprone di Cavaliere campestre) nectariis monophyllis, caule subdiviso. *Hort. Cliff.*212. *Flor. Svec.* 440. 476. *Mat. Med.* 268. *Roy. Lugbd.* 482. *Dalib. Paris.* 158.

Consolida regalis arvensis. *C. B. P.* 142.

Consolida regalis. *Cam. Fpit.* 521.

In campis multis in locis.

995. DELPHINIVM (*Ajacis vulgo* Sprone di Cavaliere ortense con fiore grande, e sdoppio) nectariis monophyllis, caule simplici. *Hort. Cliff.* 213. *Hort. Vpsal.* 150. *Roy. Lugbd.*482.

Consolida regalis hortensis, flore minore. *C. B. P.* 142.

Consolida regalis hortensis, flore majore et simlici. *C. B. P.* 142.

Consolida regalis, flore majore, et multiplici. *C. B. P.* 142.

Fos regius. *Dod. Pempt.* 252.

In hortis et fictilibus etiam seritur. Dantur varietates circa colorem, et magnitudinem florum.

996. DELPHINIVM (*peregrinum vulgo* Sprone di Cavaliere con fronda grande, e fiori piccoli) nectariis diphyllis, corollis enneapetalis, capsulis ternis, foliis multipartitis obtusis. *Hort. Cliff.* 213.

Consolida regalis latifolia, parvo flore. *C. B. P.* 142. *Prodr.* 74. *t.* 74. *Moris. Hist.* 3. *p.* 466. *Se.* 12. *t.* 4 *f.* 3.

Ad Aquam transversam, Villam madama, et alibi.

997. DELPHINIVM (*Staphisagria vulgo* Stafisagria) nectariis diphyllis, petalo brevioribus, foliis palmatis, lobis obtusis. *Hort. Cliff.* 213. *Roy. Lugbd.* 482. *Sauv. Monsp.* 214.

Staphisagria *C. B. P.* 324. *Dod. Pempt.* 366.

Ad Sermonetam, ad Vallem Pretam etc. Est planta venenata. In aqua rosacea macerata, externe applicata, valet in inflammatione oculorum.

ACONITVM

998. ACONITVM (*lycoctonum vulgo* Aconito licoctono) foliis palmatis multifidis, villosis. *Linn. Spec. Pl.* 1. *p*.750.

Aconitum lycoctonum luteum. *C. B. P.* 183.

Aconitum foliis peltatis, multifidis, petalo supremo cylindraceo. *Hort. Cliff.* 213. *Roy. Lugbd.* 482. *Hall. Helv.* 312.

Aconitum foliis palmatis peltatis, laciniis multifidis glabris, floribus albis. *Cat. Pl. Agri Rom. Maratti.*

Aconitum lycoctonum flore luteo. *Besl. Eyst. aest.* 25. *f.* 2.

Habitat ad collem Altillum, et Arsinaccis. Est planta venenata!

999. ACONITVM (*variegatum vulgo* Napello minore) foliis multifidis laciniis semipartitis, superne latis. *Hort. Cliff.* 214. *Roy. Lugbd.* 482.

Aconitum caeruleum minus, sive Napellus minor. *C. B. P.* 183.

Aconitum caeruleum parvum. *Dod. Pempt.* 441. *Dalech. Hist.* 1743.

Ad montem Fiscellum habitat.

POLYANDRIA PENTAGYNIA

AQVILEGIA

1000. Aquilegia (*vulgaris vulgo* Aquilegia) nectariis incurvis. *Hort. Vpsal.* 152. *Flor. Svec.* 2. *n.* 478.

Aquilegia. *Hort. Cliff.* 215. *Roy. Lugbd.* 482. *Dalib. Paris.* 160.

Aquilegia sylvestris. *C. B. P.* 144.

Aquilegia (*vulgo* Aquilegia ortense con fiore sdoppio) hortensis simplex. *C. B. P.* 144. (*a*)

Aquilegia (con fiore doppio grande) hortensis multiplex flore magno. *C. B. P.* 144. (*b*)

Aquilegia (con fiore doppio rivolto) hortensis multiplex, flore inverso. *C. B. P.* 144. (*c*)

Aquilegia (con fiore doppio roseo) flore roseo multiplici. *C. B. P.* 144. (*d*)

In nemoribus montanis multis in locis, ut ad Fajolam, Saccaratam etc. Varietates a. b. c. d. coluntur in viridariis. Sunt aperientes, sudoriferæ, penetrantes, vulnerariæ, calefacientes etc.

NIGELLA

1001. NIGELLA (*Damascena vulgo* Nigella, e Melantio con foglia stretta, e fiore grande turchino sdoppio) floribus involucro folioso cinctis. *Hort. Cliff.* 215. *Roy. Lugbd.* 481. *Mill. Dict. t.* 187. *f.* 2.

Nigella angustifolia, flore majore simplici, caeruleo. *C. B. P.* 145.

Melantium sylvestre. *Matth. Dioscor.* 529.

Nigella (Nigella con fiore grande, e doppio, ceruleo) flore majore pleno, caeruleo. *C. B. P.* 145. (*a*)

Inter segetes multis in locis.

1002. NIGELLA (*arvensis vulgo* Erba Fravola *ob semina talem in odore spirantia*) pistillis quinis, petalis integris, capsulis turbinatis. *Linn. Spec. Pl.*3. *p.*753.

Nigella flore foliis nudo, pistillis corollam aequantibus. *Hort. Cliff.*215. *Roy. Lugbd.*481. *Hall. Helv.* 316. *Dalib. Paris.* 160. *Boehm. Lips.* 174.

Nigella arvensis, cornuta. *C. B. P.* 145.

Melanthium sylvestre alterum. *Cam. Epit.*553.

In agris multis in locis. Est aperiens, incidens, resolvens calefaciens, antinephritica, et carminativa etc.

POLYANDRIA POLYGYNIA

ANEMONE

HEPATICAE FLORE CALYCATO

1003. ANEMONE (*Hepatica*, *vulgo* Trifolio Epatico, ed Erba Trinitas delle spezierie) foliis trilobis integerrimis. *Linn. Spec. Pl.*1. *p.* 758.

Hepatica. *Hort. Cliff.* 223. *Gron. Virg.* 61. *Roy. Lugbd.* 487.

Trifolium hepaticum, flore simplici, et pleno. *C. B. P.*339.

In nemoribus montanis multis in locis. Dantur varietates circa florum colorem etc. Tota planta convenit in obstructionibus renum, vesicae, et hepatis etc.

PVLSATILLAE PEDVNCVLO INVOLVCRATO SEMINIBVS LANATIS.

1004. ANEMONE (*patens*, *vulgo* Pulsatilla con fiore violaceo, e Anemolo di montagna) pedunculo involucrato, foliis digitatis, multifidis. *Linn. Spec. Pl.* 3.*p.* 759.

Pulsatilla folio Anemones secundae, seu subrotundo. *C. B. P.* 94. *Prodr.* 94.

Pulsatilla polyanthos violacea, Anemones folio. *Breyn. Cent.* 132.

Pulsatilla Anemones folio dissecto, lanuginosa, flore majore dilute luteo patente. *Amm. Ruth.* 104.

Vivit ad montes Algidum, et Capistrelli. Pulsatilla habet radicem acrem, et ideo etc.

1005. ANEMONE (*Pulsatilla vulgo* Pulsatilla con fiore maggiore, e foglia più grossa, e Anemolo etc.) pedunculo involucrato, petalis rectis, foliis bipinnatis. *Linn. Spec. Pl.* 5.*p.* 759.

Pulsatilla foliis decompositis, pinnatis, flore nutante, limbo erecto. *Hort. Cliff.* 223. *Roy. Lugbd.* 487. *Dalib. Paris.* 160. *Sauv. Monsp.* 254.

Pulsatilla folio crassiore, et majore flore. *C. B. P.* 177.

Pulsatilla. *Cam. Epit.* 398.

In collibus apricis.

1006. ANEMONE (*hortensis vulgo* Anemolo ortense con foglia larga) foliis digitatis. *Linn. Spec. Pl.* 9. *p.* 761.

Pulsatilla foliis digitatis. *Hort. Cliff.* 224.

Anemone hortensis latifolia. *C. B. P.* 176. 3. *Clus. Hist.* 1. *p.* 249.

Anemone I. *Dod. Pemt.* 434.

In hortis colitur.

ANEMOIDEAE FLORE NVDO SEMINIBVS ECAVDATIS.

1007. ANEMONE (*sylvestris vulgo* Anemolo salvatico con fiore bianco) pedunculo nudo, seminibus subrotundis hirsutis. *Linn. Spec. Pl.* 10. *p.* 761.

Anemone seminibus hirsutis. *Flor. Svec.* 449. 484. *It. Oel.* 112.

Anemone seminibus seta plumosa terminatis. *Hort. Cliff.* 224. *Roy. Lugbd.* 224.

Anemone sylvestris alba, major. *C. B. P.* 176.

Anemone sylvestris. *I. Clus. Hist.* 1. *p.* 244.

Anemone sylvestris alba, minor. *C. B. P.* 176. *Prodr* 93. *Burs.* IX. 79.

Ad montes Soriani et Calvi etc.

1008. ANEMONE (*nemorosa vulgo* Anemolo di macchia con fiore maggiore) seminibus acutis, foliolis incisis, caule unifloro. *Hort. Cliff.* 224. *Dalib. Paris.* 161.

Anemone nemorosa, flore majore. *C.B.P.*176.
Ranunculus sylvarum. *Clus. Hist.*247.

In nemoribus Triviglianí, et Fajolae.

1009. ANEMONE (*Apennina, sive Romana vulgo* Ranuncolo di montagna) seminibus acutis, foliolis incisis, petalis lanceolatis numerosis. *Linn. Spec. Pl.* 16. *p.* 762. *Huds. Angl.* 209.

Ranunculus nemorosus, flore caeruleo, Apennini montis. *Mentz. pug. t.* 8. *f.*2.

Ranunculus nemorosus (con fiore turchino porporascente) flore purpureo-caeruleo. *Park. Theat.* 325. *Rai. Angl.*3. *p.*259. *(a)*

Anemone (con fiore turchino, e foglie laciniate) Gerani Robertiani folio, caerulea. *C. B. P.* 174. *(b)*

Anemone Geranii Robertiani folio, flore semipleno, ex albo rubente. *Cat. Plant. Agr. Rom. Maratti. (c)*

In sylvis Ariciae, Fajolae etc. (c) intra moenia Urbis in via a janua S. Joannis ad Ecclesiam S. Crucis in Jerusalem dextrorsum. Plures varietates coluntur ob florum venustatem.

1010. ANEMONE (*ranunculoides vulgo* Ranuncolo di macchia con fiore giallo) seminibus acutis, foliolis incisis, petalis subrotundis, caule subbifloro. *Hort. Cliff.*125. *Roy. Lugbd.*488. *Dalib. Paris.* 161.

Ranunculus nemorosus luteus. *C. B. P.* 178.

Ranunculus phragmites, luteus, nemorosus. *I. B. Hist.* 3. *p.* 413.

In pratis montanis nemorosis.

CLEMATIS

SCANDENTES

1011. CLEMATIS (*Vitalba vulgo* Vitalba e Stroppa) foliis pinnatis, foliolis cordatis candentibus. *Hort. Cliff.* 225. *Roy. Lugbd.* 486. *Hall. Helv.* 334. *Gron. Virg.* 63. *Sauv. Monsp.* 259. *Gort. Gelr.* 315.

Clematis latifolia integra *I. B. H.* 2. *p.* 125.

Clematis tertia. *Cam. Epit.* 697.

Clematis latifolia dentata *I. B. H.* 2. *p.* 125 (*a*)

Vitalba *Dod. Pempt.* 404.

Clematis sylvestris, latifolia *C. B. P.* 300. *Sloan. Jam.* 84. (*b*)

In sepibus frequentissima, et in sylvis.

1012. CLEMATIS (*Flammula vulgo* Flammola strata per terra, e Vitabia) foliis inferioribus pinnatis, scandentibus, laciniatis, summis simplicibus, integerrimis, lanceolatis. *Hort. Cliff.* 225. *Roy. Lugbd.* 486. *Hall. Helv.* 334. *Sauv. Monsp.* 249.

Clematis sive Flammula repens *C. B. P.* 300. *Rai Hist.* 621.

Flammula. *Dod. Pempt.* 404. *Dal. Hist.* 1171.

Clematis scandens, foliis partim pinnatis et laciniatis, partim integris, floribus flavescentibus. *Cat. Pl. Agr. Rom. Maratti.*

Ad sepes, et dumeta.

ERECTAE

1013. CLEMATIS (*maritima vulgo* Vitalba, e Vitabia marittima repente) foliis pinnatis linearibus, caulibus simplicibus, hexagonis. *Linn. Spec. Pl.* 10. *p.* 767.

Clematis maritima, repens. *C. B. P* 300. *Prodr.* 135. *Allion. Nic.* 122.

Ad litora nostri maris Tyrrheni.

THALICTRVM

1014. THALICTRVM (*tuberosum vulgo* Talictro minore) floribus pentapetalis, radice tuberosa. *Hort Cliff.* 226. *Roy Lugbd* 486.

Thalictrum minus, Asphodeli radice, magno flore. *Tour. I. R. H.* 271.

Thalictrum minus, grumosa radice, floribus majoribus. *Herm. flor.* 9. *Boerh. Lugbd.* 1. *p.* 45.

In montibus Soriani etc.

1015. THALICTRVM (*Cornuti vulgo* Talictro maggiore con foglie di Acquilegia) floribus pentapetalis, radice fibrosa. *Roy. Lugbd.* 486.

Thalictrum Canadense. *Corn. Canaden.* 186.

Thalictrum Americanum. *Park. Theat.* 265.

Thalictrum majus, foliis Aquilegiae, flore albo. *Moris. Hist.* 3. *p.* 325.

Ad Selvottum Ariciae, ad Fajolam et alibi.

1016. THALICTRVM (*minus vulgo* Talictro minore) foliis sexpartitis, floribus cernuis. *Linn. Spec. Pl.* 6. *p.* 769.

Thalictrum caule folioso, foliolis caulinis acutis, panicula divaricata, floribus nutantibus. *Flor. Svec.* 454. 489. *Dalib. Paris.* 454.

Thalictrum minus. *C.B.P.*335. *Dod. Pempt.*58.

Ruta pratensis minor. *Tabern. Icon.* 55.

In pratis montanis.

1017. THALICTRVM (*flavum vulgo* Talictro maggiore pratense con la siliqua angolata) caule folioso, sulcato, panicula multiplici, erecta. *Hort. Cliff.* 226. *Roy. Lugbd.* 485. *Hall. Helv.* 308. *Dalib. Paris.* 162.

Thalictrum pratense. *Flor. Lapp.* 224.

Thalictrum majus, siliqua angulosa, sive striata. *C. B. P.* 336.

Thalictrum magnum. *Dod. Pempt.* 58.

In subhumidis pratis, ubi dumeta.

1018. TALICTRVM (*angustifolium vulgo* Talictro pratense con foglia stretta) foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. *Hort. Cliff.* 226. *Roy. Lugbd.* 478. *Hall. Helv.* 308. *Sauv. Monsp.* 250.

Thalictrum pratense angustissimo folio. *C.B.P.* 337.*Prodr.*146. *t.*146. *Pluk. Alm.*364.*t.*65.*f.*6.

In sylvosis pratis Fellettini, et collis Altilli. etc.

1019. THALICTRVM (*Aquilegifolium*) fructibus pendulis, triangularibus, rectis, caule tereti. *Linn. Spec. Pl.* 12. 770.

Thalictrum seminibus triangularibus, pendulis, stipulis caulinis. *Hort. Cliff.* 226. *Roy. Lugbd.* 285. *Hall. Helv.* 309.

Thalictrum majus, florum staminibus purpurascentibus. *C. B. P.* 337.

Thalictrum majus, folliculis angulosis, caule laevi. *I. B. Hist.* 3. *p.* 487.

Thalictrum majus, caule laevi, Aquilegiae foliis, fructibus pendulis triangularibus, floribus albis, staminibus luteis.

Ad selvottum, Fajolam, Saccaratam, Malam Cryptam etc.

1020. THALICTRVM (*rugosum*) majus, siliqua seminis striata, foliis rugosis, trifidis. *Moris. Umbell.* 70.

Thalictrum pratense maximum Monspelliensium, asperioribus foliis, seu folio rugoso. *Mor. H. R. Bles.*

Thalictrum pratense majus Monspelliensium, foliis rugosis. *H. R. Paris.*

In pratis montanis etc. Thalictrum est aperiens, corroborans, et intestina firmans, uti Rhabararum, sed dosi dupla.

ADONIS

1021. ADONIS (*aestivalis vulgo* fiore di Adone) floribus pentapetalis, fructibus ovatis. *Mill. Lex.*

Adonis (*vulgo* Fiore di Adone Feniceo) sylvestris, flore phoeniceo, ejusque foliis longioribus. *C. B. P.* 178. (*a*)

Adonis (*vulgo* Fiore di Adone pallido) flore pallido. *Cam. Epit.* 648. (*b*)

Inter segetes multis in locis.

1022. ADONIS (*autumnalis vulgo* Fiore di Adone maggiore, e minore) floribus octopetalis, fructibus subcylindricis. *Hort. Vpsal.* 156.

Adonis radice annua. *Hort. Cliff.* 321. *Roy. Lugbd.* 488. *Dalib. Paris.* 162. *Sauv. Monsp.* 253.

Adonis flore majore. *C. B. P.* 178.

Adonis hortensis flore minore atrorubente. *C. B. P.* 178.

Flos Adonis. *Clus. Hist.* 1. *p.* 336.

Ad Aquam Transversam, ad rudera Cryptae Rubrae. In segetibus, sed non tam frequens. Causticam vim habet.

RANVNCVLVS FOLIIS SIMPLICIBVS

1023. RANVNCVLVS (*Flammula vulgo* Ranuncolo acquatico procumbente) foliis ovato-lanceolatis, petiolatis, caule declinato.

Hort. Cliff. 228. *Roy. Lugbd.* 489. *Haller. Helv.* 322. *Dalib. Paris.* 163.

Ranunculus foliis ovato-oblongis integerrimis, caule procumbente. *Flor. Lapp.* 325.

Ranunculus longifolius palustris minor. *C. B. P.* 180.

Flammula Ranunculus. *Dod. Pempt.* 432.

Ad lacum Alubrae, et ad aquas Pontinas.

1024. RANVNCVLVS (*lingua vulgo* Ranuncolo palustre con foglia lunga) foliis lanceolatis, caule erecto. *Hort. Cliff.* 228. *Flor. Svec.* 457. *Roy. Lugbd.* 489. *Dalib. Paris.* 163.

Ranunculus longifolius, palustris, major. *C. B. P.* 34.

Ranunculus lanceolatus, major. *Tabern. Icon.* 48.

Ad lacunas Pontinas, et ad aquas limosas Aquae Transversae etc.

1025. RANVNCVLVS (*ficaria vulgo* Celidonia minore con foglia sana, e rotonda) foliis cordatis, angulatis, petiolatis. *Hort. Cliff.* 228. *Roy. Lugbd.* 490. *Dalib. Paris.* 167.

Chelidonia rotundifolia minor. *C. B. P.* 309.

Chelidonium minus. *Fuchs. Hist.* 866.

Scrophularia minor, sive Chelidonium minus vulgo dictum. *I. B.* 3. 468.

Ranunculus vernus rotundifolius minor maculatus. *Tour. I. R. H.* 286.

Ranunculus vernus rotundifolius flore pleno *Tour. I. R. H.* 286.

Ranunculus vernus rotundifolius, petalis florum gemino ordine digestis. *Tour. I. R. H.* 286.

Chelidonia rotundifolia minor, duplici florum serie in flore. *H. R. Paris.*

In locis humidiusculis etiam secus vias campestres.

FOLIIS DISSECTIS ET DIVISIS

1026. RANVNCVLVS (*sceleratus vulgo* Ranuncolo palustre con foglie d'Apio liscie) foliis inferioribus palmatis, summis digitatis, fructibus oblongis. *Hort. Cliff.* 230. *Roy. Lugbd.* 490. *Hall. Helv.* 325. *Gron. Virg.* 63. *Dalib. Paris.* 167.

Ranunculus palustris Apii folio, laevis. *C. B. P.* 180.

Ranunculus sylvestris *I. Dod. Pempt.* 426.

Ad margines fossarum, et paludum.

1027. RANVNCVLVS (*auricomus*) foliis radicalibus reniformibus crenatis incisis, caulinis digitatis linearibus, caule multifloro. *Hort. Cliff.* 229. *Roy. Lugbd.* 490. *Hall. Helv.* 327. *Dalib. Paris.* 167.

Ranunculus nemorosus sive sylvaticus, folio subrotundo. *C. B. P.* 178.

Ranunculus I. sylvestris. *Dalech Hist.* 1028.

In pascuis humentibus etc.

1028. RANVNCVLVS (*rutilans*) sylvestris ramosus multiflorus, floribus sature luteis rutilantibus, foliis radicalibus petiolatis subrotundis, profunde lobatis, lobis tridentatis, superioribus digitatis sessilibus. *Cat. Pl. Ag. Rom. Mar.* 1758.

Non procul a lacu Regillo.

1029. RANVNCVLVS (*Illyricus*) foliis ternatis integerrimis lanceolatis. *It. Oel.* 71. *Fl. Svec.* 471. 500.

Ranunculus foliis tripartitis, laciniis linearibus, caule multifloro, radice tuberosa. *Hort. Ciff.* 230. *Roy. Lugbd.* 491. *Sauv. Monsp.* 181.

Ranunculus lanuginosus angustifolius, glumosa radice, major, et minor. *C. B. Pin.* 181.

Ranunculus glumosa radice. 4. *Clus. Hist.* 1. *p.* 240.

Ad Trebulum etc.

1030. RANVNCVLVS (*Asiaticus vulgo* Ranuncolo ramoso, con radice grumosa) foliis ternatis, biternatisque, foliolis trifidis incisis, caule inferne ramoso. *Mill. Dict. t.* 216.

Ranunculus foliis tripartitis, laciniatis, cau-

le inferne ramoso, radice tuberosa. *Hort. Cliff.* 230. *Hort. Vpsal.* 156. *Roy. Lugbd.* 490.

Ranunculus grumosa radice, ramosus. *C.B.P.* 181.

Ranunculus Asiaticus polyclonos, sive grumosa radice. 2. *Clus. Hist. I. p.* 241.

Ranunculus (*vulgo* Ranuncolo con fiore giallo) grumosa radice, flore flavo vario *C. B. P.* 181. (*a*)

Ranunculus (*vulgo* Ranuncolo con fiore bianco) grumosa radice, flore albo. *C. B. P.* 181. (*b*)

Ranunculus (*vulgo* Ranuncolo con fiore bianchissimo) grumosa radice flore niveo. *C. B. P.* 181. (*c*)

Ranunculus (*vulgo* Ranuncolo con fiore sanguigno) Asphodeli radice, flore sanguineo. *C. B. P.* 181. (*d*)

Ranunculus (*vulgo* Ranuncolo con radica d'Asfodelo, e fiore colore di porpora) Asphodeli radice, flore subphoeniceo rubente. *C. B. P.* 181. (*e*)

Ranunculus Asphodeli radice, prolifer, miniatus. *C. B. P.* 181.

Dantur plures aliae varietates ex colore distinctae. Ad ornatum coluntur.

1031. RANVNCVLVS (*Monspelliensis*) foliis tripartitis crenatis, caule simplici villoso subnudo unifloro. *Sauv. Monsp.* 181.

Ranunculus saxatilis magno flore. *C. B. P.* 182. *Prod.* 96.

Ad Tretinas rupes.

1032. RANVNCVLVS (*bulbosus vulgo* Ranuncolo pratense con radica simile ad un Vertecchio) calycibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis compositis. *Flor. Svec.* 469. 504. *Dalib. Paris.* 165.

Ranunculus radice simplici globosa. *Hort. Cliff.* 230. *Roy. Lugbd.* 491. *Hall. Helv.* 323.

Ranunculus bulbosus. *Lod. Icon.* 666. *Flor. Lapp* 229.

Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotunda. *C. B. P.* 179.

Ad Aquam Transversam. In pascuis pratisve humidulis.

1033. RANVNCVLVS (*repens vulgo* Ranuncolo pratense serpeggiante, ed irsuto) calycibus patulis, pedunculis sulcatis, sarmentis repentibus, foliis compositis. *Flor. Svec.* 468. 505.

Ranunculus foliis ternatis, foliolis petiolatis trifidis, medio productiore, caule multifloro. *Hort. Cliff.* 230. *Gron. Virg.* 166. *Roy. Lugbd.* 491.

Ranunculus pratensis, repens, hirsutus. *C. B. P.* 179.

Ranunculus hortensis. I. *Dod. Pempt.* 425.

In cultis, et incultis passim invenitur.

1034. RANVNCVLVS) *Polyanthemus vulgo* Ranuncolo con più fiori, e questi sdoppj) calycibus patulis, pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis multi-partitis. *Flor. Svec.* 467. 506.

Ranunculus polyanthemos, simplex. *Lob. Icon.* 666.

Ranunculus sylvestris. *Tabern. Icon.* 42. *Hist.* 117.

Ad Araemulam, et ad Alubram.

1035. RANVNCVLVS (*acris vulgo* Ranuncolo pratense dritto, ed acre) calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartitomultifidis, summis linearibus. *Flor. Svec.* 466. 507. *Dalib. Paris.* 164.

Ranunculus foliis peltatis, quinquangularibus multipartitis, laciniis linearibus, caule multifloro. *Hort. Cliff.* 231. *Roy. Lugbd.* 492.

Ranunculus pratensis, erectus, acris. *C. B. P.* 178.

Ranunculus hortensis. *Dod. Pempt.* 426.

Ranunculus hortensis repens, foliis multipar-

titis, floribus parvis plenis luteis rutilantibus. *Cat. Pl. Agr. Rom. Maii* 1765.

In hortis, et pratis humidiusculis.

1036. RANVNCVLVS (*Arvensis*, *vulgo* Ranuncolo campestre con capo spinoso) seminibus aculeatis, foliis superioribus decompositis, linearibus. *Hort. Cliff.* 229. *Roy. Lugbd.* 491. *Dalib. Paris.* 166.

Ranunculus arvensis, echinatus. *C. B. P.* 179.

Ranunculus sylvestris. 3. *Dod. Pempt.* 427.

In campis alicubi, uti ad Draconcellam, Sorianum etc.

1037. RANVNCVLVS (*muricatus vulgo* Ranuncolo palustre con testa spinosa) seminibus aculeatis, foliis simplicibus lobatis obtusis glabris, caule diffuso. *Hort. Cliff.* 229. *Roy. Lugbd.* 491. *Sauv. Monsp.* 204.

Ranunculus palustris, echinatus. *C. B. P.* 180. *Prodr.* 95.

Ranunculus Creticus, echinatus, latifolius. *Alp. Exot.* 263. *t.* 262.

Ad Nympham, et ad lacum Vlubrae.

2038. RANVNCVLVS (*parviflorus vulgo* Ranuncolo annuo ed irsuto con fiore piccolo) seminibus muricatis, foliis simplicibus laciniatis, acutis, hirsutis, caule diffuso. *Huds. Angl.* 212.

Ranunculus hirsutus, annuus, flore minimo.

Pluk. Almag. 311. *t.* 55. *f.* 1. *Rai. Angl.* 3. *p.* 248. *t.* 12. *f.* 1. *Moris. Hist.* 2. *p.* 440. *Se.* 4. *t.* 28. *f.* 21.

Vivit ad Saccaratam, et nonnullis aliis in locis.

1039. RANVNCVLVS (*Aquatilis vulgo* Millefoglio acquatico maggiore cornuto) foliis submersis capillaceis , emersis subpeltatis. *Flor. Svec.* 2. 509.

Ranunculus foliis inferioribus capillaceis , superioribus peltatis. *Flor. Lapp.* 234. *Roy. Lugbd.* 492. *Hall. Helv.* 328.

Ranunculus aquaticus folio rotundo , et capillaceo . *C.B.P.* 180.

Ranunculus aquatilis . *Dod. Pempt.* 387.

Ranunculus foliis submersis capillaceis . *Dalib. Paris.* 168. *(a)*

Ranunculus foliis omnibus capillaceis , circumscriptione rotundis . *Hort. Cliff.* 231. *Roy. Lugbd.* 492. *Hall. Helv.* 328.

Ranunculus aquaticus , albus , circinatis tenuissime divisis foliis . *Pluk. Alm.* 311. *t.* 52. *f.* 2.

Millefolium aquaticum , cornutum , majus . *C. B.P.* 141.

Ranunculus (*vulgo* Ranuncolo con foglie capillari) foliis capillaceis , circumscriptione vaga, brevioribus . *Hall. Helv* 328. *(b)*

Ranunculus aquaticus , capillaceus . *C. B. P.* 180.

Millefolium aquaticum, foliis Abrotani, Ranunculi flore, et capitulo. *C. C. P.* 141.

Ranunculus trichophyllos, aquaticus, medio luteus. *Col. Ecph.* 1. *p.* 315. *t.* 316.

Ranunculus (*vulgo* Ranuncolo acquatico con foglie lunghe capillari) foliis omnibus capillaceis, circumscriptione oblongis. *Roy. Lugbd.* 492. (*c*)

Ranunculus albus, fluitans, Peucedani foliis. *Herm. Lugbd.* 517.

Millefolium aquaticum, foliis Feniculi, Ranunculi flore, et capitulo. *C.B.P.* 141.

Ad Lacunas Pontinas et aliis in locis paludosis etc. etiam ad aliquos fontes, uti S. Petri Montorii.

Ranunculi fere omnes vim causticam habent.

HELLEBORVS

1040. HELLEBORVS (*hyemalis vulgo* Aconito bulboso di una sola foglia) flore folio insidente. *Hort. Cliff.* 227. *Roy. Lugbd.* 484.

Helleborus ranunculoides, praecox, tuberosus, flore luteo. *Moris. Hist.* 2. *p.* 459. *Se.* 12. *t.* 2. *f.* 4.

Aconitum unifolium, bulbosum. *C. B. P.* 183. *Hill. Anat. t.* 11.

Ad montes Sevetum, et Trebulum.

1041. HELLEBORVS (*niger vulgo* Elleboro con fiore rosseggiante) scapo subunifloro

subnudo, foliis pedatis. *Hort. Vpsal.* 157., *Mat. Med.* 273 *Roy. Lugbd.* 484.

Helleborus scapo florifero, subnudo, petiolo communi bipartito. *Hort. Cliff.* 227.

Helleborus niger, flore roseo. *C. B. P.* 186. *Hill. Anat. t.* 1.

Elleborus niger legitimus. *Clus. Hist. f.* 1. 275.

Ad Fiscellum.

1042. HELLEBORVS (*viridis vulgo* Elleboro nero, con fiore verdeggiante) caule multifloro, folioso, foliis digitatis. *Linn. Spec. Plant.* 3. *p.* 784.

Helleborus caule aequali, folioso, foliis radicalibus caulem tandem superantibus. *Hort. Cliff.* 227. *Roy. Lugbd.* 484.

Helleborus niger hortensis, flore viridi. *C. B. P.* 185.

Helleborum nigrum alterum. *Cam. Epit.* 941.

Fere in collibus omnibus, et jugis montium Ariciae, Albani, Cintiani etc.

1043. HELLEBORVS (*foetidus vulgo* Elleboro nero fetido) caule multifloro folioso, foliis pedatis. *Linn. Spec. Pl.* 4. *p.* 784.

Helleborus caule inferne angustato, multifolio, multifloro, foliis caule brevioribus. *Hort. Cliff.* 227. *Roy. Lugbd.* 484. *Dalib. Paris.* 169. *Sauv. Monsp.* 180.

Helleborus niger foetidus. *C. B. P.*185.
Helleboraster maximus. *Lob. Icon.*679.
Helleborus femina. *Sterb. Fung* 372. *t.*36. *f. C.*
Helleborus (*vulgo* Elleboro nero con tre foglie) niger trifoliatus. *Moris. Hist.*3. *p.* 460. *Se.*12. *t.* 4. *f.* 7. (*a*)

Fere eisdem in locis cum superiori, Helleborus interne caute est adhibendus. Valet in morbis soporosis, catharrosis, hypocondriacis, in epilepsia, mania, febribus quartanis etc. Est vermifugus certissimus etc.

CALTHA

1044. CALTHA (*palustris vulgo* Calta palustre di fiore sdoppio). *Flor. Lapp.*227. *Hort. Cliff.*228 *Roy. Lugbd.* 484. *Dalib. Paris.*169.
Caltha palustris, flore simplici. *C. B. P.* 276.
Populago major. *Tabern. Icon.*750.
Populago minor. *Tabern. Icon.*750.
Caltha palustris, flore pleno. *C. B. P.* 276. (*a*)

Ad Pontinas, Sabatium lacum etc. Est planta caustica.

Emendanda, et addenda ex alio ms. Auctoris.

*P.*13. *n.*44.
Veronica (*vulgo Beccabunga*) *Lege* Veronica (*Beccabunga Corymbosa*)

*P.*21. *post num.*69. CVNILLA adde.

ZIZIPHORA

1045. ZIZIPHORA (*capitata*) capitulis terminalibus, foliis ovatis. *Sp. Pl.* 1. *p.* 31.

Ziziphora foliis lanceolatis, floribus terminantibus. *Hort. Cliff.* 305. *Roy. Lugbd.* 313.

Clinopodium fistulosum, pumilum Indiae occidentalis, summo caule floridum. *Pluk. Alm. t.* 164. *f.* 4.

Thymus humilis latifolius. *Buxb. Cent.* 3. *p.* 28. *t.* 51. *f* 1.

In Umbriae olivetis, et in ditione Tiburtina non procul a S. Polo, ac Monticelli.

Pag. 32. 33. *ad n.* 101.

Sisyrinchium minus . . . .)

Sisyrinchium asprensium. .)

Bulbocodium . . . .)

Singulis praepone *An* interogantis ?

Pag. 34. *ad n.* 106. IRIS adde (*Germanica*)

Pag. 94. inter *n.* 270. 271. adde .

1046. SCABIOSA (*integrifolia*) corollulis quadrifidis radiantibus, foliis radicalibus ovatis serratis lanceolatis, caule herbaceo. *Sp. Pl.* 7. 142.

Scabiosa corollis quadrifidis, foliis omnibus lanceolatis serratis. *Sauv. Monsp.* 156.

Scabiosa annua integrifolia, sive foliis Bellidis. *Magnol. Monsp.* 231.

Scabiosa montana latifolia, non laciniata, rubra. *C. B. P.* 270.

Scabiosa latifolia, purpurascente flore. *Clus. Hist.* 2. *p.* 2. *f.* 3.

Ad Sublacum etc.

Pag. 96. *ante n.* 277. adde.

1047. SHERARDIA (*ovata*) maritima procumbens, foliis ovatis cuspidatis, floribus lutescentibus.

In maritimis Mediterranei. Planta procumbit, et ex viridi albescit. Folia sunt ovata, parva, cuspidata, tripleura. Flores ad alas foliorum, et spicatim in summitate disponuntur. Planta aliquando duos palmos aequat. etc.

Pag. 113. *post n.* 328. *adde*.

TRAPA

1048. TRAPA (*natans*) petiolis foliorum natantium ventricosis. *Hort. Cliff.* 483. *Mat. Med.* 52. *Dalib. Paris.* 52.

Tribulus aquaticus. *C.B.P.* 194. *Cam. Epit.* 715.

Panover-Isierava. *Rheed. Mal.* 11. *p.* 65. *t.* 33.

Ad lacum Volsiniensem. Refrigerans aperiens vulneraria. In diarrhoea, et calculo.

Pag. 199. *ad n.* 550. CAVCALIS *adde* (*platycarpos*)

Pag. 202. *ad n.* 558. AMMI *adde* (*glaucifolium*)

PREZZO

Fogli 28 di stampa a baj. 4	sc.	1	12
Legatura del tomo	sc.	—	3
	sc.	1	15